

А.А. Чуркин
А.Н. Мартюшов

Практическое руководство по применению МКБ-10 в психиатрии и наркологии

Москва

А.А. Чуркин
А.Н. Мартюшов

Практическое руководство по применению МКБ-10 в психиатрии и наркологии

Москва – 2010

Содержание

Введение **5**

F00 – F09 Органические, включая симптоматические, психические расстройства **8**

Деменция... (F00 – F03) 10

F00 ...при болезни Альцгеймера...(G30.-+) 10

F01 ...сосудистая 11

F02 ...при болезнях, квалифицированных в других разделах... 12

F03 ...неуточненная 14

F04 Органический амнестический синдром, не обусловленный алкоголем или другими психоактивными веществами 15

F05 Делирий, не обусловленный алкоголем или другими психоактивными веществами... 15

F06 Другие психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного мозга, либо вследствие физической болезни... 17

F07 Расстройства личности и поведения ...вследствие болезни, повреждения или дисфункции головного мозга 21

F09 Неуточненные органические или симптоматические психические расстройства 23

F10 – F19 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с (вызванные) употреблением психоактивных веществ **24**

F20 – F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства **48**

F20 Шизофрения 49

F21 Шизотипическое расстройство 53

F22 Хронические бредовые расстройства 54

F23 Острые и преходящие психотические расстройства 54

F24 Индуцированное бредовое расстройство 57

F25 Шизоаффективное расстройство... 57

F28 Другие неорганические психотические расстройства 58

F29 Неуточненный неорганический психоз 58

F30 – F39 Расстройства настроения (аффективные расстройства) **59**

F30 Маниакальный эпизод... 60

F31 Биполярное аффективное расстройство.. 61

F32 Депрессивный эпизод... 62

F33 Рекуррентное аффективное расстройство... 64

F34 Хронические аффективные расстройства... 65

F38 Другие аффективные расстройства... 65

F39 Неуточненные аффективные расстройства... 65

F40 – F49 Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства **66**

F40 Фобические и тревожные расстройства 67

F41 Другие тревожные расстройства 68

F42 Обсессивно-компульсивные расстройства 69

F43 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации 70

F44 Диссоциативное (конверсионное) расстройство... 71

F45 Соматоформное расстройство... 73

F48 Другие невротические расстройства 74

F50 – F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами **76**

F50 Расстройства приема пищи 77

F51 Расстройства сна неорганической природы 78

F52 Сексуальные расстройства, не обусловленные органическими нарушениями или болезнями 80

F53 Психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом и не классифицируемые в других разделах 82

F54 Психологические и поведенческие факторы, связанные с расстройствами или заболеваниями, классифицированными в других разделах 82

F55 Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости 83
F59 Неуточненные поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами 83

F60 – F69 Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте 84

F60–F62 Специфические, смешанные и другие личностные расстройства, а также продолжительные изменения личности 85
F60 Специфическое расстройство личности... 85
F61 Смешанное и другие расстройства личности 89
F62 Хронические изменения личности не связанные с повреждением или заболеванием мозга... 89
F63 Расстройства привычек и влечений 90
F64 Расстройства половой идентификации 91
F65 Расстройства сексуального предпочтения 92
F66 Психологические и поведенческие расстройства связанные с сексуальным развитием и ориентацией 93
F68 Другие расстройства зрелой личности и поведения у взрослых 94
F69 Расстройство зрелой личности и поведения у взрослых, неуточненное 95

F70 – 79 Умственная отсталость 96

F70 Умственная отсталость легкой степени 97
F71 Умственная отсталость умеренная... 97
F72 Умственная отсталость тяжелая... 98
F73 Умственная отсталость глубокая 98
F78 Другая умственная отсталость 98
F79 Неуточненная умственная отсталость 98

F80 – F89 Нарушения психологического (психического) развития 99

F80 Специфические расстройства развития речи 100
F81 Специфические расстройства развития школьных навыков 102
F82 Специфическое расстройство развития двигательных функций 103
F83 Смешанные специфические расстройства развития 104
F84 Общие расстройства развития 104
F88 Другие расстройства психологического (психического) развития 107
F89 Неуточненное расстройство психологического развития 107

F90 – F99 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте 108

F90 Гиперкинетические расстройства 109
F91 Расстройства поведения 110
F92 Смешанные расстройства поведения и эмоций 111
F93 Эмоциональные расстройства, специфические для детского возраста 112
F94 Расстройства социального функционирования с началом специфическим для детского и подросткового возраста 113
F95 Тики 115
F98 Другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте 116
F99 Психическое расстройство, без других указаний 118

Приложение 1 119

Приложение 2 129

Как работать с этой книгой?

(рекомендуется обязательно прочитать!)

Введение

Данное «Практическое руководство ...» представляет собой сокращенное структурированное изложение диагностических указаний и критериев психических и поведенческих расстройств, представленных в пятой главе (в пятом классе) Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10), адаптированной для использования в Российской Федерации[1]. Под словом «сокращенное» не следует понимать, что из оригинального текста изъяты какие-либо существенные детали, искажающие принципиальный смысл диагностических категорий. При составлении данных рекомендаций, была предпринята попытка упорядочить основные понятия классификации, представить их в виде списков симптомов, необходимых для корректной диагностики.

Данная классификация психических и поведенческих расстройств является, в определенной степени, лишь «правилами игры», компромиссом между различными точками зрения в психиатрии. Она создана для возможности единого подхода к квалификации психических расстройств психиатрами разных стран и диагностических школ, и в первую очередь – с целью их единообразного учета. Применяя диагностические критерии разных групп и категорий заболевании необходимо помнить – наборы симптомов и других признаков это то, что необходимо для квалификации динамики расстройства и текущего состояния больного, а также их грамотной кодировки в соответствии с МКБ-10. При этом следует отдавать себе отчет в том, что настоящими списками не может быть исчерпана вся клиническая психиатрия. Напротив, для более эффективного применения МКБ-10 необходимы глубокие знания клинического метода обследования больных с психическими и поведенческими расстройствами. В случае трудностей диагностики, необходимо обращаться к полному тексту классификации. В нем подробно изложены не только критерии правильной квалификации расстройства психики или поведения, но и обсуждаются вопросы дифференциальной диагностики, существующие взгляды в современной психиатрии на ту или иную психопатологию.

Основной целью данного руководства является помощь практическим врачам – психиатрам, наркологам и психотерапевтам, организаторам здравоохранения и медицинским статистикам в быстром освоении пятого раздела МКБ-10, то есть стать их настольной книгой и служить справочным пособием «на каждый день». В качестве методического приёма постановки диагноза авторами предлагается пошаговое принятие диагностического решения с помощью графических схем.

Структура книги

Для удобства пояснения принципа организации МКБ-10 рассмотрим несколько условных понятий или, как их еще называют, терминологических соглашений:

- **Раздел** – как и собственно пятая глава МКБ-10, настоящая книга содержит десять разделов; каждый из разделов, чаще всего, имеет единые диагностические указания для входящих в него диагностических групп
- **Диагностическая группа** – до десяти в каждом разделе; в ряде случаев, несколько диагностических групп могут объединяться и иметь общие диагностические указания (например – «Деменция...», объединяющая четыре диагностических группы F00 – F03)
- **Диагностическая категория** – до десяти в каждой диагностической группе; каждая диагностическая категория может быть дополнена десятью уточнениями
- **Уточнение** – может быть отнесено как к одной или нескольким диагностическим категориям, одной или нескольким диагностическим группам, так и к разделу в целом
- **Буквенно-цифровой код** *(может быть четырех-, пяти-, шести- и даже семизначный)* – примененный в МКБ 10 способ обозначения глав, диагностических разделов, диагностических групп, диагностических категорий и уточнений. После буквенно-цифрового кода следует соответствующе ему название диагноза. Выглядеть это может так:
  F05.00 ***Делирий, возникший не на фоне деменции, в связи с травмой головного мозга***
  В данном случае:

---

[1] The ICD-10. Classification of Mtntal and Behavioural Disorders. Clinical descriptions and guidelines //World Health Organization, Geneva, 1992
Психические расстройства и расстройства поведения (F00 – F99). (Класс V МКБ-10, адаптированный для использования в Российской Федерации). – М., Минздрав РФ, 1998

- **первый знак** – буква **F** – означает пятую главу (класс) МКБ-10,
- **второй знак** – первая цифра **0** – отнесение данного диагноза к разделу ***«Органические, включая симптоматические, психические расстройства»***,
- **третий знак** – вторая цифра **5** – отнесение к диагностической группе ***«Делирий...»***
- **четвертый знак** – третья цифра **0** (первая после точки) – отнесение к диагностической категории ***«...возникший не на фоне деменции...»***
- **пятый знак** – четвертая цифра **0** – уточнение ***«...в связи с травмой головного мозга»***


В начале каждого раздела помещены графические ***схемы принятия диагностического решения***. Каждая схема содержит название раздела, с проведенной вертикально вниз осью. На ось «нанизаны» взятые в рамки коды и названия диагностических групп, от которых проведены стрелки к следующим рамкам, содержащим коды и названия диагностических категорий. Названия групп редко применяются в качестве самостоятельного диагноза, лишь тогда, когда не имеет продолжения в виде диагностических категорий. В том случае, когда код диагностической категории заключен в косые скобки (например – **/F02.6/**), ни код, ни ключевое выражение не должны применяться самостоятельно, а лишь вместе с уточнением. Если уточнения относятся лишь к одной категории, они размещены в той же рамке сразу вслед за названием категории. Когда уточнения относится ко всем диагностическим категориям, то они помещены в отдельные рамки. В ряде случаев есть отступления от этого правила, обусловленные особенностями графического размещения уточнений диагноза. Переход от одной раки к другой будет называться здесь и далее *шагом принятия диагностического решения*. Иногда в рамках помещены только отдельные слова или выражения, являющиеся ключевой частью соответствующих названий.

С помощью графической схемы и структурированной записи диагностических указаний и критериев можно корректно и без затруднений записать и кодировать установленный диагноз.

Для некоторых диагнозов это можно сделать, используя последовательное (пошаговое) присоединение названия (или ключевой части названия) раздела, диагностической группы (или объединения групп), категорий и уточнений, как в примере приведенном выше:

- *«Делирий...»* – ключевое слово из названия диагностической группы «F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другим психоактивным веществом»
- *«...возникший не на фоне деменции...»* – ключевая часть названия диагностической группы F05.0
- *«...в связи с травмой головного мозга...»* – ключевое выражение из уточнения диагноза F05.00 в данном случае обозначающего этиологию расстройства.

Схема принятия диагностического решения



Разумеется, выбор диагностических групп, категории и уточнений следует проводить, руководствуясь диагностическими указаниями и критериями, мысленно следуя от общих характеристик к частным. Это проиллюстрировано на расположенной ниже схеме принятия диагностического решения.

К сожалению, способ последовательного пошагового присоединения соответствующих названий не всегда применим. Так для раздела F00-F09, построение диагноза подробно рассматривается в пояснении к графической схеме. Разумеется, при использовании этого приема для написания диагноза, части названий можно менять местами, учитывая смысловую последовательность в написании диагноза и правила правописания русского языка. В некоторых случаях, когда кодировка диагноза представляет значительные трудности, в руководство были помещены списки полных диагностических кодов, рекомендуемых к применению.

Следует обратить особое внимание, что некоторые разделы, диагностические группы (или их объединения), а также объединения диагностических категорий могут иметь общие *диагностические указания*, которые необходимо обязательно использовать для постановки диагноза того или иного расстройства.

Для удобства использования настоящего пособия в заголовках, разделов, групп (или их объединений), категорий и уточнений, где это уместно, были оставлены (или выделены) части текстов, которые можно использовать для составления диагноза их последовательным соединением. Некоторые конкрет-


ные особенности составления диагноза рассматриваются в пояснениях к графическим схемам. В ряде случаев, когда тот или иной диагноз не описан в классификации явно и имеет многочисленные уточнения, корректная кодировка может представлять известные трудности. Для преодоления этих трудностей в настоящем издании после некоторых диагностических групп помещены последовательные (отсортированные) списки кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению.

Кроме того, учитывая определенные трудности с указанием кода основного (+) заболевания в учетных формах (например – №66-1/у «Карта выбывшего из психиатрического стационара»), в приложении 1.А. собран перечень всех возможных кодов и диагнозов для применения в таких случаях (см. ниже перечень приложений. Однако, при этом следует помнить, что код основного заболевания указывается только в случае деменции.

Таким образом, в пятой главе МКБ-10 может быть обозначено и закодировано до десяти тысяч вариантов диагнозов с уточнениями. На самом деле, использованы не все возможные коды диагностических групп, категорий и уточнений. В частности полный последовательный перечень всех возможных (в соответствии со здравым смыслом) кодов класса F составил более 2 000 позиций (точнее – 2 394). Это обстоятельство рассматривается авторами настоящей классификации как резерв для возможных дополнений и уточнений в будущем.

Книга содержит приложения к основному содержанию:

- приложение 1 –
  - A. Последовательный перечень диагнозов из других разделов МКБ-10, применяющихся в качестве основных (+) вместе с диагнозами F00 «Деменция при болезни Альцгеймера» и F02 «Деменция при болезнях, квалифицированных в других разделах»
  - B. Состояния из других разделов МКБ-10, часто ассоциированные с психическими и поведенческими расстройствами
- приложение 2 – Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (утвержден постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681)


F00 – F09
Органические, включая симптоматические психические расстройства
Деменция (F00 - F03)...
F00 ...при болезни Альцгеймера...
F00.0 ...с ранним началом
F00.1 ...с поздним началом
F00.2 ...атипичная или смешанного типа
F00.9 ...неуточненная
F01 ...сосудистая...
F01.0 ...с острым началом
F01.1 ...мультиинфарктная
F01.2 ...подкорковая
F01.3 ...смешанная корковая и подкорковая
F01.8 ...другая
F01.9 ...неуточненная
F02 (...при болезнях квалифицированных в других разделах...)
F02.0 ...при болезни Пика
F02.1 ...при болезни Кройцфельда - Якоба
F02.2 ...при болезни Гентингтона
F02.3 ...при болезни Паркинсона
F02.4 ...связанная с ВИЧ-инфекцией
F02.8 ...(при других уточненных болезнях)
F03 ...неуточненная...
F03.1 Пресенильная...
F03.2 Сенильная...
F03.3 Пресенильный психоз...
F03.4 Сенильный психоз...
F0x.-0 без дополнительных симптомов
F0x.-1 с преимущественно бредовыми симптомами
F0x.-2 с преимущественно галлюцинаторными симптомами
F0x.-3 с преимущественно депрессивными симптомами
F0x.-4 с другими смешанными симптомами
F02.8x0 ...в связи с травмой головного мозга
F02.8x2 ...в связи с эпилепсией
F02.8x3 ...в связи с опухолью головного мозга
F02.8x5 ...в связи с нейросифилисом
F02.8x6 ...в связи с другой вирусной или бактериальной нейроинфекцией
F02.8x7 ...в связи с другими заболеваниями
F02.8x8 ...в связи со смешанными заболеваниями
F02.8x9 ...в связи с неуточненными заболеваниями
F04 Органический амнестический синдром (не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами)
F05 Делирий (не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами)
F05.0 ...возникающий на фоне деменции
F05.1 ...возникающий не на фоне деменции
F05.8 ...другой
F05.9 ...неуточненный
F06 Другие психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного мозга
F06.0 Галлюциноз...
F06.1 Кататоническое расстройство...
F06.2 Бредовое (шизофреноподобное) расстройство...
F06.3 Органическое аффективное расстройство...
F06.30...психотическое маниакальное...
F06.31...психотическое биполярное...
F06.32...психотическое депрессивное...
F06.33...психотическое смешанное...
F06.34...гипоманиакальное...
F06.35...непсихотическое биполярное...
F06.36...непсихотическое депрессивное...
F06.37...непсихотическое смешанное...
F06.4 Органическое тревожное расстройство...
F06.5 Органическое диссоциативное расстройство...
F06.6 Органическое эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство...
F06.7 Легкое когнитивное расстройство...
F06.8 Другое уточненное расстройство...
F06.81...психотическое...
F06.82...непсихотическое...
F06.9 Неуточненное расстройство...
F06.91...психотическое...
F06.92...непсихотическое...
F0x.-0 ...в связи с травмой головного мозга
F0x.-1 ...в связи с сосудистым заболеванием
F0x.-2 ...в связи с эпилепсией
F0x.-3 ...в связи с опухолью головного мозга
F0x.-4 ...в связи с ВИЧ-инфекцией
F0x.-5 ...в связи с нейросифилисом
F0x.-6 ...в связи с другой вирусной или бактериальной нейроинфекцией
F0x.-7 ...в связи с другими заболеваниями
F0x.-8 ...в связи со смешанными заболеваниями
F0x.-9 ...в связи с неуточненными заболеваниями
F07 Расстройства личности вследствие болезни, повреждения или дисфункции мозга
F07.0 Органическое расстройство личности...
F07.1 Постэнцефалитический синдром...
F07.14 ...в связи с ВИЧ-инфекцией
F07.15 ...в связи с нейросифилисом
F07.16 ...в связи с другой вирусной или бактериальной нейроинфекцией
F07.17 ...в связи с другими заболеваниями
F07.18 ...в связи со смешанными заболеваниями
F07.19 ...в связи с неуточненными заболеваниями
F07.2 Постконтузионный (посткоммоционный) синдром...
F07.8 Другое органическое расстройство личности...
F07.9 Неуточненное органическое расстройство личности...
F09 Неуточненное органическое или симптоматическое психическое расстройство

F00 – F09 Органические, включая симптоматические, психические расстройства

I. *Общие рекомендации по применению схемы диагностического решения в разделе F00 – F09:*
   A. *Любое диагностическое решение в разделе органических и симптоматических психических расстройств должно соответствовать общим для него диагностическим указаниям*
   B. *Особое внимание следует обращать на происхождение психического расстройства. В том случае, если название диагноза не содержит соответствующих указаний (как, например – деменция при болезни Альцгеймера или Гентингтона), диагноз должен уточняться заболеванием, лежащим в основе психических расстройств. При этом код расстройства так же должен содержать это уточнение, обозначенное четвертым, пятым или шестым знаком (см. общие диагностические указания к F00 – F09)*

II. *Первые четыре диагностические группы, объединенных под названием «Деменция» и имеют общие диагностические указания.*
   A. *При квалификации психического расстройства как «Деменция» постановка диагноза требует выполнения следующих правил:*
      1. *Самостоятельно диагноз «Деменция» используется лишь в случаях F01 (Сосудистая деменция…) и F03 (Неуточненная деменция…)*
      2. *Во всех остальных случаях деменции на первом месте в диагнозе и в коде указывается основное заболевание (см. диагностические критерии). Например:*
         – *Болезнь Альцгеймера с ранним началом. Деменция с преимущественно бредовыми симптомами. G30.0; F00.01*
         – *Эпилепсия. Деменция с преимущественно галлюцинаторными симптомами. G40; F02.822*
         – *Гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона). Деменция с другими смешанными симптомами. E83.0; F02.84*
      3. *Любой тип деменции должен уточняться наличием или отсутствием дополнительных симптомов (четвертый знак кода). Однако, если деменция сопровождается делириозными расстройствами, применяется F05.-.*
      4. *Только в случае F02.8 (Деменция при других уточненных заболеваниях…), там, где это уместно, применяется шестой знак, указывающий на происхождение психического расстройства. Следует обратить внимание, что в отличие от кодов прочих органических психических расстройств, в качестве шестого знака не используется F02.8x1 – «…при сосудистых заболеваниях», поскольку сосудистая деменция рассматривается как самостоятельная диагностическая категория (F01.-).*

III. *Прочие органические расстройства диагностируются и кодируются так, как указано во введении (стр. i-iv). Однако следует отметить, что:*
   A. *В случае диагностики органических аффективных расстройств, уточнять характер аффекта (пятый знак кода) следует согласно диагностическим критериям F30 – F39.*
   B. *В категории F06.- для другого и неуточненного психического расстройства необходимо использование пятого знака кода для обозначения их характера (психотическое или непсихотическое).*

Общие диагностические указания:

A. К этому разделу относятся расстройства, для которых установлена ясная причинная связь с повреждениями, приведшими к церебральной дисфункции:
   1. **первичной** – возникающей при непосредственном поражении головного мозга или
   2. **вторичной** – при системных заболеваниях, когда мозг повреждается как одна из систем организма.

B. В настоящей классификации из раздела органических психических расстройств исключены **расстройства церебральных функций, вызванные употреблением алкоголя, наркотиков и других психоактив vных веществ**, которые классифицируются в разделе **F10 – F19**.

C. По преимуществу проявлений в этом разделе выделяется две группы:
   1. расстройства когнитивных функций (память, интеллект, обучение, внимание...)
   2. расстройства восприятия, содержания мыслей, эмоций, поведения.

D. Для адаптированного варианта классификации обязательно уточнение диагноза четвертым, пятым или шестым знаком, обозначающим «органическое» заболевание, с которым связано симптоматическое психическое расстройство:
   F0x.-0 – …с травмой головного мозга
   F0x.-1 – ...с сосудистым заболеванием головного мозга
   F0x.-2 – …с эпилепсией
   F0x.-3 – …с новообразованием (опухолью) головного мозга
   F0x.-4 – …с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)
   F0x.-5 – …с нейросифилисом
   F0x.-6 – …с другими вирусными и бактериальными заболеваниями

F0x.-7 – ...с другими заболеваниями
F0x.-8 – ...со смешанными заболеваниями
F0x.-9 – ...с неуточненными заболеваниями

Деменция... (F00 – F03).

Общие диагностические указания:

A. **Деменция** – синдром хронического и/или прогрессирующего характера, включающий:
   1. нарушения ряда высших функций коры головного мозга: память, ориентировка, мышление, понимание, способность к обучению и суждениям, объединяющихся в снижение интеллекта и уровня ранее приобретенных знаний, вплоть до утраты элементарных навыков, способности к самообслуживанию (афазия, алексия, апраксия);
   2. продолжительность выше названных расстройств не менее шести месяцев;
   3. сохранность ясного сознания[1];
   4. на ранних этапах деменции могут наблюдаться расстройства эмоциональной сферы, заострение личностных черт.

B. В том случае, если деменция осложнена присутствием других симптомов, в конце кода должен быть поставлен пятый знак[2], в том числе:
   F0x.x0 – ...без дополнительных симптомов
   F0x.x1 – ...преимущественно бредовые симптомы
   F0x.x2 – ...преимущественно галлюцинаторные симптомы
   F0x.x3 – ...преимущественно депрессивные симптомы
   F0x.x4 – ...другие смешанные симптомы.

C. В некоторых случаях деменции главным и обязательным является код основного заболевания (лежащего в основе этого психического расстройства), который ниже будет указан в скобках после соответствующего названия диагностической группы, категории и т.д.[3]

F00. ...при болезни Альцгеймера...(G30.-+)

Диагностические критерии:

A. деменция, как описано в общих диагностических указаниях;
B. начало болезни Альцгеймера относится к пресенильному (до 65 лет) или сенильному возрасту, но может встречаться и в более молодом возрасте
C. постепенное[4] начало с медленно нарастающим слабоумием и возможной временной стабилизацией болезненного процесса;
D. отсутствие данных о других заболеваниях мозга (первичных или вторичных);
E. отсутствие апоплексического начала или неврологических знаков, указывающих на повреждение мозга[5];
F. на вероятность раннего начала болезни Альцгеймера может указывать ее наличие в семейном анамнезе
G. длительность заболевания – 2 – 3 года
H. в случае сочетания признаков болезни Альцгеймера и сосудистой деменции должна иметь место двойная диагностика и кодирование

Включается:
– *первичная дегенеративная деменция альцгеймеровского типа*

F00.0 ... с ранним началом... (G30.0+)

Диагностические критерии:

A. начало заболевания до 65 лет
B. относительно быстрое течение с множественными выраженными расстройствами высших корковых функций уже на раннем этапе болезни

Включается:
– *болезнь Альцгеймера, тип 2*
– *пресенильная деменция альцгеймеровского типа*

---

1 если деменция осложнена другим расстройством, характерным для синдромов измененного сознания первичным является код этого другого расстройства; например – делирий на фоне деменции – F05.1

2 здесь и далее вместо знака «х» на третьей и четвертой позиции кода ставится любое значение, допустимое для конкретного вида расстройства в конкретном разделе

3 в соответствии с главой 3.1.3 Сборника инструкций («Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр. т.2, ВОЗ, Женева, 1995г., с21)

4 возможно внезапное начало

5 возможно их появление на поздних этапах болезни

F00.1 ... с поздним началом... (G30.1+)

Диагностические критерии:

A. начало заболевания после 65 – 75 лет и позже.

B. медленное прогрессирование болезни, преимущественно с расстройствами памяти.

Включается:

- *болезнь Альцгеймера, тип 1*
- *пресенильная деменция альцгеймеровского типа*

F00.2 ... атипичная или смешанного типа... (G30.8+)

Кодируются случаи болезни Альцгеймера:

A. с атипичной, но значимой симптоматикой;

B. со смешанными признаками болезни Альцгеймера с ранним и поздним началом.

C. с наличием признаков сосудистой деменции.

F00.9 ... неуточненная... (G30.8+)

Список кодов и диагнозов рекомендуемых к применению в диагностической группе F00 Деменция при болезни Альцгеймера

F00.01	*Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом, с другими симптомами, преимущественно бредовыми*
F00.02	*Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными*
F00.03	*Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом, с другими симптомами, преимущественно депрессивными*
F00.04	*Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом, с другими смешанными симптомами*
F00.00	*Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом без дополнительных симптомов*
F00.13	*Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом, с другими симптомами, преимущественно депрессивными*
F00.14	*Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом, с другими смешанными симптомами*
F00.12	*Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными*
F00.11	*Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом, с другими симптомами, преимущественно бредовыми*
F00.10	*Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом без дополнительных симптомов*
F00.21	*Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа, с другими симптомами, преимущественно бредовыми*
F00.22	*Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными*
F00.23	*Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа, с другими симптомами, преимущественно депрессивными*
F00.24	*Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа, с другими смешанными симптомами*
F00.20	*Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа без дополнительных симптомов*
F00.90	*Деменция при болезни Альцгеймера, неуточненная без дополнительных симптомов*
F00.93	*Деменция при болезни Альцгеймера, неуточненная, с другими симптомами, преимущественно депрессивными*
F00.94	*Деменция при болезни Альцгеймера, неуточненная, с другими смешанными симптомами*
F00.91	*Деменция при болезни Альцгеймера, неуточненная, с другими симптомами, преимущественно бредовыми*
F00.92	*Деменция при болезни Альцгеймера, неуточненная, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными*

F01. ...сосудистая...

Диагностические критерии:

A. деменция, как описано в общих диагностических указаниях;

B. начало связано либо с преходящими эпизодами ишемии мозга, либо после обширного геморрагического инсульта (реже)

C. в зависимости от начала, явления деменции соответственно либо нарастают постепенно, либо наступают внезапно.

D. очаговые неврологические знаки;

E. относительно сохранные критика к своему состоянию, суждения и черты личности;

F. подтверждение первичности сосудистого заболевания параклиническими данными.

F01.0 ... с острым началом...

Развивается после серии ишемических инсультов или после обширной геморрагии.

F01.1 ... мультиинфарктная...

Постепенное начало, обусловленное кумулятивным эффектом инфарктов паренхимы мозга

Включается:

- *преимущественно корковая деменция*

F01.2 ... субкортикальная...

Подтвержденная клинически и параклинически дисфункция субкортикальных структур белого вещества мозга при сохранности коры больших полушарий мозга (диффузная демиелинизация , «бинсвангеровская энцефалопатия»)

F01.3 ... смешанная кортикальная и подкорковая...

Смешанная клиническая и параклиническая картина кортикальной и субкортикальной дисфункции сосудистого происхождения

F01.8 ... другая...

F01.9 ... неуточненная...

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F01 Сосудистая деменция

F01.00 Сосудистая деменция с острым началом, без дополнительных симптомов
F01.01 Сосудистая деменция с острым началом, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F01.02 Сосудистая деменция с острым началом, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F01.03 Сосудистая деменция с острым началом, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F01.04 Сосудистая деменция с острым началом, с другими смешанными симптомами
F01.10 Мультиинфарктная деменция без дополнительных симптомов
F01.11 Мультиинфарктная деменция, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F01.12 Мультиинфарктная деменция, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F01.13 Мультиинфарктная деменция, преимущественно депрессивными
F01.14 Мультиинфарктная деменция, с другими смешанными симптомами
F01.23 Подкорковая сосудистая деменция, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F01.22 Подкорковая сосудистая деменция, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F01.21 Подкорковая сосудистая деменция, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F01.20 Подкорковая сосудистая деменция без дополнительных симптомов
F01.24 Подкорковая сосудистая деменция, с другими смешанными симптомами
F01.30 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция без дополнительных симптомов
F01.31 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F01.32 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F01.33 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F01.34 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция, с другими смешанными симптомами
F01.80 Другая сосудистая деменция без дополнительных симптомов
F01.81 Другая сосудистая деменция, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F01.82 Другая сосудистая деменция, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F01.83 Другая сосудистая деменция, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F01.84 Другая сосудистая деменция, с другими смешанными симптомами
F01.93 Сосудистая деменция, неуточненная, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F01.94 Сосудистая деменция, неуточненная, с другими смешанными симптомами
F01.91 Сосудистая деменция, неуточненная, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F01.90 Сосудистая деменция, неуточненная без дополнительных симптомов
F01.92 Сосудистая деменция, неуточненная, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными

F02 ...при болезнях, квалифицированных в других разделах...

Диагностические критерии:
A. деменция, как описано в общих диагностических указаниях
B. случаи деменции, обусловленные причинами (болезнями), кроме болезни Альцгеймера и цереброваскулярных заболеваний. Начало в любом возрасте, реже в позднем.
C. наличие специфического синдрома, описанного в категориях, изложенных ниже

F02.0 ... при болезни Пика... (G31.0+)

Диагностические критерии:
A. начало заболевания – между 50 и 60 годами (раннее начало, как правило, обуславливает более злокачественное течение)
B. прогрессирующая деменция с преобладанием симптоматики поражения лобных долей головного мозга: эйфория, расторможенность (или апатия) с огрублением социального поведения, либо беспокойством.
C. на отдаленных этапах болезни – амнезия, афазия, апраксия.

F02.1 ... при болезни Кройтцфельда-Якоба...(A81.0+)

Диагностические критерии:
A. быстро прогрессирующая деменция – от нескольких месяцев до одного двух лет.
B. обширная неврологическая симптоматика – пирамидные и экстрапирамидные нарушения с миоклонусом.
C. характерная трехфазная ЭЭГ.

F02.2 ... при болезни Гентингтона... (G10+)

Диагностические критерии:
A. появление на ранних этапах и сохранение даже на фоне выраженной деменции хореиформных движений.

B. начало, в типичных случаях, на третьем четвертом десятке жизни.
C. медленное прогрессирование (10-15 лет).
D. деменция преимущественно с лобной симптоматикой.
Включается:
– *деменция при хорее Гентингтона*

F02.3 ... при болезни Паркинсона... (G20+)

Деменция как последствие тяжелого течения болезни Паркинсона.
Включается:
– *деменция при дрожательном параличе*
– *деменция при паркинсонизме*

F02.4 ... при болезнях, обусловленных ВИЧ... (B22.0+)

Диагностические критерии:
A. деменция при диагностированном случае ВИЧ-инфекции и отсутствии других причин, обуславливающих деменцию.
B. быстрое развитие (недели, месяцы) болезни до глубокой деменции, мутизма и гибели.
Включается:
– *СПИД-комплекс деменции*
– *ВИЧ – энцефалопатия или подострый энцефалит*

/F02.8/ ... при других, уточненных заболеваниях...(...)

F02.8x0 ...в связи с травмой головного мозга **(S00.- – S09.-+)**[1]
F02.8x2 ...в связи с эпилепсией **(G40.-+)**
F02.8x3 ...в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга **(C70.-+, C72.-+, C79.3+, D32.-+, D33.-+, D43.-+)**
F02.8x5 ...в связи с нейросифилисом **(A50.- – A53.-+)**
F02.8x6 ...в связи с другими вирусными и бактериальными заболеваниями **(A00.- – B99.-+)**
F02.8x7 ...в связи с другими заболеваниями **(...)**
Включается:
– *«гуамский комплекс паркинсонизм – деменция» – быстро развивающаяся деменция с экстрапирамидными расстройствами и латеральным амиотрофическим склерозом;*
деменция при:
– *отравлении окисью углерода* ***(T58.+)***
– *церебральном липидозе* ***(E75.-+)***
– *гепатолентикулярной дегенерации (болезнь Вильсона)* ***(E83.0+)***
– *гиперкальцемии* ***(E83.5+)***
– *гипотиреоидизме, приобретенном* ***(E00. – E02.+)***
– *интоксикациях* ***(T36 – T65+)***
– *рассеяном склерозе* ***(G35+)***
– *дефиците никотиновой кислоты (пеллагре)* ***(E52+)***
– *узелковом полиартрите* ***(M30.0+)***
– *системной красной волчанке* ***(M32.-+)***
– *трипаносомозах (африканский – **B56**, американский – **B57+**)*
– *дефиците витамина B12* ***(E53.8+)***
F02.8x8 ...со смешанным заболеванием **(...)**
F02.8x9 ...с неуточненным заболеванием

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F02 Деменция при болезнях, квалифицированных в других разделах

F02.01 *Деменция при болезни Пика, с другими симптомами, преимущественно бредовыми*
F02.02 *Деменция при болезни Пика, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными*
F02.03 *Деменция при болезни Пика, с другими симптомами, преимущественно депрессивными*
F02.04 *Деменция при болезни Пика, с другими смешанными симптомами*
F02.00 *Деменция при болезни Пика без дополнительных симптомов*
F02.11 *Деменция при болезни Крейтцфельдта-Якоба, с другими симптомами, преимущественно бредовыми*
F02.14 *Деменция при болезни Крейтцфельдта-Якоба, с другими смешанными симптомами*
F02.12 *Деменция при болезни Крейтцфельдта-Якоба, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными*
F02.10 *Деменция при болезни Крейтцфельдта-Якоба без дополнительных симптомов*
F02.13 *Деменция при болезни Крейтцфельдта-Якоба, с другими симптомами, преимущественно депрессивными*
F02.20 *Деменция при болезни Гентингтона без дополнительных симптомов*
F02.21 *Деменция при болезни Гентингтона, с другими симптомами, преимущественно бредовыми*
F02.22 *Деменция при болезни Гентингтона, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными*
F02.23 *Деменция при болезни Гентингтона, с другими симптомами, преимущественно депрессивными*

[1] Полный список основных диагнозов (+) размещен в приложении 1.А.

F02.24 Деменция при болезни Гентингтона, с другими смешанными симптомами
F02.31 Деменция при болезни Паркинсона, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F02.34 Деменция при болезни Паркинсона, с другими смешанными симптомами
F02.30 Деменция при болезни Паркинсона без дополнительных симптомов
F02.33 Деменция при болезни Паркинсона, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F02.32 Деменция при болезни Паркинсона, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F02.40 Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) без дополнительных симптомов
F02.41 Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F02.42 Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F02.43 Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F02.44 Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), с другими смешанными симптомами
F02.800 Деменция в связи с травмой головного мозга без дополнительных симптомов
F02.802 Деменция в связи с эпилепсией без дополнительных симптомов
F02.803 Деменция в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга без дополнительных симптомов
F02.805 Деменция в связи с нейросифилисом без дополнительных симптомов
F02.806 Деменция в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями без дополнительных симптомов
F02.807 Деменция в связи с другими заболеваниями без дополнительных симптомов
F02.808 Деменция в связи со смешанными заболеваниями без дополнительных симптомов
F02.809 Деменция в связи с неуточненными заболеваниями без дополнительных симптомов
F02.810 Деменция в связи с травмой головного мозга, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F02.812 Деменция в связи с эпилепсией, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F02.813 Деменция в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F02.815 Деменция в связи с нейросифилисом, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F02.816 Деменция в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F02.817 Деменция в связи с другими заболеваниями, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F02.818 Деменция в связи со смешанными заболеваниями, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F02.819 Деменция в связи с неуточненными заболеваниями, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F02.820 Деменция в связи с травмой головного мозга, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F02.822 Деменция в связи с эпилепсией, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F02.823 Деменция в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F02.825 Деменция в связи с нейросифилисом, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F02.826 Деменция в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F02.827 Деменция в связи с другими заболеваниями, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F02.828 Деменция в связи со смешанными заболеваниями, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F02.829 Деменция в связи с неуточненными заболеваниями, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F02.830 Деменция в связи с травмой головного мозга, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F02.832 Деменция в связи с эпилепсией, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F02.833 Деменция в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F02.835 Деменция в связи с нейросифилисом, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F02.836 Деменция в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F02.837 Деменция в связи с другими заболеваниями, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F02.838 Деменция в связи со смешанными заболеваниями, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F02.839 Деменция в связи с неуточненными заболеваниями, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F02.840 Деменция в связи с травмой головного мозга, с другими смешанными симптомами
F02.842 Деменция в связи с эпилепсией, с другими смешанными симптомами
F02.843 Деменция в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга, с другими смешанными симптомами
F02.845 Деменция в связи с нейросифилисом, с другими смешанными симптомами
F02.846 Деменция в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями, с другими смешанными симптомами
F02.847 Деменция в связи с другими заболеваниями, с другими смешанными симптомами
F02.848 Деменция в связи со смешанными заболеваниями, с другими смешанными симптомами
F02.849 Деменция в связи с неуточненными заболеваниями, с другими смешанными симптомами

F03 ...неуточненная ...

Применяется, когда состояние отвечает общим критериям деменции, но невозможно уточнить специфический тип

F03.1 ...пресенильная

Включаются деменции у лиц в возрасте от 45 до 64 лет

F03.2 ...сенильная

Включаются деменции у лиц в возрасте от 65 лет и старше

F03. ... Пресенильный психоз

Включаются деменции с пихозом у лиц в возрасте от 45 до 64 лет

F03. ... Сенильный психоз

Включаются деменции с пихозом у лиц в возрасте от 65 лет и старше

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе
F03 Деменция неуточненная

F03.10 Пресенильная деменция неуточненная без дополнительных симптомов
F03.11 Пресенильная деменция неуточненная, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F03.12 Пресенильная деменция неуточненная, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F03.13 Пресенильная деменция неуточненная, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F03.14 Пресенильная деменция неуточненная, с другими смешанными симптомами
F03.20 Сенильная деменция неуточненная без дополнительных симптомов
F03.21 Сенильная деменция неуточненная, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F03.22 Сенильная деменция неуточненная, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F03.23 Сенильная деменция неуточненная, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F03.24 Сенильная деменция неуточненная, с другими смешанными симптомами
F03.30 Пресенильный психоз неуточненный без дополнительных симптомов
F03.31 Пресенильный психоз неуточненный, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F03.32 Пресенильный психоз неуточненный, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными
F03.33 Пресенильный психоз неуточненный, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F03.34 Пресенильный психоз неуточненный, с другими смешанными симптомами
F03.40 Сенильный психоз неуточненный без дополнительных симптомов
F03.44 Сенильный психоз неуточненный, с другими смешанными симптомами
F03.43 Сенильный психоз неуточненный, с другими симптомами, преимущественно депрессивными
F03.41 Сенильный психоз неуточненный, с другими симптомами, преимущественно бредовыми
F03.42 Сенильный психоз неуточненный, с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными

F04 Органический амнестический синдром, не обусловленный алкоголем или другими психоактивными веществами

Диагностические критерии:

A. нарушения памяти на недавние события (снижение способности к усвоению нового материала), антероградная и ретроградная амнезия, снижение способности к воспроизведению событий прошлого в обратном временном порядке;
B. указание на наличие инсульта или других заболеваний головного мозга в анамнезе или по объективным данным (особенно с локализацией в билатерально-диэнцефальных и средне-височных структурах);
C. отсутствие дефектов непосредственного воспроизведения, внимания, сознания, интеллекта в целом.
D. конфабуляторные эмоциональные расстройства, снижение критичности могут сопровождать амнестический синдром, но не являются обязательными для установления диагноза.
E. любой органический амнестический синдром, не обусловленный алкоголем или другим психоактивным веществом, должен быть уточнен причиной его вызвавшей (четвертый знак кода; см. пункт D общих диагностических указаний для органических и симптоматических психических расстройств)

Включается:

– *корсаковский синдром или психоз (неалкогольный)*

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе
F04 Органический амнестический синдром

F04.0 Органический амнестический синдром в связи с травмой головного мозга
F04.1 Органический амнестический синдром в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F04.2 Органический амнестический синдром в связи с эпилепсией
F04.3 Органический амнестический синдром в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F04.4 Органический амнестический синдром в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F04.5 Органический амнестический синдром в связи с нейросифилисом
F04.6 Органический амнестический синдром в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F04.7 Органический амнестический синдром в связи с другими заболеваниями
F04.8 Органический амнестический синдром в связи со смешанными заболеваниями
F04.9 Органический амнестический синдром в связи с неуточненным заболеванием

F05. Делирий, не обусловленный алкоголем или другими психоактивными веществами...

Диагностические критерии:

A. продолжительность – до шести месяцев
B. измененное сознание:
   1. от оглушенности до комы,
   2. снижение способности направлять, фокусировать, поддерживать и переключать внимание;
C. общее расстройство познания:
   1. искаженное восприятие,
   2. иллюзии и галлюцинации, в основном – зрительные,

3. нарушение абстрактного мышления с преходящим бредом или без него с некоторой степенью инкогеренции,
4. расстройство воспроизведения и памяти на недавние события,
5. дезориентировка во времени, в тяжелых случаях – в месте и собственной личности;

D. психомоторные расстройства:
   A. гипо- или гиперактивность с внезапным переходом от одного состояния к другому,
   B. увеличение времени реагирования,
   C. увеличенный или сниженный поток речи,
   D. повышенный рефлекс четверохолмия;

E. любой делирий должен быть уточнен причиной его вызвавшей (пятый знак кода; см. пункт D общих диагностических указаний для органических и симптоматических психических расстройств)

Включается:
- *острое состояние спутанности неалкогольное*
- *острый мозговой синдром*
- *острый психоорганический синдром*
- *острый инфекционный психоз*
- *острая органическая реакция*

/F05.0/ ...возникший на фоне деменции.

/F05.1/ ...возникший не на фоне деменции.

/F05.8/ ...другой.

Включается:
- *делирий смешанной этиологии*
- *подострое состояние спутанности или делирий*

/F05.9/ ...неуточненный.

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F05 Делирий не обусловленный алкоголем или другими психоактивными веществами

F05.00	*Делирий не на фоне деменции в связи с травмой головного мозга*
F05.01	*Делирий не на фоне деменции в связи с сосудистым заболеванием головного мозга*
F05.02	*Делирий не на фоне деменции в связи с эпилепсией*
F05.03	*Делирий не на фоне деменции в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга*
F05.04	*Делирий не на фоне деменции в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)*
F05.05	*Делирий не на фоне деменции в связи с нейросифилисом*
F05.06	*Делирий не на фоне деменции в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями*
F05.07	*Делирий не на фоне деменции в связи с другими заболеваниями*
F05.08	*Делирий не на фоне деменции в связи со смешанными заболеваниями*
F05.09	*Делирий не на фоне деменции в связи с неуточненным заболеванием*
F05.10	*Делирий на фоне деменции в связи с травмой головного мозга*
F05.11	*Делирий на фоне деменции в связи с сосудистым заболеванием головного мозга*
F05.12	*Делирий на фоне деменции в связи с эпилепсией*
F05.13	*Делирий на фоне деменции в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга*
F05.14	*Делирий на фоне деменции в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)*
F05.15	*Делирий на фоне деменции в связи с нейросифилисом*
F05.16	*Делирий на фоне деменции в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями*
F05.17	*Делирий на фоне деменции в связи с другими заболеваниями*
F05.18	*Делирий на фоне деменции в связи со смешанными заболеваниями*
F05.19	*Делирий на фоне деменции в связи с неуточненным заболеванием*
F05.80	*Другой делирий в связи с травмой головного мозга*
F05.81	*Другой делирий в связи с сосудистым заболеванием головного мозга*
F05.82	*Другой делирий в связи с эпилепсией*
F05.83	*Другой делирий в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга*
F05.84	*Другой делирий в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)*
F05.85	*Другой делирий в связи с нейросифилисом*
F05.86	*Другой делирий в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями*
F05.87	*Другой делирий в связи с другими заболеваниями*
F05.88	*Другой делирий в связи со смешанными заболеваниями*
F05.89	*Другой делирий в связи с неуточненным заболеванием*
F05.90	*Неуточненный делирий в связи с травмой головного мозга*
F05.91	*Неуточненный делирий в связи с сосудистым заболеванием головного мозга*
F05.92	*Неуточненный делирий в связи с эпилепсией*
F05.93	*Неуточненный делирий в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга*
F05.94	*Неуточненный делирий в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)*
F05.95	*Неуточненный делирий в связи с нейросифилисом*
F05.96	*Неуточненный делирий в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями*
F05.97	*Неуточненный делирий в связи с другими заболеваниями*
F05.98	*Неуточненный делирий в связи со смешанными заболеваниями*
F05.99	*Неуточненный делирий в связи с неуточненным заболеванием*

F06 Другие психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного мозга, либо вследствие физической болезни...

Общие диагностические указания:

A. наличие болезни, повреждения или дисфункции головного мозга или системного физического заболевания причинно обуславливающего психические расстройства;
B. временн´ая связь между развитием основного заболевания и развития психического расстройства;
C. редукция психического расстройства с выздоровлением от основного заболевания или со значительным его облегчением;
D. отсутствие данных о других причинах психического расстройства.
E. **риск возникновения** синдромов, классифицированных в разделе **F06** чаще связан со следующим заболеваниями (коды в приложении.1):
   - эпилепсия
   - лимбический энцефалит
   - болезнь Гентингтона
   - травма головного мозга
   - новообразование мозга
   - экстракраниальная неоплазма с отдаленными последствиями для ЦНС (в особенности карцинома поджелудочной железы)
   - цереброваскулярные заболевания, повреждения и пороки развития
   - системная красная волчанка и другие коллагенозы
   - эндокринные заболевания (особенно гипо- и гипертериоз, болезнь Кушинга)
   - обменные заболевания
   - тропические инфекционные и паразитарные заболевания
   - токсический эффект непсихотропных препаратов.
F. любое органическое расстройство этой диагностической группы должно быть уточнено причиной его вызвавшей (пятый или шестой знак кода; см. пункт D общих диагностических указаний для органических и симптоматических психических расстройств)

Исключаются:
- *деменции (F00 – F03)*
- *делирий (F05.-)*

/F06.0/ Органический галлюциноз...

Диагностические критерии:

A. общие критерии F06,
B. постоянный или рецидивирующий галлюциноз,
C. отсутствие помраченного сознания,
D. отсутствие выраженных интеллектуальных расстройств,
E. отсутствие доминирующих расстройств настроения и доминирующего бреда (при возможной бредовой трактовке галлюцинаций)

Включается:
- *дерматозойный бред*
- *органическое неалкогольное галлюцинаторное состояние*

/F06.1/ Органическое кататоническое...

Диагностические критерии:

A. общие критерии F06,
B. ступор (уменьшение или полное отсутствие спонтанных движений с частичным или полным мутизмом, негативизмом и застыванием),
C. возбуждение (общая гиперактивность с агрессивными тенденциями или без них),
D. внезапно сменяющие друг друга ступор и возбуждение.
E. надежность диагноза увеличивается в случае присутствия феноменов стереотипии, «восковой гибкости» и импульсивных поведенческих актов

Исключаются:
- *кататоническая шизофррения (F20.2);*
- *диссоциативный ступор (F44.2);*
- *ступор БДУ (R40.1).*

/F06.2/ Органическое бредовое (шизофреноподобное)...

Диагностические критерии:

A. общие критерии F06,
B. бред различного содержания

C. возможное присутствие галлюцинаций, расстройств мышления и отдельные кататонические феномены при сохранных сознания и памяти.
D. не следует устанавливать диагноз F06.2 в случае органических симптомов неспецифического характера и «мягких» неврологических знаках.

Включается:
- *параноидные или галлюцинаторно-параноидные органические состояния*
- *шизофреноподобный психоз при эпилепсии*

Исключаются:
- *острые и транзиторные психотические расстройства (F23.-);*
- *обусловленные наркотиками психотические расстройства (F1x.5);*
- *хроническое бредовое расстройство (F22.-);*
- *шизофрения (F20.-).*

/F06.3/ Органическое аффективное...

Диагностические критерии:
A. общие критерии F06,
B. одно из состояний, удовлетворяющих требованиям диагноза, указанных в F30 – F33 (Аффективные расстройства).
C. уточняется пятым знаком:
/F06.30/ ...психотическое маниакальное.
/F06.31/ ...психотическое биполярное.
/F06.32/ ...психотическое депрессивное.
/F06.33/ ...психотическое смешанное.
/F06.34/ ...гипоманиакальное.
/F06.35/ ...непсихотическое биполярное.
/F06.36/ ...непсихотическое депрессивное.
/F06.37/ ...непсихотическое смешанное.

Исключаются:
- *(аффективные) расстройства настроения, неорганической природы или неуточнеиные (F30-F39);*
- *правополушарные аффективные расстройства (F07.8).*

/F06.4/ Органическое тревожное...

Диагностические критерии:
A. общие критерии F06,
B. основные диагностические критерии тревожного (F41.1), панического (F41.0) расстройств или их сочетание.

Исключаются:
- *тревожные расстройства, неорганической природы или неуточненные(F41.-)*

/F06.5/ ...диссоциативное.

Диагностические критерии:
A. общие критерии F06,
B. основные диагностические критерии диссоциативных конверсионных расстройств (F44).

Исключаются :
- *диссоциативные (конверсионные) расстройства неорганической природы или неуточненные (F44.-).*

/F06.6/ ...астеническое.

Диагностические критерии:
A. общие критерии F06,
B. выраженная и постоянная эмоциональная несдержанность, утомляемость, неприятные физические ощущения, боли.

Исключаются:
- *соматоформные расстройства неорганической природы или неуточненные (F45.-).*

/F06.7/ ...легкое когнитивное.

Диагностические критерии:
A. снижение когнитивной продукции
B. ухудшение памяти, трудности обучения, сосредоточения внимания, однако их выраженность такова, что нельзя выставить диагноз деменция (F00 – F03), органическая амнезия (F04) или делирий (F05).

/F06.8/ ...другие.

Должна быть указана глубина психических расстройств:

/F06.81/ ...психотическое расстройство

/F06.82/ ...непсихотическое расстройство

Включается:

– *эпилептический психоз БДУ*

/F06.9/ ...неуточненные.

Должна быть указана глубина психических расстройств:

/F06.91/ ...психотическое расстройство

/F06.92/ ...непсихотическое расстройство

/F06.99/ ...неуточненное

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F06 Другие психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции, либо вследствие физической болезни

F06.00 *Галлюциноз в связи с травмой головного мозга*
F06.01 *Галлюциноз в связи с сосудистым заболеванием головного мозга*
F06.02 *Галлюциноз в связи с эпилепсией*
F06.03 *Галлюциноз в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга*
F06.04 *Галлюциноз в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)*
F06.05 *Галлюциноз в связи с нейросифилисом*
F06.06 *Галлюциноз в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями*
F06.07 *Галлюциноз в связи с другими заболеваниями*
F06.08 *Галлюциноз в связи со смешанными заболеваниями*
F06.09 *Галлюциноз в связи с неуточненным заболеванием*
F06.10 *Кататоническое состояние в связи с травмой головного мозга*
F06.11 *Кататоническое состояние в связи с сосудистым заболеванием головного мозга*
F06.12 *Кататоническое состояние в связи с эпилепсией*
F06.13 *Кататоническое состояние в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга*
F06.14 *Кататоническое состояние в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)*
F06.15 *Кататоническое состояние в связи с нейросифилисом*
F06.16 *Кататоническое состояние в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями*
F06.17 *Кататоническое состояние в связи с другими заболеваниями*
F06.18 *Кататоническое состояние в связи со смешанными заболеваниями*
F06.19 *Кататоническое состояние в связи с неуточненным заболеванием*
F06.20 *Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи с травмой головного мозга*
F06.21 *Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга*
F06.22 *Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи с эпилепсией*
F06.23 *Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга*
F06.24 *Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)*
F06.25 *Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи с нейросифилисом*
F06.26 *Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями*
F06.27 *Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи с другими заболеваниями*
F06.28 *Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи со смешанными заболеваниями*
F06.29 *Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи с неуточненным заболеванием*
F06.300 *Психотическое маниакальное расстройство в связи с травмой головного мозга*
F06.301 *Психотическое маниакальное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга*
F06.302 *Психотическое маниакальное расстройство в связи с эпилепсией*
F06.303 *Психотическое маниакальное расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга*
F06.304 *Психотическое маниакальное расстройство в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)*
F06.305 *Психотическое маниакальное расстройство в связи с нейросифилисом*
F06.306 *Психотическое маниакальное расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями*
F06.307 *Психотическое маниакальное расстройство в связи с другими заболеваниями*
F06.308 *Психотическое маниакальное расстройство в связи со смешанными заболеваниями*
F06.309 *Психотическое маниакальное расстройство в связи с неуточненным заболеванием*
F06.310 *Психотическое биполярное расстройство в связи с травмой головного мозга*
F06.311 *Психотическое биполярное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга*
F06.312 *Психотическое биполярное расстройство в связи с эпилепсией*
F06.313 *Психотическое биполярное расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга*
F06.314 *Психотическое биполярное расстройство в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)*
F06.315 *Психотическое биполярное расстройство в связи с нейросифилисом*
F06.316 *Психотическое биполярное расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями*
F06.317 *Психотическое биполярное расстройство в связи с другими заболеваниями*
F06.318 *Психотическое биполярное расстройство в связи со смешанными заболеваниями*
F06.319 *Психотическое биполярное расстройство в связи с неуточненным заболеванием*
F06.320 *Психотическое депрессивное расстройство в связи с травмой головного мозга*
F06.321 *Психотическое депрессивное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга*
F06.322 *Психотическое депрессивное расстройство в связи с эпилепсией*
F06.323 *Психотическое депрессивное расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга*
F06.324 *Психотическое депрессивное расстройство в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)*
F06.325 *Психотическое депрессивное расстройство в связи с нейросифилисом*
F06.326 *Психотическое депрессивное расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями*
F06.327 *Психотическое депрессивное расстройство в связи с другими заболеваниями*
F06.328 *Психотическое депрессивное расстройство в связи со смешанными заболеваниями*
F06.329 *Психотическое депрессивное расстройство в связи с неуточненным заболеванием*

F06.330 Психотическое смешанное расстройство в связи с травмой головного мозга
F06.331 Психотическое смешанное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.332 Психотическое смешанное расстройство в связи с эпилепсией
F06.333 Психотическое смешанное расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.334 Психотическое смешанное расстройство в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.335 Психотическое смешанное расстройство в связи с нейросифилисом
F06.336 Психотическое смешанное расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.337 Психотическое смешанное расстройство в связи с другими заболеваниями
F06.338 Психотическое смешанное расстройство в связи со смешанными заболеваниями
F06.339 Психотическое смешанное расстройство в связи с неуточненным заболеванием
F06.340 Гипоманиакальное расстройство в связи с травмой головного мозга
F06.341 Гипоманиакальное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.342 Гипоманиакальное расстройство в связи с эпилепсией
F06.343 Гипоманиакальное расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.344 Гипоманиакальное расстройство в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.345 Гипоманиакальное расстройство в связи с нейросифилисом
F06.346 Гипоманиакальное расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.347 Гипоманиакальное расстройство в связи с другими заболеваниями
F06.348 Гипоманиакальное расстройство в связи со смешанными заболеваниями
F06.349 Гипоманиакальное расстройство в связи с неуточненным заболеванием
F06.350 Непсихотическое биполярное расстройство в связи с травмой головного мозга
F06.351 Непсихотическое биполярное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.352 Непсихотическое биполярное расстройство в связи с эпилепсией
F06.353 Непсихотическое биполярное расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.354 Непсихотическое биполярное расстройство в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.355 Непсихотическое биполярное расстройство в связи с нейросифилисом
F06.356 Непсихотическое биполярное расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.357 Непсихотическое биполярное расстройство в связи с другими заболеваниями
F06.358 Непсихотическое биполярное расстройство в связи со смешанными заболеваниями
F06.359 Непсихотическое биполярное расстройство в связи с неуточненным заболеванием
F06.360 Непсихотическое депрессивное расстройство в связи с травмой головного мозга
F06.361 Непсихотическое депрессивное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.362 Непсихотическое депрессивное расстройство в связи с эпилепсией
F06.363 Непсихотическое депрессивное расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.364 Непсихотическое депрессивное расстройство в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.365 Непсихотическое депрессивное расстройство в связи с нейросифилисом
F06.366 Непсихотическое депрессивное расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.367 Непсихотическое депрессивное расстройство в связи с другими заболеваниями
F06.368 Непсихотическое депрессивное расстройство в связи со смешанными заболеваниями
F06.369 Непсихотическое депрессивное расстройство в связи с неуточненным заболеванием
F06.370 Непсихотическое смешанное расстройство в связи с травмой головного мозга
F06.371 Непсихотическое смешанное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.372 Непсихотическое смешанное расстройство в связи с эпилепсией
F06.373 Непсихотическое смешанное расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.374 Непсихотическое смешанное расстройство в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.375 Непсихотическое смешанное расстройство в связи с нейросифилисом
F06.376 Непсихотическое смешанное расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.377 Непсихотическое смешанное расстройство в связи с другими заболеваниями
F06.378 Непсихотическое смешанное расстройство в связи со смешанными заболеваниями
F06.379 Непсихотическое смешанное расстройство в связи с неуточненным заболеванием
F06.40 Органическое тревожное расстройство в связи с травмой головного мозга
F06.41 Органическое тревожное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.42 Органическое тревожное расстройство в связи с эпилепсией
F06.43 Органическое тревожное расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.44 Органическое тревожное расстройство в связи с виру сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.45 Органическое тревожное расстройство в связи с нейросифилисом
F06.46 Органическое тревожное расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.47 Органическое тревожное расстройство в связи с другими заболеваниями
F06.48 Органическое тревожное расстройство в связи со смешанными заболеваниями
F06.49 Органическое тревожное расстройство в связи с неуточненным заболеванием
F06.50 Органическое диссоциативное расстройство в связи с травмой головного мозга
F06.51 Органическое диссоциативное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.52 Органическое диссоциативное расстройство в связи с эпилепсией
F06.53 Органическое диссоциативное расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.54 Органическое диссоциативное расстройство в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.55 Органическое диссоциативное расстройство в связи с нейросифилисом
F06.56 Органическое диссоциативное расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.57 Органическое диссоциативное расстройство в связи с другими заболеваниями
F06.58 Органическое диссоциативное расстройство в связи со смешанными заболеваниями
F06.59 Органическое диссоциативное расстройство в связи с неуточненным заболеванием
F06.60 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство в связи с травмой головного мозга
F06.61 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.62 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство в связи с эпилепсией
F06.63 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство в связи с новообразованием (опухолью) голов-ного мозга
F06.64 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство в связи с вирусом иммунодефицита чело века (ВИЧ-инфекция)
F06.65 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство в связи с нейросифилисом
F06.66 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.67 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство в связи с другими заболеваниями
F06.68 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство в связи со смешанными заболеваниями

F06.69 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство в связи с неуточненным заболеванием
F06.70 Легкое когнитивное расстройство в связи с травмой головного мозга
F06.71 Легкое когнитивное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.72 Легкое когнитивное расстройство в связи с эпилепсией
F06.73 Легкое когнитивное расстройство в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.74 Легкое когнитивное расстройство в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.75 Легкое когнитивное расстройство в связи с нейросифилисом
F06.76 Легкое когнитивное расстройство в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.77 Легкое когнитивное расстройство в связи с другими заболеваниями
F06.78 Легкое когнитивное расстройство в связи со смешанны ми заболеваниями
F06.79 Легкое когнитивное расстройство в связи с неутонченным заболеванием
F06.810 Другие психотические расстройства в связи с травмой головного мозга
F06.811 Другие психотические расстройства в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.812 Другие психотические расстройства в связи с эпилепсией
F06.813 Другие психотические расстройства в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.814 Другие психотические расстройства в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.815 Другие психотические расстройства в связи с нейросифилисом
F06.816 Другие психотические расстройства в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.817 Другие психотические расстройства в связи с другими заболеваниями
F06.818 Другие психотические расстройства в связи со смешанными заболеваниями
F06.819 Другие психотические расстройства в связи с неуточненным заболеванием
F06.820 Другие непсихотические расстройства в связи с травмой головного мозга
F06.821 Другие непсихотические расстройства в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.822 Другие непсихотические расстройства в связи с эпилепсией
F06.823 Другие непсихотические расстройства в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.824 Другие непсихотические расстройства в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.825 Другие непсихотические расстройства в связи с нейросифилисом
F06.826 Другие непсихотические расстройства в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.827 Другие непсихотические расстройства в связи с другими заболеваниями
F06.828 Другие непсихотические расстройства в связи со смешанными заболеваниями
F06.829 Другие непсихотические расстройства в связи с неуточненным заболеванием
F06.910 Неуточненные психотические расстройства в связи с травмой головного мозга
F06.911 Неуточненные психотические расстройства в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.912 Неуточненные психотические расстройства в связи с эпилепсией
F06.913 Неуточненные психотические расстройства в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.914 Неуточненные психотические расстройства в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.915 Неуточненные психотические расстройства в связи с нейросифилисом
F06.916 Неуточненные психотические расстройства в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.917 Неуточненные психотические расстройства в связи с другими заболеваниями
F06.918 Неуточненные психотические расстройства в связи со смешанными заболеваниями
F06.920 Неуточненные непсихотические расстройства в связи с травмой головного мозга
F06.921 Неуточненные непсихотические расстройства в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.922 Неуточненные непсихотические расстройства в связи с эпилепсией
F06.923 Неуточненные непсихотические расстройства в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.924 Неуточненные непсихотические расстройства в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.925 Неуточненные непсихотические расстройства в связи с нейросифилисом
F06.926 Неуточненные непсихотические расстройства в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.927 Неуточненные непсихотические расстройства в связи с другими заболеваниями
F06.928 Неуточненные непсихотические расстройства в связи со смешанными заболеваниями
F06.929 Неуточненные непсихотические расстройства в связи с неуточненным заболеванием
F06.990 Неуточненные психические расстройства в связи с травмой головного мозга
F06.991 Неуточненные психические расстройства в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F06.992 Неуточненные психические расстройства в связи с эпилепсией
F06.993 Неуточненные психические расстройства в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F06.994 Неуточненные психические расстройства в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F06.995 Неуточненные психические расстройства в связи с нейросифилисом
F06.996 Неуточненные психические расстройства в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F06.997 Неуточненные психические расстройства в связи с другими заболеваниями
F06.998 Неуточненные психические расстройства в связи со смешанными заболеваниями
F06.999 Неуточненные психические расстройства в связи с неуточненным заболеванием

F07. Расстройства личности и поведения ...вследствие болезни, повреждения или дисфункции головного мозга

A. сопровождают или возникают как резидуальные при болезнях, повреждении или дисфункциях головного мозга
B. любое органическое расстройство этой диагностической группы должно быть уточнено причиной его вызвавшей (пятый знак кода; см. пункт D общих диагностических указаний для органических и симптоматических психических расстройств)

/F07.0/ Расстройство личности...

Диагностические критерии:
A. Значительное, необратимое изменение преморбидного поведения, выражающееся преимущественно в сферах эмоций, влечений, потребностей, планирования и предвидения.
B. существенное снижение способности целенаправленной деятельности, особенно в случаях, когда не-

обходимо затратить много времени и усилий для достижения успеха;
C. эмоциональная лабильность, кратковременные приступы злобы и агрессии, эйфория, апатия;
D. стремление удовлетворять потребности и влечения без учета последствий и социальных ограничений;
E. когнитивные нарушения:
   1. подозрительность,
   2. идеи отношения, преследования,
   3. монотематическая умственная жвачка;
F. вязкость, обстоятельность, как в устной, так и письменной речи;
G. нарушение сексуального поведения (гипо- или гиперсексуальность, изменение сексуальных предпочтений).
H. для установления достоверного диагноза требуется два и более из признаков A – F.
I. любое органическое расстройство личности должно быть уточнено причиной его вызвавшей (пятый знак кода; см. пункт D общих диагностических указаний для органических и симптоматических психических расстройств)

Включаются:
- *синдром лобной доли;*
- *личностный синдром лимбической эпилепсии;*
- *синдром последствий лоботомии;*
- *состояние после лейкотомии;*
- *органическая псевдоолигофреническая личность;*
- *органическая псевдопсихопатическая личность.*

Исключаются:
- *хронические изменения личности после переживания катастроф (F62.0)*
- *хронические изменения личности после психической болезни (F62.1)*
- *посткоммоционный синдром (F07.2);*
- *постэнцефалитический синдром (F07.1);*
- *специфические расстройства личности (F60.-).*

/F07.1/ Постэнцефалитический синдром...

Диагностические критерии:
A. обратимый неспецифический синдром, клинические проявления которого зависят от возбудителя энцефалита и от возраста больного.
B. общее недомогание, апатия или раздражительность;
C. легкая когнитивная дисфункция;
D. нарушения в сфере мотиваций и влечений;
E. нарушение сна;
F. нарушение аппетита;
G. различные резидуальные неврологические дисфункции.
H. любой постэнцефалитический синдром должен быть уточнен причиной его вызвавшей (пятый знак кода):
   F07.14 – ...в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)
   F07.15 – ... в связи с нейросифилисом
   F07.16 – ... в связи с другими вирусными и бактериальными заболеваниями
   F07.18 – ... в связи со смешанными заболеваниями
   F07.19 – ... в связи с неуточненными заболеваниями

Исключается:
- *органическое расстройство личности (F07.0).*

/F07.2/ Посткоммоционный синдром...

Диагностические критерии:
A. Возникает вслед за травмой головы (с потерей сознания)
B. Для установления достоверного диагноза достаточно трех из перечисленных симптомов.
   1. головная боль;
   2. головокружения;
   3. утомляемость, особенно при умственном напряжении;
   4. легкие мнестические нарушения;
   5. снижение толерантности к стрессу, эмоциональным нагрузкам;
   6. снижение толерантности к алкоголю;
   7. ипохондричность, госпитализм.
C. Увеличивает достоверность диагноза данные параклинических исследований.

Включается:
- *посткоммоционный синдром (энцефалопатия)*
- *посттравматический мозговой синдром, непсихотический*

/F07.8/ Другие...

Диагностические критерии:

A. болезни, которые обнаруживают соответствующие признаки личностных или поведенческих расстройств органического генеза, но не могут быть квалифицированы в предыдущих рубриках.

B. не достигающие степени деменции легкие когнитивные расстройства при атрофических церебральных заболеваниях (Альцгеймера, Паркинсона...)

Исключается:

- *делирий (F05.-).*

/F07.9/ Неуточненные...

Включается:

- *органический психосиндром.*

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F07 Расстройства личности и поведения вследствие повреждения или дисфункции, либо вследствие физической болезни

F07.00 Расстройство личности в связи с травмой головного мозга
F07.01 Расстройство личности в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F07.02 Расстройство личности в связи с эпилепсией
F07.03 Расстройство личности в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F07.04 Расстройство личности в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F07.05 Расстройство личности в связи с нейросифилисом
F07.06 Расстройство личности в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F07.07 Расстройство личности в связи с другими заболевания ми
F07.08 Расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями
F07.09 Расстройство личности в связи с неуточненным заболеванием
F07.14 Постэнцефалитический синдром в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F07.15 Постэнцефалитический синдром в связи с нейросифилисом
F07.16 Постэнцефалитический синдром в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F07.18 Постэнцефалитический синдром в связи со смешанными заболеваниями
F07.19 Постэнцефалитический синдром в связи с неуточненной нейроинфекцией
F07.2 Постконтузионный (посткоммоционный) синдром
F07.80 Другие органические расстройства личности и поведения в связи с травмой головного мозга
F07.81 Другие органические расстройства личности и поведения в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F07.82 Другие органические расстройства личности и поведения в связи с эпилепсией
F07.83 Другие органические расстройства личности и поведения в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F07.84 Другие органические расстройства личности и поведения в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F07.85 Другие органические расстройства личности и поведения в связи с нейросифилисом
F07.86 Другие органические расстройства личности и поведения в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F07.87 Другие органические расстройства личности и поведения в связи с другими заболеваниями
F07.88 Другие органические расстройства личности и поведения в связи со смешанными заболеваниями
F07.89 Другие органические расстройства личности и поведения в связи с неуточненным заболеванием
F07.90 Неуточненное органическое расстройство личности и поведения в связи с травмой головного мозга
F07.91 Неуточненное органическое расстройство личности и поведения в связи с сосудистым заболеванием головного мозга
F07.92 Неуточненное органическое расстройство личности и поведения в связи с эпилепсией
F07.93 Неуточненное органическое расстройство личности и поведения в связи с новообразованием (опухолью) головного мозга
F07.94 Неуточненное органическое расстройство личности и поведения в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
F07.95 Неуточненное органическое расстройство личности и поведения в связи с нейросифилисом
F07.96 Неуточненное органическое расстройство личности и поведения в связи с другими вирусными и бактериальными нейроинфекциями
F07.97 Неуточненное органическое расстройство личности и поведения в связи с другими заболеваниями
F07.98 Неуточненное органическое расстройство личности и поведения в связи со смешанными заболеваниями
F07.99 Неуточненное органическое расстройство личности и поведения в связи с неуточненным заболеванием

F09. Неуточненные органические или симптоматические психические расстройства


Любое органическое расстройство этой диагностической группы должно быть уточнено причиной его вызвавшей (четвертый знак кода; см. пункт D общих диагностических указаний для органических и симптоматических психических расстройств)

Включаются :

- *органический психоз БДУ;*
- *симптоматический психоз БДУ.*

Исключается:

- *психоз БДУ (F29).*


F10 – F19
Психические расстройства и расстройства поведения связанные с (вызванные) употреблением психоактивных веществ
F10 ...алкоголя
F11 ...опиоидов
F12 ...каннабиоидов
F13 ...седативных или снотворных веществ
F13.-Т...токсикомания
F13.-Н...наркомания
F14 ...кокаина
F15 ...других стимуляторов, включая кофеин
F15.-Т...токсикомания
F15.-Н...наркомания
F16 ...галлюциногенов
F16.-Т...токсикомания
F16.-Н...наркомания
F17 ...табака
F18 ...летучих растворителей
F18.-Т...токсикомания
F18.-Н...наркомания
F19 ...сочетанным употреблением наркотиков и других психоактивных веществ
F19.-Т...токсикомания
F19.-Н...наркомания
F1x.0 Острая интоксикация...
F1x.00...неосложненная...
F1x.01...с травмой или другими телесными повреждениями...
F1x.02...с другими медицинскими осложнениями...
F1x.03...с делирием...
F1x.04...с нарушениями восприятия...
F1x.05...с комой...
F1x.06...с судорогами...
F10.07 Патологическое опьянение
F1x.08...с другими осложнениями
F1x.09...с неуточненными осложнениями
F10.0x1...опьянение легкой степени
F10.0x2 ...опьянение средней степени
F10.0x3 ...опьянение тяжелой степени
F1x.1 Неоднократное употребление... с вредными последствиями
F1x.2 Синдром зависимости от...
F1x.20...в настоящее время воздержание (ремиссия)
F1x.21...в настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление
F1x.22...в настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии
F1x.23...в настоящее время воздержание, но на фоне терапии аверсивными или блокирующими средствами
F1x.24...употребление в настоящее время (активная зависимость)
F1x.25...систематическое (постоянное) употребление
F1x.26...периодическое употребление
F1x.29...периодическое употребление БДУ
F1x.2x1 ...начальная (первая) стадия
F1x.2x2 ...средняя (вторая) стадия
F1x.2x3 ...конечная (третья) стадия
F1x.2x9 ...стадия неизвестна
F1x.3 Абстинентное состояние (синдром отмены)
F1x.30...неосложненное...
F1x.31...с судорожными припадками
F1x.39...БДУ
F1x.4 Абстинентное состояние (синдром отмены) ...с делирием
F1x.40...«классическим»...
F1x.41...судорожными припадками
F1x.42...мусситирующим («бормочущим»)
F1x.43...«профессиональным»...
F1x.44...люцидным (без галлюцинаций)...
F1x.45...абортивным...
F1x.08...другим
F1x.09...неуточненным
F1x.5 Психотическое расстройство...
F1x.50...шизофреноподобное...
F1x.51...преимущественно бредовое...
F1x.52...преимущественно галлюцинаторное...
F1x.53...полиморфное...
F1x.54...преимущественно депрессивное...
F1x.55...преимущественно маниакальное...
F1x.6 Амнестический синдром
F1x.7 Резидуальные и отсроченные...
F1x.70...«флешбек»...
F1x.71...личности и поведения...
F1x.72...аффективное...
F1x.73...деменция...
F1x.74...другое стойкое когнитивное нарушения...
F1x.75...психотическое с поздним дебютом
F1x.8 ...другое
F1x.81 ...психотическое
F1x.82 ...непсихотическое
F1x.9 ...неуточненное
F1x.91 ...псиотическое
F1x.92 ...непсихотическое
F1x.99 ...неуточненное

F10 – F19 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с (вызванные) употреблением психоактивных веществ

Общие диагностические указания:

A. Диагностические группы различаются по психоактивному веществу или группе веществ, вследствие употребления которых развиваются психические или поведенческие расстройства, а именно…

F10 …алкоголя
F11 …опиоидов
F12 …каннабиоидов
F13 …седативных или снотворных веществ
F14 …кокаина
F15 …других стимуляторов, включая кофеин
F16 …галлюциногенов
F17 …табака
F18 …летучих растворителей
F19 …сочетанного употребления наркотиков и других психоактивных веществ

B. заключение об употребляемом веществе делается по субъективным и/или объективным данным, но, желательно по сведениям, полученным более чем от одного человека

C. в случае употребления больным более чем одного вещества или сомнений в сведениях об употребляемом веществе, диагноз устанавливается по веществу (или классу веществ), которое употреблялось наиболее часто.

D. в случае хаотичного приема психоактивных веществ, когда последствия употребления клинически неразделимы, применяется код – F19

E. случаи психических расстройств, вызванных психоактивными веществами, но без признаков расстройств, указанных в настоящем разделе, кодируются шифрами раздела **F00 – F09**.

F. степень связи расстройств с алкоголем может дополняться обозначением кодов из XX главы МКБ-10:

Y90 – доказательство присутствия алкоголя путем анализа крови
Y91 – доказательство присутствия алкоголя путем определения уровня интоксикации

G. в случаях зависимости от психоактивных веществ, относящихся к группам:

F13.- …седативные и снотворные средства
F15.- …стимуляторы
F16.- …галлюциногены
F18.- …летучие растворители
F19.- …сочетанное употребление нескольких психоактивных веществ

H. диагноз «*наркомания*» устанавливается только в том случае, если психоактивное вещество включено в официальный *«Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. (Списки I, II и III)»*[1] (приложение 2); в этом случае в коде психического расстройства на пятой, шестой или седьмой позиции ставится русская буква «**Н**»

I. в противном случае расстройство квалифицируется как «токсикомания», и на пятую, шестую или седьмую позицию кода ставится русская буква «Т»

J. в случаях зависимости от психоактивных веществ, входящих в группы

F11.- …опиоиды
F12.- …каннабиоиды
F14.- …кокаин

K. традиционно отнесенных к наркотикам буква «Н» не ставится

L. в случая зависимости от алкоголя (**F10.-**) или табака (**F17.-**) буквы «**Т**» и «**Н**» не применяются

/F1x.0/ Острая интоксикация…

Диагностические критерии:

A. острая интоксикация – преходящее состояние, наступающее вслед за приемом психоактивного вещества, приводящее к расстройствам сознания, когнитивных функций, восприятия, эмоций, поведения и/или иных психофизиологических функций и реакций.

B. данный диагноз применяется в случаях, когда интоксикация не сопровождается более стойкими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (**F1x.1** – употребление с вредными последствиями, **F1x.2** – синдром зависимости, **F1x.5** – психотическое расстройство).

C. острая интоксикация находится в прямой зависимости от принятого вещества и, в ряде случаев, от физического состояния больного (непропорциональный дозе острый интоксикационный эффект); уро-

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998г. № 681

вень расторможенности может не соответствовать уровню интоксикации, а обуславливаться социальными обстоятельствами

D. симптомы интоксикации:
   1. могут отражать или не отражать первичное действие психоактивного вещества
   2. могут отражать парадоксальное действие психоактивного вещества
   3. могут носить непредсказуемый характер (каннабис, галлюциногены)
   4. могут зависеть от дозы психоактивного вещества

E. диагноз острой интоксикации может быть уточнен, в зависимости от наличия осложнений. В этом случае код диагноза дополняется пятым знаком:
   F1x.00 – ...без осложнений
   F1x.01 – ...с травмой или другими телесными повреждениями
   F1x.02 – ...с другими медицинскими осложнениями, например с кровавой рвотой, вдыханием рвотных масс
   F1x.03 – ...с делирием (не применяется для **F10**)
   F1x.04 – ...с расстройствами восприятия
   F1x.05 – ...с комой
   F1x.06 – ...с судорогами
   F1x.07 – ...патологическое опьянение[1]

F. острая интоксикация вследствие приема алкоголя – опьянение, уточняется по его степени:
   F10.0x1 – ...опьянение легкой степени
   F10.0x2 – ...опьянение средней степени
   F10.0x3 – ...опьянение тяжелой степени

F1x.1 Неоднократное употребление ... с вредными последствиями

Диагностические критерии:

A. не являются основанием для постановки данного диагноза непосредственный ущерб физическому или психическому здоровью, вызванный употреблением психоактивного вещества; социально негативные последствия

B. не являются основанием для установки диагноза употребления с вредными последствиями явления острой интоксикации или состояние «похмелья» (**F1x.0**), психотическое расстройство (**F1x.5**) или иное специфическое расстройство, кодируемое в разделе **F1**.

/F1x.2/ Синдром зависимости от...

Диагностические критерии:

A. сочетание физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, при которых употребление психоактивного вещества или класса веществ занимает в системе ценностей больного ведущее место.

B. диагноз зависимости может быть поставлен только при наличии трех или более из ниже перечисленных симптомов в течение некоторого времени за предыдущий год:
   1. сильная (иногда непреодолимая) потребность принять психоактивное вещество
   2. нарушение способности контролировать длительность приема и дозировку вещества
   3. физиологическое состояние отмены (**F1x.3** и **F1x.4**), характерного для данного вещества, когда прием вещества был прекращен или значительно снижен
   4. использование другого вещества для облегчения или избежания синдром отмены
   5. признаки толерантности, такие как повышение дозы вещества, для достижения такого эффекта, который достигался раньше меньшей дозой
   6. прогрессирующее забвение других интересов и удовольствий, кроме употребления вещества; все больше времени посвящается добыванию, приему и восстановлению после приема вещества
   7. продолжение приема вещества, не смотря на негативные последствия (при осознании связи между приемом и последствиями)

C. характер синдрома зависимости в настоящее время уточняется пятым знаком:
   F1x.20 ...в настоящее время воздержание
   F1x.21 ...в настоящее время воздержание, но в условиях исключающих употребление (больница, тюрьма...)
   F1x.22 ...в настоящее время под клиническим наблюдением на поддерживающей или заместительной терапии
   F1x.23 ...в настоящее время под клиническим наблюдением, но на лечение, вызывающим отвращение или блокирующими лекарствами
   F1x.24 ...в настоящее время употребление психоактивного вещества
   F1x.25 ...постоянное употребление
   F1x.26 ...эпизодическое употребление

D. стадия синдрома зависимости уточняется шестым знаком:

---

[1] Применимо только для алкоголя. Внезапное появление агрессивности и вспышек насилия, не типичных для субъекта в трезвом состоянии; возникает вскоре после приема алкоголя в количествах, не вызывающих опьянения у большинства людей.

F1x.2x1 ...начальная (первая) стадия
F1x.2x2 ...средняя (вторая) стадия
F1x.2x3 ...конечная (третья) стадия
F1x.2x9 ...стадия не известна

/F1x.3/ Абстинентное состояние (синдром отмены)...

Диагностические критерии:

A. состояние отмены – часть синдрома зависимости (**F1x.2**) и кодируется самостоятельно в том случае, когда состояние отмены является непосредственной причиной обращения к врачу – специалисту в случае выраженной тяжести расстройств
B. проявления состояния обусловлено употребляемым веществом
C. беспокойство, сниженное настроение, расстройство сна
D. облегчение после приема отмененного вещества
E. диагноз состояния отмены уточняется пятым знаком, указывающим на наличие или отсутствие осложнений:
   F1x.30 ...неосложненное
   F1x.31 ...с судорожными припадками
   F1x.39 ...БДУ

/F1x.4/ Абстинентное состояние (синдром отмены) с ... делирием...

Диагностические критерии

A. такие же, как **F05.-**
B. здесь имеется в виду delirium tremens, как вариант состояния отмены (**F1x.3**) у лиц с сильной зависимостью от алкоголя, употреблявших его длительное время. В качестве продромальных симптомов появляются бессонница, страх, тремор, иногда судороги.
C. классическая триада:
   1. спутанность, помрачение сознания
   2. яркие иллюзии, галлюцинации любой сферы чувств
   3. выраженный тремор
D. обычно сопровождается:
   1. бредом
   2. ажитацией
   3. отсутствием сна или инверсией цикла сна
   4. нейро – вегетативными расстройствами
E. диагноз состояния отмены с делирием уточняется пятым знаком, отражающим клиническую характеристику делирия:
   F1x.40 ...«классический»
   F1x.41 ...с судорожными припадками
   F1x.42 ...мусситирующий («бормочущий»)
   F1x.43 ...«профессиональный»
   F1x.44 ...без галлюцинаций (люцидный)
   F1x.45 ...абортивный
   F1x.48 ...другой
   F1x.49 ...неуточненный

/F1x.5/ Психотическое ... расстройство...

Диагностические критерии:

A. психоз, возникший во время или после приема психоактивного вещества (обычно – в течение от 48 часов до двух недель)
B. зависимость психотических расстройств от типа психоактивного вещества, личности больного и/или длительности применения
C. прекращение психотических расстройств с отменой психоактивного вещества и/или полная его редукция в течение до шести месяцев после отмены
D. исключаются психотические состояния, возникшие после приема веществ с первичным галлюциногенным эффектом (LSD, мескалин, высокие дозы каннабиоидов)
E. может развиваться на любой стадии синдрома зависимости, но чаще – в средней и конечной.
F. диагноз психотического расстройства, в соответствии с клиническим содержанием, уточняется пятым знаком:
   F1x.50 ...шизофреноподобное...
   F1x.51 ...преимущественно бредовое...
   F1x.52 ...преимущественно галлюцинаторное (включая алкогольный галлюциноз)...
   F1x.53 ...преимущественно полиморфное...

F1x.54 ...преимущественно с депрессивными симптомами…
F1x.55 ...преимущественно с маниакальными симптомами…
F1x.56 ...смешанное…

Включаются:
- *алкогольный галлюциноз*
- *алкогольный бред ревности*
- *алкогольная паранойя*
- *алкогольные психозы БДУ*

F1x.6 Амнестический синдром…

Диагностические критерии (должны соответствовать диагностическим критериям **F04**):

A. нарушения памяти на недавние события (снижение способности к усвоению нового материала), антероградная и ретроградная амнезия, снижение способности к воспроизведению событий прошлого в обратном временном порядке;
B. объективные доказательства хронического употребления психоактивных веществ
C. отсутствие дефектов непосредственного воспроизведения, внимания, сознания, интеллекта в целом.

Включается:
- *Корсаковский психоз или синдром, вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами*

/F1x.7/ Резидуальное психотическое расстройство и психотическое расстройство с поздним (отставленным) дебютом…

Диагностические критерии:

A. психоз, возникший значительно позже приема психоактивного вещества (более двух недель), но есть ясные указания на связь психоза с употреблением психоактивного вещества
B. расстройство продолжается после окончания прямого действия психоактивного вещества (включая конечные состояния Корсаковского синдрома)
C. могут быть обратимы (включая состояния деменции) после длительного отказа от приема психоактивного вещества
D. чаще – очень короткая продолжительность
E. диагноз резидуального или отставленного психотического расстройства должен быть уточнен пятым знаком:
   F1x.70 ...«флэшбек»
   F1x.71 ...расстройство личности или поведения (отвечают критериям расстройства личности органического происхождения – **F07.0**)
   F1x.72 ...резидуальное аффективное расстройство (отвечают критериям аффективного расстройства личности органического происхождения – **F06.3**)
   F1x.73 ...деменция (отвечает общим диагностическим указаниям деменции **F00 – F03**)
   F1x.74 ...другое стойкое когнитивное нарушение
   F1x.75 ...с поздним (отставленным) дебютом

/F1x.8/ ...другие психические и поведенческие расстройства

A. не отвечают критериям ни одного из перечисленных F1x.0 – F1x.5 расстройств, но существует ясная причинная связь расстройства с приемом психоактивных веществ
B. пятым знаком уточняется глубина расстройства:
   F1x.81 ...психотические
   F1x.82 ...непсихотические

/F1x.9/ ...неуточненные психические и поведенческие расстройства

A. пятым знаком уточняется глубина расстройства:
   F1x.91 ...психотические
   F1x.92 ...непсихотические
   F1x.99 ...неуточненное

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе
F10 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя

F10.001 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) легкой степени неосложненное
F10.002 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) средней степени неосложненное
F10.003 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) тяжелой степени неосложненное
F10.011 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) легкой степени с травмой или другим телесным повреждением
F10.012 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) средней степени с травмой или другим телесным повреждением
F10.013 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) тяжелой степени с травмой или другим телесным повреждением
F10.021 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) легкой степени с другими медицинскими осложнениями
F10.022 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) средней степени с другими медицинскими осложнениями
F10.023 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) тяжелой степени с другими медицинскими осложнениями

F10.033 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) тяжелой степени с делирием
F10.042 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) средней степени с нарушением восприятия
F10.043 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) тяжелой степени с нарушением восприятия
F10.053 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) тяжелой степени с комой
F10.063 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) тяжелой степени с судорогами
F10.07 Патологическое опьянение (алкогольное)
F10.081 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) легкой степени с другими осложнениями
F10.082 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) средней степени с другими осложнениями
F10.083 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) тяжелой степени с другими осложнениями
F10.091 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) легкой степени с неуточненными осложнениями
F10.092 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) средней степени с неуточненными осложнениями
F10.093 Опьянение (острая алкогольная интоксикация) тяжелой степени с неуточненными осложнениями
F10.1 Пагубное (с вредными последствиями) употребление алкоголя
F10.201 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание (ремиссия). Начальная (первая) стадия зависимости.
F10.202 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание (ремиссия). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F10.203 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание (ремиссия). Конечная (третья) стадия зависимости.
F10.209 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание (ремиссия). Стадия зависимости неизвестна.
F10.211 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости.
F10.212 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F10.213 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости.
F10.219 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна.
F10.221 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости.
F10.222 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F10.223 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости.
F10.229 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна.
F10.231 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости.
F10.232 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F10.233 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости.
F10.239 Синдром зависимости от алкоголя. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна.
F10.241 Синдром зависимости от алкоголя. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости.
F10.242 Синдром зависимости от алкоголя. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F10.243 Синдром зависимости от алкоголя. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости.
F10.249 Синдром зависимости от алкоголя. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна.
F10.251 Синдром зависимости от алкоголя. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости.
F10.252 Синдром зависимости от алкоголя. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F10.253 Синдром зависимости от алкоголя. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости.
F10.259 Синдром зависимости от алкоголя. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна.
F10.261 Синдром зависимости от алкоголя. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости.
F10.262 Синдром зависимости от алкоголя. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F10.263 Синдром зависимости от алкоголя. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости.
F10.269 Синдром зависимости от алкоголя. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна.
F10.291 Синдром зависимости от алкоголя. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости.
F10.292 Синдром зависимости от алкоголя. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F10.293 Синдром зависимости от алкоголя. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости.
F10.299 Синдром зависимости от алкоголя. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна.
F10.30 Синдром отмены алкоголя неосложненный
F10.31 Синдром отмены алкоголя с судорожными припадками
F10.39 Синдром отмены алкоголя БДУ
F10.40 Синдром отмены алкоголя с делирием («классический» делирий)
F10.41 Синдром отмены алкоголя с делирием и судорожными припадками
F10.42 Синдром отмены алкоголя с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий)
F10.43 Синдром отмены алкоголя с «профессиональным делирием»
F10.44 Синдром отмены алкоголя с делирием без галлюцинаций (люцидным)
F10.45 Синдром отмены алкоголя с делирием абортивным
F10.48 Синдром отмены алкоголя с делирием другим
F10.49 Синдром отмены алкоголя с делирием неуточненным
F10.50 Шизофреноподобное расстройство вследствие употребления алкоголя
F10.51 Преимущественно бредовое расстройство вследствие употребления алкоголя
F10.52 Преимущественно галлюцинаторное расстройство вследствие употребления алкоголя (включает алкогольный галлюциноз)
F10.53 Преимущественно полиморфное психотическое расстройство вследствие употребления алкоголя
F10.54 Расстройство вследствие употребления алкоголя с преимущественно депрессивными психотическими симптомами
F10.55 Расстройство вследствие употребления алкоголя с преимущественно маниакальными психотическими симптомами
F10.6 Амнестический синдром, связанный с употреблением алкоголя
F10.70 Флэшбэк, связанный с употреблением алкоголя
F10.71 Расстройство личности и поведения, связанное с употреблением алкоголя
F10.72 Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением алкоголя

F10.73 Деменция, связанная с употреблением алкоголя
F10.74 Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением алкоголя
F10.75 Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением алкоголя
F10.81 Другие психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя
F10.82 Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя
F10.91 Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя
F10.92 Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя
F10.99 Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F11 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления опиоидов

F11.00 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов, неосложненная
F11.01 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов, с травмой или другим телесным повреждением
F11.02 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов, с другими медицинскими осложнениями
F11.03 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов, с делирием
F11.04 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов, с нарушением восприятия
F11.05 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов, с комой
F11.06 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов, с судорогами
F11.1 Пагубное (с вредными последствиями) употребление опиоидов
F11.201 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости.
F11.202 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F11.203 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости.
F11.209 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна.
F11.211 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости.
F11.212 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F11.213 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости.
F11.219 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна.
F11.221 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости.
F11.222 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F11.223 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость).Конечная (третья) стадия зависимости.
F11.229 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна.
F11.231 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости.
F11.232 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F11.233 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости.
F11.239 Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна.
F11.241 Синдром зависимости от опиоидов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости.
F11.242 Синдром зависимости от опиоидов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F11.243 Синдром зависимости от опиоидов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости.
F11.249 Синдром зависимости от опиоидов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна.
F11.251 Синдром зависимости от опиоидов. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости.
F11.252 Синдром зависимости от опиоидов. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F11.253 Синдром зависимости от опиоидов. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости.
F11.259 Синдром зависимости от опиоидов. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна.
F11.261 Синдром зависимости от опиоидов. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости.
F11.262 Синдром зависимости от опиоидов. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F11.263 Синдром зависимости от опиоидов. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости.
F11.269 Синдром зависимости от опиоидов. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна.
F11.291 Синдром зависимости от опиоидов. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости.
F11.292 Синдром зависимости от опиоидов. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F11.293 Синдром зависимости от опиоидов. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости.
F11.299 Синдром зависимости от опиоидов. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна.
F11.30 Синдром отмены опиоидов неосложненный
F11.31 Синдром отмены опиоидов с судорожными припадками
F11.39 Синдром отмены опиоидов БДУ
F11.40 Синдром отмены опиоидов с делирием ("классический" делирий)
F11.41 Синдром отмены опиоидов с делирием и судорожными припадками
F11.42 Синдром отмены опиоидов с мусситирующим делирием ("бормочущий" делирий)
F11.43 Синдром отмены опиоидов с "профессиональным делирием"
F11.44 Синдром отмены опиоидов с делирием без галлюцинаций (люцидным)

F11.45 Синдром отмены опиоидов с делирием абортивным
F11.48 Синдром отмены опиоидов с делирием другим
F11.49 Синдром отмены опиоидов с делирием неуточненным
F11.50 Шизофреноподобное расстройство вследствие употребления опиоидов
F11.51 Преимущественно бредовое расстройство вследствие употребления опиоидов
F11.52 Преимущественно галлюцинаторное расстройство вследствие употребления опиоидов
F11.53 Преимущественно полиморфное психотическое расстройство вследствие употребления опиоидов
F11.54 Расстройство вследствие употребления опиоидов с преимущественно депрессивными психотическими симптомами
F11.55 Расстройство вследствие употребления опиоидов с преимущественно маниакальными психотическими симптомами
F11.6 Амнестический синдром, связанный с употреблением опиоидов
F11.70 Флэшбэк, связанный с употреблением опиоидов
F11.71 Расстройство личности и поведения, связанное с употреблением опиоидов
F11.72 Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением опиоидов
F11.73 Деменция, связанная с употреблением опиоидов
F11.74 Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением опиоидов
F11.75 Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением опиоидов
F11.81 Другие психотические расстройства, связанные с употреблением опиоидов
F11.82 Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением опиоидов
F11.91 Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением опиоидов
F11.92 Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением опиоидов
F11.99 Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением опиоидов

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F12 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления каннабиоидов

F12.00 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов, неосложненная
F12.01 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов, с травмой или другим телесным повреждением
F12.02 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов, с другими медицинскими осложнениями
F12.03 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов, с делирием
F12.04 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов, с нарушением восприятия
F12.05 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов, с комой
F12.06 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов, с судорогами
F12.1 Пагубное (с вредными последствиями) употребление каннабиноидов
F12.201 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости.
F12.202 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F12.203 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости.
F12.209 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна.
F12.211 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости.
F12.212 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F12.213 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости.
F12.219 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна.
F12.221 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости.
F12.222 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F12.223 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость).Конечная (третья) стадия зависимости.
F12.229 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна.
F12.231 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости.
F12.232 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F12.233 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости.
F12.239 Синдром зависимости от каннабиоидов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна.
F12.241 Синдром зависимости от каннабиоидов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости.
F12.242 Синдром зависимости от каннабиоидов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F12.243 Синдром зависимости от каннабиоидов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости.
F12.249 Синдром зависимости от каннабиоидов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна.
F12.251 Синдром зависимости от каннабиоидов. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости.
F12.252 Синдром зависимости от каннабиоидов. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F12.253 Синдром зависимости от каннабиоидов. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости.
F12.259 Синдром зависимости от каннабиоидов. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна.
F12.261 Синдром зависимости от каннабиоидов. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости.
F12.262 Синдром зависимости от каннабиоидов. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F12.263 Синдром зависимости от каннабиоидов. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости.
F12.269 Синдром зависимости от каннабиоидов. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна.

F12.291 Синдром зависимости от каннабиоидов. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости.
F12.292 Синдром зависимости от каннабиоидов. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F12.293 Синдром зависимости от каннабиоидов. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости.
F12.299 Синдром зависимости от каннабиоидов. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна.
F12.30 Синдром отмены каннабиоидов неосложненный
F12.31 Синдром отмены каннабиоидов с судорожными припадками
F12.39 Синдром отмены каннабиоидов БДУ
F12.40 Синдром отмены каннабиоидов с делирием («классический» делирий)
F12.41 Синдром отмены каннабиоидов с делирием и судорожными припадками
F12.42 Синдром отмены каннабиоидов с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий)
F12.43 Синдром отмены каннабиоидов с «профессиональным делирием»
F12.44 Синдром отмены каннабиоидов с делирием без галлюцинаций (люцидным)
F12.45 Синдром отмены каннабиоидов с делирием абортивным
F12.48 Синдром отмены каннабиоидов с делирием другим
F12.49 Синдром отмены каннабиоидов с делирием неуточненным
F12.50 Шизофреноподобное расстройство вследствие употребления каннабиоидов
F12.51 Преимущественно бредовое расстройство вследствие употребления каннабиоидов
F12.52 Преимущественно галлюцинаторное расстройство вследствие употребления каннабиоидов
F12.53 Преимущественно полиморфное психотическое расстройство вследствие употребления каннабиоидов
F12.54 Расстройство вследствие употребления каннабиоидов с преимущественно депрессивными психотическими симптомами
F12.55 Расстройство вследствие употребления каннабиоидов с преимущественно маниакальными психотическими симптомами
F12.6 Амнестический синдром, связанный с употреблением каннабиоидов
F12.70 Флэшбэк, связанный с употреблением каннабиоидов
F12.71 Расстройство личности и поведения, связанные с употреблением каннабиоидов
F12.72 Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением каннабиоидов
F12.73 Деменция, связанная с употреблением каннабиоидов
F12.74 Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением каннабиоидов
F12.75 Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением каннабиоидов
F12.81 Другие психотические расстройства, связанные с употреблением каннабиоидов
F12.82 Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением каннабиоидов
F12.91 Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением каннабиоидов
F12.92 Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением каннабиоидов
F12.99 Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением каннабиоидов

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F13 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления седативных или снотворных веществ

F13.00H Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, неосложненная. Наркомания.
F13.00T Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, неосложненная. Токсикомания.
F13.01H Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, с травмой или другим телесным повреждением. Наркомания.
F13.01T Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, с травмой или другим телесным повреждением Токсикомания.
F13.02H Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, другими медицинскими осложнениями. Наркомания.
F13.02T Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, другими медицинскими осложнениями. Токсикомания.
F13.03H Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, с делирием. Наркомания.
F13.03T Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, с делирием. Токсикомания.
F13.04H Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, с нарушением восприятия. Наркомания.
F13.04T Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, с нарушением восприятия. Токсикомания.
F13.05H Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, с комой. Наркомания.
F13.05T Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, с комой. Токсикомания.
F13.06H Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, с судорогами. Наркомания.
F13.06T Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных средств, с судорогами. Токсикомания.
F13.1 Пагубное (с вредными последствиями) употребление седативных или снотворных веществ
F13.201H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.
F13.201T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F13.202H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F13.202T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F13.203H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F13.203T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F13.209H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F13.209T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F13.211H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.
F13.211T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F13.212H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F13.212T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F13.213H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F13.213T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.219H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F13.219T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F13.221H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F13.221T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.222H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F13.222T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.223H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость).Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F13.223T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость).Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.229H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F13.229T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F13.231H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F13.231T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.232H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F13.232T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.233H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F13.233T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.239H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F13.239T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F13.241H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F13.241T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.242H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F13.242T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.243H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F13.243T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.249H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F13.249T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F13.251H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F13.251T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.252H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F13.252T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.253H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F13.253T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.259H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F13.259T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F13.261H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F13.261T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.262H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F13.262T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F13.263H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F13.263T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F13.269H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F13.269T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F13.291H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.
F13.291T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F13.292H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F13.292T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F13.293H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F13.293T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F13.299H Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F13.299T Синдром зависимости от седативных средств, снотворных. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F13.30H Синдром отмены седативных средств, снотворных неосложненный. Наркомания.
F13.30T Синдром отмены седативных средств, снотворных неосложненный. Токсикомания.
F13.31H Синдром отмены седативных средств, снотворных с судорожными припадками. Наркомания.
F13.31T Синдром отмены седативных средств, снотворных с судорожными припадками. Токсикомания.
F13.39H Синдром отмены седативных средств, снотворных БДУ. Наркомания.
F13.39T Синдром отмены седативных средств, снотворных БДУ. Токсикомания.
F13.40H Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием («классический» делирий). Наркомания.
F13.40T Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием («классический» делирий). Токсикомания.
F13.41H Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием и судорожными припадками. Наркомания.
F13.41T Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием и судорожными припадками. Токсикомания.
F13.42H Синдром отмены седативных средств, снотворных с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий). Наркомания.
F13.42T Синдром отмены седативных средств, снотворных с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий). Токсикомания.
F13.43H Синдром отмены седативных средств, снотворных с «профессиональным делирием». Наркомания.
F13.43T Синдром отмены седативных средств, снотворных с «профессиональным делирием». Токсикомания.
F13.44H Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием без галлюцинаций (люцидным). Наркомания.
F13.44T Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием без галлюцинаций (люцидным). Токсикомания.
F13.45H Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием абортивным. Наркомания.
F13.45T Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием абортивным. Токсикомания.
F13.48H Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием другим. Наркомания.
F13.48T Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием другим. Токсикомания.
F13.49H Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием неуточненным. Наркомания.
F13.49T Синдром отмены седативных средств, снотворных с делирием неуточненным. Токсикомания.
F13.50H Шизофреноподобное расстройство, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания.
F13.50T Шизофреноподобное расстройство, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания.
F13.51H Преимущественно бредовое расстройство, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания.
F13.51T Преимущественно бредовое расстройство, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания.
F13.52H Преимущественно галлюцинаторное расстройство, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания.
F13.52T Преимущественно галлюцинаторное расстройство, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания.
F13.53H Преимущественно полиморфное психотическое расстройство, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания.
F13.53T Преимущественно полиморфное психотическое расстройство, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания.
F13.54H Расстройство с преимущественно депрессивными психотическими симптомами, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания.
F13.54T Расстройство с преимущественно депрессивными психотическими симптомами, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания.
F13.55H Расстройство с преимущественно маниакальными психотическими симптомами, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания.
F13.55T Расстройство с преимущественно маниакальными психотическими симптомами, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания.
F13.6H Амнестический синдром, связанный с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания.
F13.6T Амнестический синдром, связанный с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания.
F13.70H Флэшбэк, связанный с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания
F13.70T Флэшбэк, связанный с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания
F13.71H Расстройство личности и поведения, связанные с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания
F13.71T Расстройство личности и поведения, связанные с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания
F13.72H Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания
F13.72T Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания
F13.73H Деменция, связанная с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания
F13.73T Деменция, связанная с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания
F13.74H Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания
F13.74T Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания
F13.75H Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания
F13.75T Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания
F13.81H Другие психотические расстройства, связанные с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания
F13.81T Другие психотические расстройства, связанные с употреблением седативных и снотворных средств

F13.82H Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания
F13.82T Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания
F13.91H Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания
F13.91T Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания
F13.92H Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания
F13.92T Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания
F13.99H Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением седативных и снотворных средств. Наркомания
F13.99T Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением седативных и снотворных средств. Токсикомания

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F14 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления кокаина

F14.00 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина, неосложненная
F14.01 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина, с травмой или другим телесным повреждением
F14.02 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина, с другими медицинскими осложнениями
F14.03 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина, с делирием
F14.04 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина, с нарушением восприятия
F14.05 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина, с комой
F14.06 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина, с судорогами
F14.1 Пагубное (с вредными последствиями) употребление кокаина
F14.201 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости.
F14.202 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F14.203 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости.
F14.209 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна.
F14.211 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости.
F14.212 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F14.213 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости.
F14.219 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна.
F14.221 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости.
F14.222 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F14.223 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости.
F14.229 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна.
F14.231 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости.
F14.232 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F14.233 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости.
F14.239 Синдром зависимости от кокаина. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна.
F14.241 Синдром зависимости от кокаина. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости.
F14.242 Синдром зависимости от кокаина. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F14.243 Синдром зависимости от кокаина. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости.
F14.249 Синдром зависимости от кокаина. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна.
F14.251 Синдром зависимости от кокаина. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости.
F14.252 Синдром зависимости от кокаина. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F14.253 Синдром зависимости от кокаина. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости.
F14.259 Синдром зависимости от кокаина. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна.
F14.261 Синдром зависимости от кокаина. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости.
F14.262 Синдром зависимости от кокаина. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F14.263 Синдром зависимости от кокаина. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости.
F14.269 Синдром зависимости от кокаина. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна.
F14.291 Синдром зависимости от кокаина. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости.
F14.292 Синдром зависимости от кокаина. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F14.293 Синдром зависимости от кокаина. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости.
F14.299 Синдром зависимости от кокаина. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна.
F14.30 Синдром отмены кокаина неосложненный
F14.31 Синдром отмены кокаина с судорожными припадками
F14.39 Синдром отмены кокаина БДУ
F14.40 Синдром отмены кокаина с делирием («классический» делирий)
F14.41 Синдром отмены кокаина с делирием и судорожными припадками
F14.42 Синдром отмены кокаина с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий)
F14.43 Синдром отмены кокаина с «профессиональным делирием»

F14.44 Синдром отмены кокаина с делирием без галлюцинаций (люцидным)
F14.45 Синдром отмены кокаина с делирием абортивным
F14.48 Синдром отмены кокаина с делирием другим
F14.49 Синдром отмены кокаина с делирием неуточненным
F14.50 Шизофреноподобное расстройство вследствие употребления кокаина
F14.51 Преимущественно бредовое расстройство вследствие употребления кокаина
F14.52 Преимущественно галлюцинаторное расстройство вследствие употребления кокаина
F14.53 Преимущественно полиморфное психотическое расстройство вследствие употребления кокаина
F14.54 Расстройство вследствие употребления кокаина с преимущественно депрессивными психотическими симптомами
F14.55 Расстройство вследствие употребления кокаина с преимущественно маниакальными психотическими симптомами
F14.6 Амнестический синдром, связанный с употреблением кокаина
F14.70 Флэшбэк, связанный с употреблением кокаина
F14.71 Расстройство личности и поведения, связанные с употреблением кокаина
F14.72 Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением кокаина
F14.73 Деменция, связанная с употреблением кокаина
F14.74 Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением кокаина
F14.75 Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением кокаина
F14.81 Другие психотические расстройства, связанные с употреблением кокаина
F14.82 Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением кокаина
F14.91 Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением кокаина
F14.92 Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением кокаина
F14.99 Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением кокаина

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F15 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления других стимуляторов, включая кофеин

F15.00H Острая интоксикация неосложненная, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Наркомания.
F15.00T Острая интоксикация неосложненная, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Токсикомания.
F15.01H Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Наркомания.
F15.01T Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Токсикомания.
F15.02H Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Наркомания.
F15.02T Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Токсикомания.
F15.03H Острая интоксикация с делирием, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Наркомания.
F15.03T Острая интоксикация с делирием, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Токсикомания.
F15.04H Острая интоксикация с нарушением восприятия, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Наркомания.
F15.04T Острая интоксикация с нарушением восприятия, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Токсикомания.
F15.05H Острая интоксикация с комой, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Наркомания.
F15.05T Острая интоксикация с комой, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Токсикомания.
F15.06H Острая интоксикация с судорогами, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Наркомания.
F15.06T Острая интоксикация с судорогами, вызванная употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Токсикомания.
F15.1 Пагубное (с вредными последствиями) употребление других стимуляторов (включая кофеин)
F15.201H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.
F15.201T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F15.202H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F15.202T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F15.203H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F15.203T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F15.209H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F15.209T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F15.211H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.
F15.211T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F15.212H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F15.212T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F15.213H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F15.213T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F15.219H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F15.219T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F15.221H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F15.221T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.222H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F15.222T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.223H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F15.223T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.229H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F15.229T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F15.231H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F15.231T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.232H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F15.232T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.233H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F15.233T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.239H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F15.239T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F15.241H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F15.241T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.242H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F15.242T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.243H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F15.243T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.249H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F15.249T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F15.251H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F15.251T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.252H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F15.252T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.253H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F15.253T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.259H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F15.259T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F15.261H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F15.261T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.262H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F15.262T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.263H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F15.263T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F15.269H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F15.269T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F15.291H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F15.291T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F15.292H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F15.292T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F15.293H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F15.293T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F15.299H Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F15.299T Синдром зависимости от других стимуляторов (включая кофеин). Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F15.30H Синдром отмены других стимуляторов (включая кофеин) неосложненный. Наркомания.
F15.30T Синдром отмены других стимуляторов (включая кофеин) неосложненный. Токсикомания.
F15.31H Синдром отмены других стимуляторов (включая кофеин) с судорожными припадками. Наркомания.
F15.31T Синдром отмены других стимуляторов (включая кофеин) с судорожными припадками. Токсикомания.
F15.39H Синдром отмены других стимуляторов (включая кофеин) БДУ. Наркомания.
F15.39T Синдром отмены других стимуляторов (включая кофеин) БДУ. Токсикомания.
F15.40H Синдром отмены других стимуляторов с делирием («классический» делирий). Наркомания.
F15.40T Синдром отмены других стимуляторов с делирием («классический» делирий). Токсикомания.
F15.41H Синдром отмены других стимуляторов с делирием и судорожными припадками. Наркомания.
F15.41T Синдром отмены других стимуляторов с делирием и судорожными припадками. Токсикомания.
F15.42H Синдром отмены других стимуляторов с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий). Наркомания.
F15.42T Синдром отмены других стимуляторов с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий). Токсикомания.
F15.43H Синдром отмены других стимуляторов с «профессиональным делирием». Наркомания.
F15.43T Синдром отмены других стимуляторов с «профессиональным делирием». Токсикомания.
F15.44H Синдром отмены других стимуляторов с делирием без галлюцинаций (люцидным). Наркомания.
F15.44T Синдром отмены других стимуляторов с делирием без галлюцинаций (люцидным). Токсикомания.
F15.45H Синдром отмены других стимуляторов с делирием абортивным. Наркомания.
F15.45T Синдром отмены других стимуляторов с делирием абортивным. Токсикомания.
F15.48H Синдром отмены других стимуляторов с делирием другим. Наркомания.
F15.48T Синдром отмены других стимуляторов с делирием другим. Токсикомания.
F15.49H Синдром отмены других стимуляторов с делирием неуточненным. Наркомания.
F15.49T Синдром отмены других стимуляторов с делирием неуточненным. Токсикомания.
F15.50H Шизофреноподобное расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных. Наркомания.
F15.50T Шизофреноподобное расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных. Токсикомания.
F15.51H Преимущественно бредовое расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных. Наркомания.
F15.51T Преимущественно бредовое расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных. Токсикомания.
F15.52H Преимущественно галлюцинаторное расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных. Наркомания.
F15.52T Преимущественно галлюцинаторное расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных. Токсикомания.
F15.53H Преимущественно полиморфное психотическое расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных. Наркомания.
F15.53T Преимущественно полиморфное психотическое расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных. Токсикомания.
F15.54H Расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных с преимущественно депрессивными психотическими симптомами. Наркомания.
F15.54T Расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных с преимущественно депрессивными психотическими симптомами. Токсикомания.
F15.55H Расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных с преимущественно маниакальными психотическими симптомами. Наркомания.
F15.55T Расстройство, связанное с употреблением седативных средств, снотворных с преимущественно маниакальными психотическими симптомами. Токсикомания.
F15.6H Амнестический синдром, связанный с употреблением других стимуляторов. Наркомания.
F15.6T Амнестический синдром, связанный с употреблением других стимуляторов. Токсикомания.
F15.70H Флэшбэк, связанный с употреблением других стимуляторов. Наркомания
F15.70T Флэшбэк, связанный с употреблением других стимуляторов . Токсикомания
F15.71H Расстройство личности и поведения, связанное с употреблением других стимуляторов. Наркомания
F15.71T Расстройство личности и поведения, связанное с употреблением других стимуляторов. Токсикомания
F15.72H Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением других стимуляторов. Наркомания
F15.72T Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением других стимуляторов . Токсикомания
F15.73H Деменция, связанная с употреблением других стимуляторов. Наркомания
F15.73T Деменция, связанная с употреблением других стимуляторов. Токсикомания
F15.74H Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением других стимуляторов. Наркомания
F15.74T Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением других стимуляторов. Токсикомания
F15.75H Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением других стимуляторов. Наркомания
F15.75T Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением других стимуляторов. Токсикомания
F15.81H Другие психотические расстройства, связанные с употреблением других стимуляторов. Наркомания
F15.81T Другие психотические расстройства, связанные с употреблением других стимуляторов. Токсикомания
F15.82H Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением других стимуляторов. Наркомания
F15.82T Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением других стимуляторов. Токсикомания
F15.91H Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением других стимуляторов. Наркомания
F15.91T Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением других стимуляторов
F15.92H Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением других стимуляторов. Наркомания
F15.92T Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением других стимуляторов
F15.99H Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением других стимуляторов. Наркомания
F15.99T Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением других стимуляторов. Токсикомания

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе

F16 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления галлюциногенов

F16.00H Острая интоксикация неосложненная, вызванная употреблением галлюциногенов. Наркомания.

F16.00T Острая интоксикация неосложненная, вызванная употреблением галлюциногенов. Токсикомания.

F16.01H Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением, вызванная употреблением галлюциногенов. Наркомания.

F16.01T Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением, вызванная употреблением галлюциногенов. Токсикомания.

F16.02H Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями, вызванная употреблением галлюциногенов. Наркомания.

F16.02T Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями, вызванная употреблением галлюциногенов. Токсикомания.

F16.03H Острая интоксикация с делирием, вызванная употреблением галлюциногенов. Наркомания.

F16.03T Острая интоксикация с делирием, вызванная употреблением галлюциногенов. Токсикомания.

F16.04H Острая интоксикация с нарушением восприятия, вызванная употреблением галлюциногенов. Наркомания.

F16.04T Острая интоксикация с нарушением восприятия, вызванная употреблением галлюциногенов. Токсикомания.

F16.05H Острая интоксикация с комой, вызванная употреблением галлюциногенов. Наркомания.

F16.05T Острая интоксикация с комой, вызванная употреблением галлюциногенов. Токсикомания.

F16.06H Острая интоксикация с судорогами, вызванная употреблением галлюциногенов. Наркомания.

F16.06T Острая интоксикация с судорогами, вызванная употреблением галлюциногенов. Токсикомания.

F16.1 Пагубное (с вредными последствиями) употребление галлюциногенов

F16.201H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F16.201T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.202H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F16.202T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.203H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F16.203T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.209H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F16.209T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F16.211H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F16.211T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.212H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F16.212T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.213H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F16.213T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.219H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F16.219T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F16.221H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F16.221T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.222H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F16.222T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.223H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F16.223T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.229H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F16.229T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F16.231H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F16.231T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.232H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F16.232T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.233H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F16.233T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F16.239H Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F16.239T Синдром зависимости от галлюциногенов. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F16.241H Синдром зависимости от галлюциногенов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.
F16.241T Синдром зависимости от галлюциногенов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.242H Синдром зависимости от галлюциногенов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F16.242T Синдром зависимости от галлюциногенов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.243H Синдром зависимости от галлюциногенов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F16.243T Синдром зависимости от галлюциногенов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.249H Синдром зависимости от галлюциногенов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F16.249T Синдром зависимости от галлюциногенов. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F16.251H Синдром зависимости от галлюциногенов. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.
F16.251T Синдром зависимости от галлюциногенов. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.252H Синдром зависимости от галлюциногенов. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F16.252T Синдром зависимости от галлюциногенов. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.253H Синдром зависимости от галлюциногенов. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F16.253T Синдром зависимости от галлюциногенов. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.259H Синдром зависимости от галлюциногенов. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F16.259T Синдром зависимости от галлюциногенов. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F16.261H Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.
F16.261T Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.262H Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F16.262T Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.263H Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F16.263T Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.269H Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F16.269T Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F16.291H Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.
F16.291T Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.292H Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F16.292T Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.293H Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F16.293T Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F16.299H Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F16.299T Синдром зависимости от галлюциногенов. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F16.30H Синдром отмены галлюциногенов неосложненный. Наркомания.
F16.30T Синдром отмены галлюциногенов неосложненный. Токсикомания.
F16.31H Синдром отмены галлюциногенов с судорожными припадками. Наркомания.
F16.31T Синдром отмены галлюциногенов с судорожными припадками. Токсикомания.
F16.39H Синдром отмены галлюциногенов БДУ. Наркомания.
F16.39T Синдром отмены галлюциногенов БДУ. Токсикомания.
F16.40H Синдром отмены галлюциногенов с делирием («классический» делирий). Наркомания.
F16.40T Синдром отмены галлюциногенов с делирием («классический» делирий). Токсикомания.
F16.41H Синдром отмены галлюциногенов с делирием и судорожными припадками. Наркомания.
F16.41T Синдром отмены галлюциногенов с делирием и судорожными припадками. Токсикомания.
F16.42H Синдром отмены галлюциногенов с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий). Наркомания.
F16.42T Синдром отмены галлюциногенов с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий). Токсикомания.
F16.43H Синдром отмены галлюциногенов с «профессиональным делирием». Наркомания.
F16.43T Синдром отмены галлюциногенов с «профессиональным делирием». Токсикомания.
F16.44H Синдром отмены галлюциногенов с делирием без галлюцинаций (люцидным). Наркомания.
F16.44T Синдром отмены галлюциногенов с делирием без галлюцинаций (люцидным). Токсикомания.
F16.45H Синдром отмены галлюциногенов с делирием абортивным. Наркомания.
F16.45T Синдром отмены галлюциногенов с делирием абортивным. Токсикомания.
F16.48H Синдром отмены галлюциногенов с делирием другим. Наркомания.
F16.48T Синдром отмены галлюциногенов с делирием другим. Токсикомания.
F16.49H Синдром отмены галлюциногенов с делирием неуточненным. Наркомания.
F16.49T Синдром отмены галлюциногенов с делирием неуточненным. Токсикомания.
F16.50H Шизофреноподобное расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов. Наркомания.

F16.50T Шизофреноподобное расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов. Токсикомания.
F16.51H Преимущественно бредовое расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов. Наркомания.
F16.51T Преимущественно бредовое расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов. Токсикомания.
F16.52H Преимущественно галлюцинаторное расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов. Наркомания.
F16.52T Преимущественно галлюцинаторное расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов. Токсикомания.
F16.53H Преимущественно полиморфное психотическое расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов. Наркомания.
F16.53T Преимущественно полиморфное психотическое расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов. Токсикомания.
F16.54H Расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов с преимущественно депрессивными психотическими симптомами. Наркомания.
F16.54T Расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов с преимущественно депрессивными психотическими симптомами. Токсикомания.
F16.55H Расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов с преимущественно маниакальными психотическими симптомами. Наркомания.
F16.55T Расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов с преимущественно маниакальными психотическими симптомами. Токсикомания.
F16.6H Амнестический синдром, связанный с употреблением галлюциногенов. Наркомания.
F16.6T Амнестический синдром, связанный с употреблением галлюциногенов. Токсикомания.
F16.75H Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением галлюциногенов. Наркомания
F16.75T Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением галлюциногенов. Токсикомания
F16.70H Флэшбэк, связанный с употреблением галлюциногенов. Наркомания
F16.70T Флэшбэк, связанный с употреблением галлюциногенов . Токсикомания
F16.71H Расстройство личности и поведения, связанное с употреблением галлюциногенов. Наркомания
F16.71T Расстройство личности и поведения, связанное с употреблением галлюциногенов. Токсикомания
F16.72H Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов. Наркомания
F16.72T Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением галлюциногенов . Токсикомания
F16.73H Деменция, связанная с употреблением галлюциногенов. Наркомания
F16.73T Деменция, связанная с употреблением галлюциногенов. Токсикомания
F16.74H Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением галлюциногенов. Наркомания
F16.74T Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением галлюциногенов. Токсикомания
F16.81H Другие психотические расстройства, связанные с употреблением галлюциногенов. Наркомания
F16.81T Другие психотические расстройства, связанные с употреблением галлюциногенов. Токсикомания
F16.82H Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением галлюциногенов. Наркомания
F16.82T Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением галлюциногенов. Токсикомания
F16.91H Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением галлюциногенов. Наркомания
F16.91T Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением галлюциногенов
F16.92H Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением галлюциногенов. Наркомания
F16.92T Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением галлюциногенов
F16.99H Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением галлюциногенов. Наркомания
F16.99T Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением галлюциногенов. Токсикомания

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F17 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления табака

F17.00 Острая интоксикация неосложненная, вызванная употреблением табака
F17.01 Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением, вызванная употреблением табака
F17.02 Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями, вызванная употреблением табака
F17.03 Острая интоксикация с делирием, вызванная употреблением табака
F17.04 Острая интоксикация с нарушением восприятия, вызванная употреблением табака
F17.05 Острая интоксикация с комой, вызванная употреблением табака
F17.06 Острая интоксикация с судорогами, вызванная употреблением табака
F17.1 Пагубное (с вредными последствиями) употребление табака
F17.201 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости.
F17.202 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F17.203 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости.
F17.209 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна.
F17.211 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости.
F17.212 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F17.213 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости.
F17.219 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна.
F17.221 Синдром зависимости от табака. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости.
F17.222 Синдром зависимости от табака. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F17.223 Синдром зависимости от табака. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость).Конечная (третья) стадия зависимости.
F17.229 Синдром зависимости от табака. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна.
F17.231 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости.
F17.232 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F17.233 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости.

F17.239 Синдром зависимости от табака. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна.
F17.241 Синдром зависимости от табака. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости.
F17.242 Синдром зависимости от табака. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости.
F17.243 Синдром зависимости от табака. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости.
F17.249 Синдром зависимости от табака. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна.
F17.251 Синдром зависимости от табака. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости.
F17.252 Синдром зависимости от табака. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F17.253 Синдром зависимости от табака. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости.
F17.259 Синдром зависимости от табака. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна.
F17.261 Синдром зависимости от табака. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости.
F17.262 Синдром зависимости от табака. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F17.263 Синдром зависимости от табака. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости.
F17.269 Синдром зависимости от табака. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна.
F17.291 Синдром зависимости от табака. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости.
F17.292 Синдром зависимости от табака. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости.
F17.293 Синдром зависимости от табака. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости.
F17.299 Синдром зависимости от табака. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна.
F17.30 Синдром отмены табака неосложненный
F17.39 Синдром отмены табака БДУ
F17.82 Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением табака
F17.92 Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением табака
F17.99 Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением табака

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе

F18 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления летучих растворителей

F18.00H Острая интоксикация неосложненная, вызванная употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.00T Острая интоксикация неосложненная, вызванная употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.01H Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением, вызванная употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.01T Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением, вызванная употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.02H Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями, вызванная употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.02T Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями, вызванная употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.03H Острая интоксикация с делирием, вызванная употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.03T Острая интоксикация с делирием, вызванная употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.04H Острая интоксикация с нарушением восприятия, вызванная употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.04T Острая интоксикация с нарушением восприятия, вызванная употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.05H Острая интоксикация с комой, вызванная употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.05T Острая интоксикация с комой, вызванная употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.06H Острая интоксикация с судорогами, вызванная употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.06T Острая интоксикация с судорогами, вызванная употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.1 Пагубное (с вредными последствиями) употребление летучих растворителей
F18.201H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.
F18.201T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F18.202H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F18.202T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F18.203H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F18.203T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F18.209H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F18.209T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F18.211H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.
F18.211T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F18.212H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F18.212T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F18.213H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F18.213T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F18.219H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F18.219T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F18.221H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F18.221T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.222H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F18.222T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.223H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F18.223T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.229H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F18.229T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F18.231H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F18.231T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.232H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F18.232T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.233H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F18.233T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.239H Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F18.239T Синдром зависимости от летучих растворителей. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F18.241H Синдром зависимости от летучих растворителей. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F18.241T Синдром зависимости от летучих растворителей. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.242H Синдром зависимости от летучих растворителей. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F18.242T Синдром зависимости от летучих растворителей. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.243H Синдром зависимости от летучих растворителей. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F18.243T Синдром зависимости от летучих растворителей. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.249H Синдром зависимости от летучих растворителей. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F18.249T Синдром зависимости от летучих растворителей. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F18.251H Синдром зависимости от летучих растворителей. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F18.251T Синдром зависимости от летучих растворителей. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.252H Синдром зависимости от летучих растворителей. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F18.252T Синдром зависимости от летучих растворителей. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.253H Синдром зависимости от летучих растворителей. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F18.253T Синдром зависимости от летучих растворителей. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.259H Синдром зависимости от летучих растворителей. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F18.259T Синдром зависимости от летучих растворителей. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F18.261H Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F18.261T Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.262H Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F18.262T Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.263H Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F18.263T Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F18.269H Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F18.269T Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F18.291H Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F18.291T Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.
F18.292H Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.
F18.292T Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.
F18.293H Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.
F18.293T Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.
F18.299H Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.
F18.299T Синдром зависимости от летучих растворителей. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.
F18.30H Синдром отмены летучих растворителей неосложненный. Наркомания.
F18.30T Синдром отмены летучих растворителей неосложненный. Токсикомания.
F18.31H Синдром отмены летучих растворителей с судорожными припадками. Наркомания.
F18.31T Синдром отмены летучих растворителей с судорожными припадками. Токсикомания.
F18.39H Синдром отмены летучих растворителей БДУ. Наркомания.
F18.39T Синдром отмены летучих растворителей БДУ. Токсикомания.
F18.40H Синдром отмены летучих растворителей с делирием («классический» делирий). Наркомания.
F18.40T Синдром отмены летучих растворителей с делирием («классический» делирий). Токсикомания.
F18.41H Синдром отмены летучих растворителей с делирием и судорожными припадками. Наркомания.
F18.41T Синдром отмены летучих растворителей с делирием и судорожными припадками. Токсикомания.
F18.42H Синдром отмены летучих растворителей с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий). Наркомания.
F18.42T Синдром отмены летучих растворителей с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий). Токсикомания.
F18.43H Синдром отмены летучих растворителей с «профессиональным делирием». Наркомания.
F18.43T Синдром отмены летучих растворителей с «профессиональным делирием». Токсикомания.
F18.44H Синдром отмены летучих растворителей с делирием без галлюцинаций (люцидным). Наркомания.
F18.44T Синдром отмены летучих растворителей с делирием без галлюцинаций (люцидным). Токсикомания.
F18.45H Синдром отмены летучих растворителей с делирием абортивным. Наркомания.
F18.45T Синдром отмены летучих растворителей с делирием абортивным. Токсикомания.
F18.48H Синдром отмены летучих растворителей с делирием другим. Наркомания.
F18.48T Синдром отмены летучих растворителей с делирием другим. Токсикомания.
F18.49H Синдром отмены летучих растворителей с делирием неуточненным. Наркомания.
F18.49T Синдром отмены летучих растворителей с делирием неуточненным. Токсикомания.
F18.50H Шизофреноподобное расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.50T Шизофреноподобное расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.51H Преимущественно бредовое расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.51T Преимущественно бредовое расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.52H Преимущественно галлюцинаторное расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.52T Преимущественно галлюцинаторное расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.53H Преимущественно полиморфное психотическое расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.53T Преимущественно полиморфное психотическое расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.54H Расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей с преимущественно депрессивными психотическими симптомами. Наркомания.
F18.54T Расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей с преимущественно депрессивными психотическими симптомами. Токсикомания.
F18.55H Расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей с преимущественно маниакальными психотическими симптомами. Наркомания.
F18.55T Расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей с преимущественно маниакальными психотическими симптомами. Токсикомания.
F18.6H Амнестический синдром, связанный с употреблением летучих растворителей. Наркомания.
F18.6T Амнестический синдром, связанный с употреблением летучих растворителей. Токсикомания.
F18.70H Флэшбэк, связанный с употреблением летучих растворителей. Наркомания
F18.70T Флэшбэк, связанный с употреблением летучих растворителей . Токсикомания
F18.71H Расстройство личности и поведения, связанное с употреблением летучих растворителей. Наркомания
F18.71T Расстройство личности и поведения, связанное с употреблением летучих растворителей. Токсикомания
F18.72H Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей. Наркомания
F18.72T Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением летучих растворителей . Токсикомания
F18.73H Деменция, связанная с употреблением летучих растворителей. Наркомания
F18.73T Деменция, связанная с употреблением летучих растворителей. Токсикомания
F18.74H Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением летучих растворителей. Наркомания
F18.74T Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением летучих растворителей. Токсикомания
F18.75H Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением летучих растворителей. Наркомания
F18.75T Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением летучих растворителей. Токсикомания
F18.81H Другие психотические расстройства, связанные с употреблением летучих растворителей. Наркомания
F18.81T Другие психотические расстройства, связанные с употреблением летучих растворителей. Токсикомания
F18.82H Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением летучих растворителей. Наркомания
F18.82T Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением летучих растворителей. Токсикомания
F18.91H Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением летучих растворителей. Наркомания
F18.91T Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением летучих растворителей
F18.92H Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением летучих растворителей. Наркомания
F18.92T Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением летучих растворителей
F18.99H Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением летучих растворителей. Наркомания
F18.99T Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением летучих растворителей. Токсикомания

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F19 Психические и поведенческие расстройства вследствие сочетанного употребления наркотиков и других психоактивных веществ

F19.00H Острая интоксикация неосложненная, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Наркомания.

F19.00T Острая интоксикация неосложненная, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Токсикомания.

F19.01H Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Наркомания.

F19.01T Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Токсикомания.

F19.02H Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Наркомания.

F19.02T Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Токсикомания.

F19.03H Острая интоксикация с делирием, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Наркомания.

F19.03T Острая интоксикация с делирием, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Токсикомания.

F19.04H Острая интоксикация с нарушением восприятия, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Наркомания.

F19.04T Острая интоксикация с нарушением восприятия, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Токсикомания.

F19.05H Острая интоксикация с комой, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Наркомания.

F19.05T Острая интоксикация с комой, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Токсикомания.

F19.06H Острая интоксикация с судорогами, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Наркомания.

F19.06T Острая интоксикация с судорогами, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Токсикомания.

F19.1 Пагубное (с вредными последствиями) употребление нескольких наркотических средств и использование других психоактивных веществ

F19.201H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.201T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание (ремиссии). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.202H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.202T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание (ремиссии). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.203H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F19.203T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание (ремиссии). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.209H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F19.209T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание (ремиссии). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F19.211H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.211T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.212H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.212T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.213H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F19.213T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.219H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F19.219T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в предохраняющих условиях). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F19.221H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.221T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.222H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.222T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.223H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F19.223T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость).Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.229H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F19.229T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной терапии (контролируемая зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F19.231H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.231T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.232H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.232T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.233H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F19.233T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.239H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F19.239T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. В настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) средствами или препаратами, блокирующими действие наркотических и других веществ. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F19.241H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.241T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.242H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.242T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.243H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F19.243T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.249H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F19.249T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Употребление в настоящее время (активная зависимость). Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F19.251H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.251T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Систематическое (постоянное) употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.252H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.252T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Систематическое (постоянное) употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.253H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F19.253T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Систематическое (постоянное) употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.259H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F19.259T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Систематическое (постоянное) употребление. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F19.261H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.261T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.262H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.262T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.263H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F19.263T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.269H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F19.269T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F19.291H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.291T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление БДУ. Начальная (первая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.292H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Наркомания.

F19.292T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление БДУ. Средняя (вторая) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.293H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости. Наркомания.

F19.293T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление БДУ. Конечная (третья) стадия зависимости. Токсикомания.

F19.299H Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна. Наркомания.

F19.299T Синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. Периодическое употребление БДУ. Стадия зависимости неизвестна. Токсикомания.

F19.30H Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ неосложненный. Наркомания.

F19.30T Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ неосложненный. Токсикомания.

F19.31H Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с судорожными припадками. Наркомания.

F19.31T Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с судорожными припадками. Токсикомания.


F19.39H Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ БДУ. Наркомания.

F19.39T Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ БДУ. Токсикомания.

F19.40H Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием («классический» делирий). Наркомания.

F19.40T Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием («классический» делирий). Токсикомания.
F19.41H Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием и судорожными припадками. Наркомания.
F19.41T Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием и судорожными припадками. Токсикомания.
F19.42H Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий). Наркомания.
F19.42T Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с мусситирующим делирием («бормочущий» делирий). Токсикомания.
F19.43H Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с «профессиональным делирием». Наркомания.
F19.43T Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с «профессиональным делирием». Токсикомания.
F19.44H Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием без галлюцинаций (люцидным). Наркомания.
F19.44T Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием без галлюцинаций (люцидным). Токсикомания.
F19.45H Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием абортивным. Наркомания.
F19.45T Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием абортивным. Токсикомания.
F19.48H Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием другим. Наркомания.
F19.48T Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием другим. Токсикомания.
F19.49H Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием неуточненным. Наркомания.
F19.49T Синдром отмены сочетания или других психоактивных веществ с делирием неуточненным. Токсикомания.
F19.50H Шизофреноподобное расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания.
F19.50T Шизофреноподобное расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания.
F19.51H Преимущественно бредовое расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания.
F19.51T Преимущественно бредовое расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания.
F19.52H Преимущественно галлюцинаторное расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания.
F19.52T Преимущественно галлюцинаторное расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания.
F19.53H Преимущественно полиморфное психотическое расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания.
F19.53T Преимущественно полиморфное психотическое расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания.
F19.54H расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ с преимущественно депрессивными психотическими симптомами. Наркомания.
F19.54T расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ с преимущественно депрессивными психотическими симптомами. Токсикомания.
F19.55H расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ с преимущественно маниакальными психотическими симптомами. Наркомания.
F19.55T расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ с преимущественно маниакальными психотическими симптомами. Токсикомания.
F19.6H Амнестический синдром, связанный с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания.
F19.6T Амнестический синдром, связанный с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания.
F19.70H Флэшбэк, связанный с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания
F19.70T Флэшбэк, связанный с употреблением нескольких или других психоактивных веществ . Токсикомания
F19.71H Расстройство личности и поведения, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания
F19.71T Расстройство личности и поведения, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания
F19.72H Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания
F19.72T Остаточное (резидуальное) аффективное расстройство, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ . Токсикомания
F19.73H Деменция, связанная с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания
F19.73T Деменция, связанная с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания
F19.74H Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания
F19.74T Другое стойкое когнитивное нарушение, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания
F19.75H Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания
F19.75T Психотическое расстройство с поздним дебютом, связанное с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания
F19.81H Другие психотические расстройства, связанные с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания
F19.81T Другие психотические расстройства, связанные с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания
F19.82H Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания
F19.82T Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания
F19.91H Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания
F19.91T Неуточненные психотические расстройства, связанные с употреблением нескольких или других психоактивных веществ
F19.92H Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания
F19.92T Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением нескольких или других психоактивных веществ
F19.99H Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Наркомания
F19.99T Неуточненные психические расстройства, связанные с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Токсикомания

F20 – F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства



F20 – F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства

F20. Шизофрения

Общие диагностические указания[1]:

A. эхо мыслей, вкладывание и/или отнятие мыслей, передача мыслей на расстоянии
B. бред овладения, воздействия, бездействия относящийся ко всему телу (или конечностям), мыслям, действиям или ощущениям; бредовое восприятие
C. галлюцинаторные голоса, коментирующие или обсуждающие поведение больного; другие типы «голосов», идущих из разных частей тела
D. устойчивые бредовые идеи, совершенно невозможные по содержанию и не свойственные культуральной среде
E. устойчивые галлюцинации различных сфер чувств, сопровождающиеся либо нестойким, полуоформленным бредом с неясной аффективной окраской, либо устойчивые сверхценные идеи в течение недель и месяцев
F. разорванность мыслей или параллельные мысли, выраженные в инкогеренции, несвязной речи или неологизмах
G. кататонические расстройства, такие как возбуждение, застывание или восковая гибкость, негативизм, мутизм и ступор
H. «негативные» симптомы (не обусловленные депрессией или лечением нейролептиками) выраженные:
   1. апатией
   2. бедностью и/или неадекватностью эмоциональных реакций
   3. социальной отгороженностью
   4. социальной непродуктивностью
I. достоверные и выраженные изменения общего качества поведения, проявляющиеся:
   5. потерей интересов
   6. бесцельностью
   7. погруженностью в собственные переживания, аутизм
J. обычным требованием, достаточным для диагноза является наличие одного четкого (или двух менее четких) симптомов из группы A – D, или два симптома из группы E – I. Длительность проявлений должна составлять не менее одного месяца[2].
K. продромальные расстройства:
   – утрата повседневных интересов
   – пренебрежение правилами личной гигиены, своей внешностью
   – генерализованная тревога
   – легкие аффективные нарушения (преимущественно депрессивного характера)

не могут служить указателем начала шизофрении, в том числе – для расчета временного критерия!

L. при развитии симптомов шизофрении вместе с выраженными симптомами других расстройств (аффективными, эпилептическими, при других болезней мозга, при интоксикации лекарствами и психоактивными веществами) диагноз шизофрения не выставляется, и применяются соответственные диагностические категории и коды.
M. типы течения той или иной клинической формы шизофрении кодируется добавлением пятого знака:
   F20.x0 ...непрерывный
   F20.x1 ...эпизодический с нарастающим дефектом
   F20.x2 ...эпизодический со стабильным дефектом
   F20.x3 ...эпизодический ремитирующий
   F20.x7 ...другой
   F20.x9 ...период наблюдения менее года
N. в адаптированном варианте МКБ-10 предусмотрено обозначение шестым знаком кода отсутствие или наличие ремиссии, и при наличии ремиссии – ее характер:
   F20.xx4 ...неполная ремиссия
   F20.xx5 ...полная ремиссия
   F20.xx6 ...отсутствие ремиссии
   F20.xx8 ...другой тип ремиссии
   F20.xx9 ...ремиссия БДУ

---

[1] Ни один из симптомов не считается патогномоничным

[2] Состояние, сопровождающееся подобной симптоматикой, но продолжительностью до одного месяца, первоначально оценивается как «шизофреноподобный психоз», однако не исключена последующее изменение диагноза и перекодировка

/F20.0/ Параноидная ...

Диагностические критерии:

A. общие критерии **F20**
B. бред преследования, воздействия, отношения, особого предназначения, телесных изменений, ревности
C. слуховые галлюцинации – вербальные (угрожающего и/или императивного содержания) и невербальные (смех, свист и т.д.)
D. галлюцинации обонятельные, тактильные, вкусовые, общего чувства, реже – зрительные
E. неотчетливо выраженные эмоциональные, волевые, речевые, кататонические расстройства
F. в острых состояниях расстройства мышления могут затушевывать бредовые и/или галлюцинаторные переживания
G. возраст начала – обычно третий десяток жизни
H. типы течения – эпизодический (с полной или неполной ремиссией) или непрерывный

/F20.1/ Гебефреническая ...

Диагностические критерии:

A. общие критерии **F20**
B. возраст начала подростковый или юношеский (15 – 25 лет)
C. злокачественное течение с быстрым развитием «негативных» симптомов
D. выраженные расстройства поведения, влечений, побуждений
E. неадекватный, уплощенный, как правило, приподнятый аффект (дурашливость)
F. разорванные мышление и речь
G. указанные признаки должны наблюдаться не менее двух – трех месяцев
I. типы течения – эпизодический или непрерывный

/F20.2/ Кататоническая ...

Диагностические критерии:

A. общие критерии F20
B. обязательные и доминирующие расстройства:
   1. ступор
   2. возбуждение с беспорядочными движениями
   3. застывания
   4. негативизм
   5. ригидность
   6. восковая гибкость
   7. эхолалия, вербигирация
C. для неконтактных больных с кататоническими расстройствами диагноз устанавливается условно (с учетом других возможных причин развития кататонических расстройств)
D. кататонические симптомы могут сопровождаться онейроидными переживаниями (онейроидная кататония при рекуррентной шизофрении)
E. типы течения – приступообразно-прогредиентный или непрерывный

/F20.3/ Недифференцированная...

Диагностические критерии:

A. общие критерии F20
B. настоящий код применяется для полиморфных психотических состояний – кататоно-галлюцинаторных бредовых и т.д.
C. не отвечает критериям:
   1. параноидной, гебефренной или кататонической шизофрении
   2. резидуальной шизофрении или постшизофренической депрессии

/F20.4/ Постшизофреническая депрессия...

Диагностические критерии:

A. диагноз **F20.4** устанавливается только в случаях
   1. у больного наблюдались общие диагностические критерии **F20** не менее 12 предыдущих месяцев
   2. присутствие отдельных симптомов шизофрении не доминирует в состоянии больного
   3. симптомы депрессии отвечают критериям депрессивного эпизода **(F32.-)** и наблюдаются, по меньшей мере, две недели
B. в случае сочетания яркой шизофренической симптоматики с депрессией, диагноз шизофрении соответствующего типа сохраняется
C. в случае полной редукции симптомов шизофрении применяется диагноз **(F32.-)**
D. рассматривается как постпсихотический этап в динамике приступообразной шизофрении – F20.42

/F20.5/ Остаточная (резидуальная) ...

Диагностические критерии (обязательные):

A. отчетливые негативные симптомы шизофрении (соответствует понятию стойкого шизофренического дефекта, в том числе – конечного состояния):
   1. снижение психомоторной активности, пассивность, отсутствие инициативы
   2. речевое оскудение
   3. оскудение мимики
   4. снижение способности к самообслуживанию
   5. оскудение социальных контактов
B. наличие в прошлом хотя бы одного ясно очерченного психотического эпизода, отвечающего критериям **F20**
C. период, продолжительностью по меньшей мере в один год, в течение которого интенсивность и частота ярких психотических симптомов минимальна или или значительно снижена, и на первое место выступают негативные симптомы шизофрении
D. отсутствие:
   1. деменции или иной органической патологии мозга
   2. депрессии
   3. признаков госпитализма

/F20.6/ Простая...

Диагностические критерии:

A. постепенно нарастающие негативные симптомы шизофрении (сходные с **F20.5**) с грубыми изменениями поведения
B. отсутствие сведений о сколько-нибудь четко очерченных психотических эпизодах
C. рассматривается как вариант непрерывно текущей злокачественной шизофрении

/F20.8/ Другой тип ...

В данном случае имеются в виду:

F20.8xx1 Ипохондрическая...
F20.8xx2 Сенестопатическая
F20.8xx3 Детский тип ...
F20.8xx4 Атипичные формы
F20.8xx8 ...других установленных типов

/F20.9/ Неуточненная...

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе F20 Шизофрения

F20.004	*Параноидная шизофрения, непрерывный тип течения, неполная ремиссия*
F20.006	*Параноидная шизофрения, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии*
F20.014	*Параноидная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия*
F20.018	*Параноидная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, другой тип ремиссии*
F20.019	*Параноидная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, ремиссия БДУ*
F20.09	*Параноидная шизофрения, период наблюдения менее года*
F20.104	*Гебефреническая (гебефренная) шизофрения, непрерывный тип течения, неполная ремиссия*
F20.106	*Гебефреническая (гебефренная) шизофрения, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии*
F20.114	*Гебефреническая (гебефренная) шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия*
F20.118	*Гебефреническая (гебефренная) шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, другой тип ремиссии*
F20.119	*Гебефреническая (гебефренная) шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, ремиссия БДУ*
F20.19	*Гебефреническая (гебефренная) шизофрения, период наблюдения менее года*
F20.204	*Кататоническая шизофрения, непрерывный тип течения*
F20.206	*Кататоническая шизофрения, непрерывный тип течения, неполная ремиссия*
F20.214	*Кататоническая шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом,*
F20.218	*Кататоническая шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия*
F20.219	*Кататоническая шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, другой тип ремиссии*
F20.234	*Кататоническая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения*
F20.235	*Кататоническая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, неполная ремиссия*
F20.238	*Кататоническая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, полная ремиссия*
F20.239	*Кататоническая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, другой тип ремиссии*
F20.29	*Кататоническая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, ремиссия БДУ*
F20.304	*Недифференцированная шизофрения, непрерывный тип течения, неполная ремиссия*
F20.306	*Недифференцированная шизофрения, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии*
F20.314	*Недифференцированная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия*
F20.318	*Недифференцированная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, другой тип ремиссии*
F20.319	*Недифференцированная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, ремиссия БДУ*
F20.324	*Недифференцированная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, неполная ремиссия*
F20.325	*Недифференцированная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, полная ремиссия*
F20.328	*Недифференцированная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, другой тип ремиссии*
F20.329	*Недифференцированная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, ремиссия БДУ*

F20.335 Недифференцированная шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, полная ремиссия
F20.338 Недифференцированная шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, другой тип ремиссии
F20.339 Недифференцированная шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, ремиссия БДУ
F20.378 Недифференцированная шизофрения, другой тип течения, другой тип ремиссии
F20.379 Недифференцированная шизофрения, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.39 Недифференцированная шизофрения, период наблюдения менее года
F20.414 Постшизофреническая депрессия, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия
F20.424 Постшизофреническая депрессия, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, неполная ремиссия
F20.434 Постшизофреническая депрессия, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, неполная ремиссия
F20.435 Постшизофреническая депрессия, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, полная ремиссия
F20.438 Постшизофреническая депрессия, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, другой тип ремиссии
F20.439 Постшизофреническая депрессия, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, ремиссия БДУ
F20.478 Постшизофреническая депрессия, другой тип течения, другой тип ремиссии
F20.479 Постшизофреническая депрессия, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.49 Постшизофреническая депрессия, период наблюдения менее года
F20.504 Остаточная шизофрения, непрерывный тип течения, неполная ремиссия
F20.506 Остаточная шизофрения, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии
F20.514 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия
F20.518 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, другой тип ремиссии
F20.519 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, ремиссия БДУ
F20.524 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, неполная ремиссия
F20.528 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, другой тип ремиссии
F20.529 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, ремиссия БДУ
F20.588 Остаточная шизофрения, другой тип течения, другой тип ремиссии
F20.589 Остаточная шизофрения, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.59 Остаточная шизофрения, период наблюдения менее года
F20.604 Простой тип шизофрении, непрерывный тип течения, неполная ремиссия
F20.606 Простой тип шизофрении, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии
F20.8041 Ипохондрическая шизофрения, непрерывный тип течения, неполная ремиссия
F20.8042 Сенестопатическая шизофрения, непрерывный тип течения, неполная ремиссия
F20.8043 Детский тип шизофрении, непрерывный тип течения, неполная ремиссия
F20.8044 Атипичные формы шизофрении, непрерывный тип течения, неполная ремиссия
F20.8048 Шизофрения других установленных типов, непрерывный тип течения, неполная ремиссия
F20.8061 Ипохондрическая шизофрения, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии
F20.8062 Сенестопатическая шизофрения, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии
F20.8063 Детский тип шизофрении, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии
F20.8064 Атипичные формы шизофрении, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии
F20.8068 Шизофрения других установленных типов, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии
F20.8141 Ипохондрическая шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия
F20.8142 Сенестопатическая шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия
F20.8143 Детский тип шизофрении, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия
F20.8144 Атипичные формы шизофрении, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия
F20.8148 Шизофрения других установленных типов, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия
F20.8181 Ипохондрическая шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, другой тип ремиссии
F20.8182 Сенестопатическая шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, другой тип ремиссии
F20.8183 Детский тип шизофрении, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, другой тип ремиссии
F20.8184 Атипичные формы шизофрении, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, другой тип ремиссии
F20.8188 Шизофрения других установленных типов, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, другой тип ремиссии
F20.8191 Ипохондрическая шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, ремиссия БДУ
F20.8192 Сенестопатическая шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, ремиссия БДУ
F20.8193 Детский тип шизофрении, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, ремиссия БДУ
F20.8194 Атипичные формы шизофрении, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, ремиссия БДУ
F20.8198 Шизофрения других установленных типов, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, ремиссия БДУ
F20.8241 Ипохондрическая шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, неполная ремиссия
F20.8242 Сенестопатическая шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, неполная ремиссия
F20.8243 Детский тип шизофрении, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, неполная ремиссия
F20.8244 Атипичные формы шизофрении, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, неполная ремиссия
F20.8248 Шизофрения других установленных типов, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, неполная ремиссия
F20.8281 Ипохондрическая шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, другой тип ремиссии
F20.8282 Сенестопатическая шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, другой тип ремиссии
F20.8283 Детский тип шизофрении, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, другой тип ремиссии
F20.8284 Атипичные формы шизофрении, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, другой тип ремиссии
F20.8288 Шизофрения других установленных типов, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, другой тип ремиссии
F20.8291 Ипохондрическая шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, ремиссия БДУ
F20.8292 Сенестопатическая шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, ремиссия БДУ
F20.8293 Детский тип шизофрении, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, ремиссия БДУ
F20.8294 Атипичные формы шизофрении, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, ремиссия БДУ
F20.8298 Шизофрения других установленных типов, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, ремиссия БДУ
F20.8341 Ипохондрическая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, неполная ремиссия
F20.8342 Сенестопатическая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, неполная ремиссия
F20.8343 Детский тип шизофрении, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, неполная ремиссия
F20.8344 Атипичные формы шизофрении, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, неполная ремиссия
F20.8348 Шизофрения других установленных типов, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, неполная ремиссия
F20.8351 Ипохондрическая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, полная ремиссия
F20.8352 Сенестопатическая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, полная ремиссия
F20.8353 Детский тип шизофрении, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, полная ремиссия
F20.8354 Атипичные формы шизофрении, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, полная ремиссия
F20.8358 Шизофрения других установленных типов, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, полная ремиссия
F20.8381 Ипохондрическая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, другой тип ремиссии
F20.8382 Сенестопатическая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, другой тип ремиссии
F20.8383 Детский тип шизофрении, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, другой тип ремиссии
F20.8384 Атипичные формы шизофрении, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, другой тип ремиссии

F20.8388 Шизофрения других установленных типов, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, другой тип ремиссии
F20.8391 Ипохондрическая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, ремиссия БДУ
F20.8392 Сенестопатическая шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, ремиссия БДУ
F20.8393 Детский тип шизофрении, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, ремиссия БДУ
F20.8394 Атипичные формы шизофрении, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, ремиссия БДУ
F20.8398 Шизофрения других установленных типов, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения, ремиссия БДУ
F20.8781 Ипохондрическая шизофрения, другой тип течения, другой тип ремиссии
F20.8782 Сенестопатическая шизофрения, другой тип течения, другой тип ремиссии
F20.8783 Детский тип шизофрении, другой тип течения, другой тип ремиссии
F20.8784 Атипичные формы шизофрении, другой тип течения, другой тип ремиссии
F20.8788 Шизофрения других установленных типов, другой тип течения, другой тип ремиссии
F20.8791 Ипохондрическая шизофрения, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.8792 Сенестопатическая шизофрения, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.8793 Детский тип шизофрении, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.8794 Атипичные формы шизофрении, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.8798 Шизофрения других установленных типов, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.8991 Ипохондрическая шизофрения, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.8992 Сенестопатическая шизофрения, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.8993 Детский тип шизофрении, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.8994 Атипичные формы шизофрении, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.8998 Шизофрения других установленных типов, другой тип течения, ремиссия БДУ
F20.9 Шизофрения неуточненная

F21. Шизотипическое расстройство

Внимание!
Не рекомендуется широкое использование диагностических категории F21.1 и F21.2 в обычной практике из-за сложностей отграничения этих расстрой расстройств от случаев шизоидной или параноидной патологии личности.

Общие диагностические указания:

A. отсутствие общих диагностических признаков шизофрении (F20)
B. наличие шизофрении у родственников первой степени родства говорит в пользу данного диагноза, но не является необходимой предпосылкой
C. три или четыре перечисленных признака должны присутствовать постоянно или эпизодически, по меньшей мере, в течение двух лет:
   1. неадекватный и/или уплощенный аффект
   2. чудаковатые, эксцентричные поведение и внешний вид
   3. сокращение контактов с окружающими, социальная самоизоляция
   4. определяющие поведение странности во взглядах, магическое мышление, не соответствующие культуральным нормам
   5. подозрительность, параноидные идеи
   6. навязчивые, без внутреннего сопротивления, размышления дисморфофобического, агрессивного, сексуального и прочего содержания
   7. иллюзорное восприятие, дереализация, деперсонализация
   8. мышление аморфное, обстоятельное, метафорическое, излишне детализированное, стереотипное, проявляющееся вычурностью речи без выраженной разорванности
   9. эпизодические транзиторные квазипсихотические проявления иллюзорного, галлюцинаторного, бредоподобного характера
D. в некоторых случаях перечисленные симптомы являются продромом клинически очерченной шизофрении.
E. в данную диагностическую группу следует включать случаи расстройств, которые в отечественном варианте МКБ-9 как вялотекущая или малопрогредиентная шизофрения, для достоверного диагноза которой необходимы следующие клинические признаки:
   1. снижение активности, инициативы, психической продуктивности
   2. эмоциональная нивелировка
   3. парадоксальность суждений
F. настоящая диагностическая группа в адаптированной версии настоящей классификации включает семь диагностических категорий:

F21.1 Латентная шизофрения
F21.2 Шизофреническая реакция
F21.3 Псевдоневротическая (неврозоподобная) шизофрения
F21.4 Псевдопсихопатическая (психопатоподобная) шизофрения
F21.5 «Бедная симптомами» шизофрения
F21.8 Шизотипическое расстройство личности
F21.9 Шизотипическое расстройство неуточненное

F22. Хронические бредовые расстройства

Общие диагностические указания:
A. хронический бред является единственным или наиболее ярким клиническим проявлением
B. расстройства не могут быть квалифицированы как органические, шизофренические или аффективные
C. коды данной рубрики могут быть использованы в качестве дополнительных, уточняющих синдромальную характеристику шизофрении.

/F22.0/ Бредовое расстройство

Диагностические критерии:
D. хроническое состояние с монотематическим или политематическим систематизированным бредом, сохраняющиеся в некоторых случаях в течение всей жизни
E. исключают диагноз **F22.0** отчетливые симптомы шизофрении (**F20**) или указание на причинную связь бредового расстройства с органической дисфункцией мозга
F. начало заболевания чаще относится к среднему возрасту
G. кроме поступков и взглядов, отражающих бредовую тематику, поведение не отличается от нормального
H. содержание бреда носит сугубо личный характер
I. бредовые расстройства должны отмечаться не менее трех месяцев
J. могут наблюдаться эпизоды депрессивного расстройства (от отдельных симптомов до клинически очерченного депрессивного эпизода – **F32.-**)
K. включаются:
F22.01 Паранойя (в т.ч. – «паранойяльное развитие личности»)
F22.02 Поздняя парафрения
F22.03 Паранойяльная шизофрения с сензитивным бредом отношения
F22.08 Другое бредовое расстройство

/F22.8/ Другие хронические бредовые расстройства

Диагностические критерии:
A. состояние является резидуальным относительно F22.0, но не отвечает его критериям
B. стойкие хронические галлюцинации и другие отдельные симптомы шизофрении, в целом не соответствующие общим критериям F20
C. бредовые расстройства, длящиеся мене трех месяцев, первоначально кодируются в категории **F23.-**
D. включаются:
F22.01 Инволюционный параноид
F22.02 Паранойяльная шизофрения
F22.08 Другое хроническое бредовое расстройство

F22.9 Хронические бредовые расстройства, неуточненное

F23. Острые и преходящие психотические расстройства

Общие диагностические указания:
A. приоритетные характеристики
1. острое начало (в течение от 48 часов до двух недель) – переход от состояния без психотических симптомов к отчетливому психотическому состоянию[1]
2. полиморфизм симптомов и синдромов, типичных для шизофрении
3. связь (или отсутствие связи) с острым стрессом, подтверждающаяся появлением первых симптомов психоза в течение двух недель после одного или нескольких событий, которые в данной культуральной среде считаются психотравмирующими для большинства людей
4. возможная связь с острым стрессом или нозологическая принадлежность острого психоза кодируется пятым знаком:
F23.x0 ...без ассоциированного острого стресса
F23.x1 ...с ассоциированным острым стрессом
F23.x2 ...реактивное состояние
F23.x3 ...приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.x4 ...приступообразная шизофрения с ассоциированным острым стрессом
F23.x5 ...шизофреническая реакция без ассоциированного острого стресса
F23.x6 ...шизофреническая реакция с ассоциированным острым стрессом

[1] чем острее начало, тем благоприятнее прогноз

B. отчетливыми симптомы острого психоза считаются в том случае, если они затрудняют некоторые аспекты повседневной жизни или работы
C. полное выздоровление – в течение 2 – 3 месяцев, иногда недель и даже дней[1]

F23.0 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении

Диагностические критерии:
A. острое начало (в течение от 48 часов до двух недель) – переход от состояния без психотических симптомов к отчетливому психотическому состоянию
B. быстро меняющийся по характеру и интенсивности галлюциноз или бред (в течение дней или часов)
C. клиническая картина в определенной мере соответствует развитию острого фантастического бреда и острого бреда инсценировки
D. быстро меняющееся состояние аффекта
E. симптомы, не смотря на полиморфизм, не должны сочетаться так, чтобы отвечать критериям шизофрении (**F20.-**), маниакального (**F30.-**) или депрессивного (**F32.-**) состояний

F23.1 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении

Диагностические критерии:
A. соответствие критериям (A), (B) и (C) **F23.0** и дополняться критериями **F20** на протяжении большей части времени психотического расстройства
B. состояние соответствует клинической картине острого галлюциноза или острого синдрома психического автоматизма (синдром Кандинского – Клерамбо)
C. в случае присутствия симптомов шизофрении более 1 месяца – диагноз изменяется на соответствующий критериям F20.xxx

F23.2 Острое шизофреноподобное психотическое расстройство

Диагностические критерии:
A. острое начало (в течение от 48 часов до двух недель) – переход от состояния без психотических симптомов к отчетливому психотическому состоянию
B. симптомы соответствует критериям шизофрении (**F20.-**) на протяжении большей части времени с начала отчетливой клинической картины психотического расстройства
C. в клинической картине отсутствует полиморфизм
D. в случае присутствия симптомов шизофрении более 1 месяца – диагноз изменяется на соответствующий критериям F20.xxx

F23.3 Другие острые, преимущественно бредовые, психотические расстройства[2]

Диагностические критерии:
A. острое начало (в течение от 48 часов до двух недель) – переход от состояния без психотических симптомов к отчетливому психотическому состоянию
B. бред или галлюцинации на протяжении большей части времени с начала отчетливой клинической картины психотического расстройства
C. нет исчерпывающих диагностических критериев ни шизофрении **(F20.-)**, ни острого полиморфного психотического расстройства **(F23.0)**

F23.8 Другие острые и транзиторные психотические расстройства[3]

Диагностические критерии:
A. любые другие острые психотические расстройства не подпадающие под категории **F23.0 – F23.3**
B. в данной категории кодируются также состояния недифференцированного возбуждения, если детальная информация о психотическом состоянии пациента недоступна, но доказано неорганическое происхождение настоящего состояния

F23.9 Острые и транзиторные психотические расстройства неуточненные

---

[1] в случае появления признаков хронификации состояния и/или инвалидизации, расстройства нуждаются в переквалификации (перекодировке)

[2] в случае продолжительности бредовых расстройств более трех месяцев, диагноз должен быть изменен на хронические бредовые расстройства; в случае продолжительности только галлюцинаций более трех месяцев, диагноз должен быть изменен на другое неорганическое психотическое расстройство (F28.-)

[3] в случае продолжительности бредовых расстройств более трех месяцев, диагноз должен быть изменен на хронические бредовые расстройства; в случае продолжительности только галлюцинаций более трех месяцев, диагноз должен быть изменен на другое неорганическое психотическое расстройство (F28.-)

Список кодов и диагнозов, рекомендуемых к применению в диагностической группе

F23 Острое и преходящее психотическое расстройство

F23.00 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении, без ассоциированного стресса
F23.01 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении при наличии ассоциированного острого стресса
F23.02 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении – реактивное состояние
F23.03 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.04 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении, приступообразная шизофрения при наличии ассоциированного острого стресса
F23.05 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.06 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса
F23.10 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, без ассоциированного стресса
F23.11 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.12 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, реактивное состояние
F23.13 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.14 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, приступообразная шизофрения при наличии ассоциированного острого стресса
F23.15 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.16 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса
F23.20 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, без ассоциированного стресса
F23.21 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.22 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, реактивное состояние
F23.23 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.24 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, приступообразная шизофрения при наличии ассоциированного острого стресса
F23.25 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.26 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса
F23.30 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, без ассоциированного стресса
F23.31 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.32 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, реактивное состояние
F23.33 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.34 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, приступообразная шизофрения при наличии ассоциированного острого стресса
F23.35 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.36 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса
F23.80 Другие острые и преходящее психотические расстройства, без ассоциированного стресса
F23.81 Другие острые и преходящее психотические расстройства, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.82 Другие острые и преходящее психотические расстройства, реактивное состояние
F23.83 Другие острые и преходящее психотические расстройства, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.84 Другие острые и преходящее психотические расстройства, приступообразная шизофрения при наличии ассоциированного острого стресса
F23.85 Другие острые и преходящее психотические расстройства, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.86 Другие острые и преходящее психотические расстройства, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса
F23.90 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, без ассоциированного стресса
F23.91 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.92 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, реактивное состояние
F23.93 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.94 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное приступообразная шизофрения, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.95 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.96 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса
F23.00 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении без ассоциированного стресса
F23.01 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении при наличии ассоциированного острого стресса
F23.02 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении – реактивное состояние
F23.03 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.04 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении, приступообразная шизофрения при наличии ассоциированного острого стресса
F23.05 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.06 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса
F23.10 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, без ассоциированного стресса
F23.11 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.12 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, реактивное состояние
F23.13 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса

F23.14 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, приступообразная шизофрения при наличии ассоциированного острого стресса
F23.15 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.16 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса
F23.20 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, без ассоциированного стресса
F23.21 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.22 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, реактивное состояние
F23.23 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.24 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, приступообразная шизофрения при наличии ассоциированного острого стресса
F23.25 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.26 Острое шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое расстройство, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса
F23.30 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, без ассоциированного стресса
F23.31 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.32 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, реактивное состояние
F23.33 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.34 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, приступообразная шизофрения при наличии ассоциированного острого стресса
F23.35 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.36 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса
F23.80 Другие острые и преходящее психотические расстройства, без ассоциированного стресса
F23.81 Другие острые и преходящее психотические расстройства, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.82 Другие острые и преходящее психотические расстройства, реактивное состояние
F23.83 Другие острые и преходящее психотические расстройства, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.84 Другие острые и преходящее психотические расстройства, приступообразная шизофрения при наличии ассоциированного острого стресса
F23.85 Другие острые и преходящее психотические расстройства, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.86 Другие острые и преходящее психотические расстройства, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса
F23.90 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, без ассоциированного стресса
F23.91 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.92 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, реактивное состояние
F23.93 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, приступообразная шизофрения без ассоциированного стресса
F23.94 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное приступообразная шизофрения, при наличии ассоциированного острого стресса
F23.95 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, шизофреническая реакция без ассоциированного стресса
F23.96 Острое и преходящее психотические расстройства, неуточненное, шизофреническая реакция при наличии ассоциированного острого стресса

F24. Индуцированное бредовое расстройство

Общие диагностические указания:

A. два или более человека разделяют одинаковый бред или бредовую систему и один поддерживает другого в этой убежденности; только один из них имеет *истинное* бредовое расстройство (обычно шизофреническое), чаще это бред преследования или величия
B. индуктор и индуцируемые находятся в близких отношениях; бред исчезает у последних, если они изолированы от индуктора
C. имеются доказательства, что бред у индуцированного по времени и прочим характеристикам совпадает с бредом индуктора
D. индуцированные галлюцинации не исключают данного диагноза[1]

F25. Шизоаффективное расстройство...

Общие диагностические указания:

A. приступообразные расстройства, которые проявляются сочетанием аффективных и шизофренических симптомов в течение всего приступа болезни, или, по меньшей мере, несколько дней этого эпизода
B. их соотношение не позволяет определенно установить наличие типичного аффективного (F30 – F39) или шизофренического (F20 – F24) расстройства
C. пациенты, страдающие шизоаффективными расстройствами[2], обычно выздоравливают полностью, состояние дефекта развиваются реже

[1] встречаются редко
[2] особенно, если маниакальные симптомы преобладают над депрессивными

D. в случае если типичные эпизоды мании или депрессии перемежаются одним – двумя шизоаффективными приступами, диагноз шизоаффективнова расстройства неправомерен

/F25.0/ ...маниакальный тип

Диагностические критерии:

A. сочетание шизофренических симптомов с симптомами маниакального состояния:
   1. приподнятое настроение с идеями собственной переоценки, величия или…
   2. менее приподнятое настроение с повышенной раздражительностью и/или возбуждением в сочетании с агрессивным поведением и персекуторными идеями
   3. наличие, по меньшей мере, одного (предпочтительнее – двух) типичного шизофренического симптома (A – I в рубрике **F20**)
B. эта категория применяется как при единичном шизоаффективном эпизоде маниакального типа, так и для рекуррентного расстройства, в котором большая часть эпизодов – шизоаффективного маниакального типа
C. включаются
   F25.01 Приступообразная шизофрения, шизоаффективная…
   F25.08 Другое шизоаффективное расстройство, …

/F25.1/ ...депрессивный тип

Диагностические критерии:

A. сочетание шизофренических симптомов с симптомами депрессивного состояния:
B. выраженная депрессия, проявляющаяся, по меньшей мере, двумя депрессивными симптомами или депрессивным поведением, как описано в рубрике **F32**
C. наличие, по меньшей мере, двух типичных шизофренических симптомов (A – I в рубрике **F20**) с депрессивной окраской
D. эта категория применяется как при единичном шизоаффективном эпизоде депрессивного типа, так и для рекуррентного расстройства, в котором большая часть эпизодов – шизоаффективного депрессивного типа
E. включаются
   F25.11 Приступообразная шизофрения, шизоаффективная…
   F25.18 Другое шизоаффективное расстройство, …

/F25.2/ ...смешанный тип

Диагностические критерии:

A. сочетание симптомов шизофрении (**F20**) с одновременно возникающими симптомами смешанного биполярного аффективного расстройства (**F36.1**)
B. включаются
   F25.21 Приступообразная шизофрения, шизоаффективный вариант, смешанный (биполярный) аффективный тип
   F25.22 Смешанный психоз как циркулярный вариант приступообразной шизофрении
   F25.28 Другое шизоаффективное состояние со смешанными биполярными расстройствами

F25.8 Другое шизоаффективное расстройство

F25.9 Неуточненное шизоаффективное расстройство


F28. Другие неорганические психотические расстройства

Общие диагностические указания:

A. психотические расстройства без критериев шизофренических (**F20**), без критериев аффективного расстройства психотического типа (**F30 – F39**), без критериев хронического бредового расстройства (**F22**)

F29. Неуточненный неорганический психоз

F30 – F39 Расстройства настроения (Аффективные расстройства…)



F30 – F39 Расстройства настроения (аффективные расстройства)

Общие диагностические указания:

A. расстройства, при которых основным нарушением является измененное настроение (аффекта) депрессивного[1] или маниакального характера. Обычно расстройства аффекта проявляется в изменении общего уровня активности. Большая часть других симптомов вторична, либо легко вписывается в контекст изменений уровня активности.

B. большинство аффективных расстройств имеют тенденцию повторяться. Начало отдельных эпизодов часто связано с психотравмирующим событием или ситуацией.

C. диагнозы, кодируемые F30.2x, F31.2x, F31.5x, F32.3x и F33.3x, соответствуют в отечественной версии классификации случаям маниакально-депрессивного психоза:
   - коды F30.2x и F32.3x ставятся тогда когда тип течения маниакально-депрессивного психоза (биполярный или монополярный) еще невозможно установить из-за того, что речь идет о первой аффективной фазе.
   - коды F31.2x, F31.5x или F33.3x – когда ясен тип течения маниакально-депрессивного психоза
   - диагнозы под кодами F30.2x, F31.2x, F31.5x, F32.3x и F33.3x, соответствуют диагнозу маниакально-депрессивного психоза в том случае, если имеющиеся психотические расстройства соответствуют собственно аффективным расстройствам (конгруентны им)
   - если психотические расстройства в случаях F30.2x, F31.2x, F31.5x, F32.3x и F33.3x, не соответствуют аффективным расстройствам (не конгруентны им) и не соответствуют критериям шизофрении (F20.-), то согласно отечественной версии классификации, эти случаи должны рассматриваться как аффективно-бредовые варианты приступообразной (рекуррентной) шизофрении

F30. Маниакальный эпизод...

Общие диагностические указания:

A. выделяется три степени тяжести маниакального аффекта (F30.0 – F30.2) по общим характеристикам:
   1. повышенное настроение
   2. увеличение количества и повышение скорости физической и психической деятельности

B. все подразделения данной категории применяются в том случае, если маниакальный эпизод – единственный в жизни; если имеются сведения о предшествующих или последующих аффективных эпизодах (депрессивных, маниакальных или гипоманиакальных) расстройство должно кодироваться как биполярное аффективное расстройство (**F31.-**)

F30.0 Гипомания

Диагностические критерии:

A. постоянный легкий подъем настроения
   1. повышенная активность
   2. чувство благополучия, физической и психической продуктивности
   3. повышенная общительность, разговорчивость
   4. увеличенная сексуальность
   5. сниженная потребность во сне

B. достаточно длительное (по меньшей мере несколько дней) присутствие одного из симптомов А(1 – 5), исключающая диагноз циклотимия (**F34.0**)

C. социальная и рабочая дезадаптация не столь выражена, как при мании (**F30.1**)

F30.1 Мания без психотических симптомов.

Диагностические критерии:

A. настроение приподнято неадекватно обстоятельствам и может выражаться от беспечной веселости до почти неконтролируемого возбуждения

B. повышенное настроение сопровождается:
   1. повышением энергии выраженной в гиперактивности
   2. речевой напор
   3. снижение потребности во сне
   4. непризнание социальных ограничений
   5. выраженная отвлекаемость, невозможность сконцентрировать внимание
   6. поверхностность суждений, их грандиозность и сверхоптимистичность, завышенная самооценка

[1] чаще с тревогой

C. возможны расстройства восприятия:
   1. особая чувствительность в восприятии цветов («яркие», и обычно «прекрасные»)
   2. чрезмерное внимание к деталям предмета
   3. субъективная гиперчувствительность к звукам
D. расстройство поведения:
   1. поведение экстравагантное и непрактичное
   2. бездумная трата денег
   3. агрессивность
   4. влюбчивость и сексуальная расторможенность
E. в некоторых случаях, настроение больше раздражительное и подозрительное чем приподнятое
F. полное нарушение работоспособности и социальной адаптации
G. длительность эпизода – не менее одной недели

F30.2 Мания с психотическими симптомами.

Диагностические критерии:
A. состояние более тяжелое, чем **F30.1**:
   1. завышенная самооценка перерастает в бред величия
   2. раздражительность и подозрительность перерастают в бред преследования
   3. снижение потребности во сне
   4. непризнание социальных ограничений
   5. выраженная отвлекаемость, невозможность сконцентрировать внимание
   6. поверхностность суждений, их грандиозность и сверхоптимистичность, завышенная самооценка
B. в тяжелых случаях:
   1. скачка мыслей и речевой напор делают речь бессвязной
   2. мессианский бред
   3. агрессивные тенденции реализуются в акты насилия
   4. истощение и обезвоживание в результате пренебрежения сном, едой и питьем
   5. «конгруентный» (т.е., соответствующий аффекту) бред и галлюциноз[1]
   6. «неконгруентный» (т.е., несоответствующий аффекту) бред и галлюцинации[1]

   F30.23 ...с конгруентным аффекту бредом
   F30.24 ...с неконгруентным аффекту бредом
   F30.28 ...с другими психотическими симптомами

F30.8 Другой маниакальный эпизод

F30.9 Неуточненный маниакальный эпизод

F31. Биполярное аффективное расстройство..

Общие диагностические указания:
A. расстройство, характеризующееся:
   1. повторными (по меньшей мере – двумя) достоверно подтвержденными эпизодами расстройства настроения и уровня активности
   2. длительностью от двух недель до 4 – 5 месяцев (для депрессии – до 6 месяцев)
   3. полное выздоровление между приступами

F31.0 ...текущий гипоманиакальный эпизод

Диагностические критерии:
A. текущий эпизод отвечает критериям **F30.0**
B. по меньшей мере, еще один аффективный эпизод в прошлом (маниакальный, депрессивный или смешанный)

F31.1 ...текущий маниакальный эпизод без психотических симптомов

Диагностические критерии:
A. текущий эпизод отвечает критериям **F30.1**
B. по меньшей мере, еще один аффективный эпизод в прошлом (маниакальный, депрессивный или смешанный)

/F31.2/ ...текущий маниакальный эпизод с психотическими симптомами

[1] в случае ярко выраженных и резистентных к терапии «неконгруентных» бреда и галлюцинаций более уместен диагноз шизоаффективного расстройства (F25.-)

Диагностические критерии:
A. текущий эпизод отвечает критериям **F30.2**
B. по меньшей мере, еще один аффективный эпизод в прошлом (маниакальный, депрессивный или смешанный)
   F31.23 ...с конгруентным аффекту бредом
   F31.24 ...с неконгруентным аффекту бредом
   F31.28 ...с другими психотическими симптомами

/F31.3/ ...текущий эпизод умеренной или легкой депрессии

Диагностические критерии:
A. текущий эпизод отвечает критериям **F32.0** или **F32.1**
B. по меньшей мере, еще один аффективный эпизод в прошлом (маниакальный, депрессивный или смешанный)
   F31.30 без соматических симптомов
   F31.31 с соматическими симптомами

F31.4 ...текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов

Диагностические критерии:
A. текущий эпизод отвечает критериям **F32.2**
B. по меньшей мере, еще один аффективный эпизод в прошлом (маниакальный, депрессивный или смешанный)

/F31.5/ ...текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами

Диагностические критерии:
A. текущий эпизод отвечает критериям **F32.3**
B. по меньшей мере, еще один аффективный эпизод в прошлом (маниакальный, депрессивный или смешанный)
   F31.53 ...с конгруентным аффекту бредом
   F31.54 ...с неконгруентным аффекту бредом
   F31.58 ...с другими психотическими симптомами

F31.6 ...текущий эпизод смешанный

Диагностические критерии:
A. по меньшей мере, один маниакальный, гипоманиакальный или смешанный аффективный эпизод в прошлом
B. в настоящем эпизоде наблюдаются либо смешанные симптомы, либо быстро сменяющие друг друга маниакальные, гипоманиакальные или депрессивные симптомы
C. наиболее типичным является чередование маниакальных и депрессивных эпизодов, однако, симптомы мании и депрессии могут наблюдаться одновременно
D. длительность не менее двух недель, в течение которых оба набора симптомов выражены достаточно отчетливо

F31.7 Текущая ремиссия...

Диагностические критерии:
A. в прошлом, по меньшей мере, два аффективных эпизода
B. в настоящее время никаких аффективных расстройств не наблюдается

F31.8 ...другое

F31.9 ...неуточненное

F32. Депрессивный эпизод...

Общие диагностические указания:
A. расстройство, характеризующееся:
   1. сниженным настроением
   2. утратой интересов и удовольствий
B. другие общие симптомы:
   1. снижение способности концентрации внимания
   2. заниженные самооценка и уверенность в себе
   3. идеи вины и самоуничижения

4. мрачное, пессимистическое видение будущего
5. идеи и действия самоповреждения или суицидальные
6. нарушения сна
7. сниженный аппетит

C. состояние пониженного настроения мало подвержено изменениям в течение депрессивного эпизода, однако настроение может претерпевать суточные колебания[1]

D. категории **F32.0, F32.1** и **F32.2** применяются в случае однократного депрессивного эпизода; в случае двух и более депрессивных эпизодов применяются категории рекуррентного депрессивного расстройства (**F33**)

/F32.0/ ...легкий

Диагностические критерии:

A. необходимо присутствие двух симптомов из перечисленных симптомов
   1. сниженное настроение
   2. утрата интересов и способности получать удовольствие
   3. повышенная утомляемость

B. с данными симптомами должны сочетаться, по меньшей мере, два из других общих симптомов, описанных в **F32**

C. ни один из указанных симптомов не должен быть значительно выражен

D. минимальная длительность эпизода – две недели

F32.00 без соматических симптомов

F32.01 с соматическими симптомами (четыре или более соматических симптома или два – три сильно выраженных соматических симптома)

/F32.1/ ...умеренный

Диагностические критерии:

A. необходимо присутствие два из трех типичных симптомов, описанных F32.0 и три (лучше – четыре) других общих симптома описанных в F32

B. степень тяжести определяется либо тяжестью симптомов, либо обилием симптоматики

C. значительные затруднения в трудовой и социальной адаптации

F32.10 без соматических симптомов

F32.11 с соматическими симптомами

F32.2 ...тяжелый без психотических симптомов

Диагностические критерии:

A. проявляется напряженностью или ажитацией, либо особенно выраженной заторможенностью

B. присутствуют все три типичных симптома депрессивного эпизода (F32)

C. по меньшей мере, четыре других симптома депрессивного эпизода[2]

D. длительность не менее двух недель; в случае особой тяжести симптомов диагноз F32.2 выставляется в сроки менее двух недель

E. применяется лишь в случае однократного депрессивного эпизода

/F32.3/ ... тяжелый с психотическими симптомами

Диагностические критерии:

A. аффективные расстройства соответствуют критериям **F32.2**

B. клиническая картина дополнена бредом, галлюцинациями и/или депрессивным ступором

C. бред и галлюцинации «конгруентны» (т.е., соответствуют аффекту) или «неконгруентны»

D. применяется лишь в том случае, если депрессивный эпизод первый в жизни

F32.33 ...с конгруентным аффекту бредом

F32.34 ...с неконгруентным не соответствующим аффекту бредом

F32.38 ...с другими психотическими симптомами

F32.8 Другой депрессивный эпизод

Диагностические критерии:

A. эпизод не соответствуют критериям **F32.0** – **F32.3**

B. нет сомнений в депрессивном характере аффективного расстройства

F32.9 Неуточненный депрессивный эпизод

---

[1] настроение более снижено в утренние часы

[2] могут не высказываться в случаях ажитации или заторможенности

F33. Рекуррентное аффективное расстройство...

Общие диагностические указания:
A. повторные депрессивные расстройства, отвечающие диагностическим критериям **F32**
B. отсутствие в анамнезе маниакальных эпизодов или присутствие таковых, но по своей клинической выраженности соответствующих не более чем гипомании (**F30.0**) и следующих сразу после депрессивного эпизода (в противном случае кодируется как биполярный аффективный эпизод – **F31**)
C. продолжительность – в среднем шесть месяцев
D. возраст начала – как правило, пятый десяток жизни
E. эпизод может быть спровоцирован стрессовой ситуацией

/F33.0/ ...легкий

Диагностические критерии:
A. состояние соответствует критериям рекуррентного депрессивного эпизода (**F33**), а текущий эпизод соответствует критериям легкому депрессивному эпизоду (**F32.0**)
B. по меньшей мере, два эпизода в анамнезе продолжительностью минимум по две недели с интервалом до нескольких месяцев
F33.00 без соматических симптомов
F33.01 с соматическими симптомами

/F33.1/ ...умеренной тяжести

Диагностические критерии:
A. состояние соответствует критериям рекуррентного депрессивного эпизода (**F33**), а текущий эпизод соответствует критериям легкому депрессивному эпизоду (**F32.1**)
B. по меньшей мере, два эпизода в анамнезе продолжительностью минимум по две недели с интервалом до нескольких месяцев
F33.10 без соматических симптомов
F33.11 с соматическими симптомами

F33.2 ...тяжелый без психотических симптомов

Диагностические критерии:
A. состояние соответствует критериям рекуррентного депрессивного эпизода (**F33**), а текущий эпизод соответствует критериям легкому депрессивному эпизоду (**F32.2**)
B. по меньшей мере, два эпизода в анамнезе продолжительностью минимум по две недели с интервалом до нескольких месяцев

/F33.3/ ...тяжелый с психотическими симтомами

Диагностические критерии:
A. состояние соответствует критериям рекуррентного депрессивного эпизода (**F33**), а текущий эпизод соответствует критериям легкому депрессивному эпизоду (**F32.3**)
B. по меньшей мере, два эпизода в анамнезе продолжительностью минимум по две недели с интервалом до нескольких месяцев
F33.33 МДП, монополярно-депрессивный тип
F33.34 Депрессивно-бредовое состояние, монополярной тип с неконгруетным аффекту бредом
F33.38 ... с другими психотическими симптомами

F33.4 Текущая ремиссия...

Диагностические критерии:
A. состояние прошлых эпизодов соответствует критериям рекуррентного депрессивного эпизода (**F33**), но настоящее состояние не отвечает критериям депрессивного эпизода любой степени тяжести или какого-либо расстройства, указанного в рубриках **F30** – **F39**
B. по меньшей мере, два эпизода в анамнезе продолжительностью минимум по две недели с интервалом до нескольких месяцев

F33.8 ...другое

F33.9 ...неуточненное

F34. Хронические аффективные расстройства...

Общие диагностические указания:

A. хронический, флюктуирующий характер расстройств
B. отдельные эпизоды расстройства настроения недостаточно глубоки, чтобы соответствовать критериям даже гипомании или мягкой депрессии
C. длятся годами, но не приводят к нарушению продуктивности
D. в семейном анамнезе есть больные с аффективными расстройствами
E. в некоторых случаях более выраженные аффективные расстройства (единичные или рекуррентные) накладываются на хронические аффективные расстройства

F34.0 Циклотимия

Диагностические критерии:

A. постоянная, хроническая нестабильность настроения, выраженная либо в легкой депрессии, либо в легкой приподнятости настроения
B. выраженность и продолжительность расстройств не достаточны, чтобы соответствовать критериям биполярного аффективного расстройства (**F31**) или рекуррентного депрессивного расстройства (**F33**)
C. содержание отдельных эпизодов не соответствует критериям маниакального эпизода (**F30**) или депрессивного эпизода (**F32**)

F34.1 Дистимия

Диагностические критерии:

A. состояние хронически сниженного настроения
B. никогда не соответствует (или соответствует крайне редко) критериям рекуррентного аффективного расстройства легкой или средней тяжести (**F33.0**, **F33.1**)
C. начало в молодом возрасте и продолжается, по меньшей мере, несколько лет или неопределенно долго
D. начало в позднем возрасте, чаще связано с психотравмой

F34.8 ...другие

Диагностические критерии:

A. не столь выражены и не столь продолжительны, чтобы отвечать критериям циклотимии (**F34.0**) или дистимии (**F34.1**), но, тем не менее, клинически значимы

F34.9 ...неуточненные

F38. Другие аффективные расстройства...

/F38.0/ ...единичные...

F38.00 ...смешанный аффективный эпизод
F38.08 ...другие

Диагностические критерии:

A. продолжительность не менее двух недель
B. смешанные или быстро чередующиеся (обычно в течение нескольких часов) гипоманиакальные, маниакальные и депрессивные симптомы

/F38.1/ ...рекуррентные...

F38.10...кратковременный депрессивный эпизод
F38.18...другие

Диагностические критерии:


A. возникали примерно раз в месяц в течение последнего года
B. отдельные эпизоды длятся менее двух недель (два – три дня с полным выздоровлением, но отвечающие критериям **F32.0** – **F32.2**)

F38.8 ...уточненные...

Диагностические критерии:

A. аффективные расстройства, не отвечающие критериям F30.0 – F38.1

F39. Неуточненные аффективные расстройства...


F40 – F49
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
F40 Фобические тревожные расстройства
F40.0 Агорафобия...
F40.00...без панического расстройства
F40.01...с паническим расстройством
F40.1 Социальные фобии
F40.2 Специфические (изолированные) фобии
F40.8 Другие фобические тревожные расстройства
F40.9 Фобические тревожные расстройства неуточненные
F41 Другие тревожные расстройства
F41.0 Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревожность)
F41.1 Генерализованное тревожное расстройство
F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство
F41.3 Другие смешанные тревожные расстройства
F41.8 Другие уточненные тревожные расстройства
F41.9 Тревожное расстройство неуточненное
F42 Обсессивно-компульсивные расстройства
F42.0 Преимущественно навязчивые мысли или размышления («умственная жвачка»)
F42.1 Преимущественно навязчивые (компульсивные) действия (навязчивые ритуалы)
F42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия
F42.8 Другие обсессивно-компульсивные расстройства
F42.9 Обсессивно-компульсивное расстройство неуточненное
F43 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации
F43.0 Острая реакция на стресс
F43.1Посттравматическое стрессовое расстройство
F43.2 Расстройство адаптации...
F43.20...кратковременная депрессивная реакция
F43.21...пролонгированная депрессивная реакция
F43.22...смешанная тревожная и депрессивная реакция
F43.23...с преобладанием нарушений других эмоций
F43.24...с преобладанием нарушения поведения
F43.25...смешанное расстройство эмоций и поведения
F43.28...другие преобладающие специфические симптомы
F43.8 Другие реакции на тяжелый стресс
F43.9 Реакции на тяжелый стресс неуточненные
F44 Диссоциативне (конверсионные) расстройства
F44.0 Диссоциативная амнезия
F44.1 Диссоциативная фуга
F44.2 Диссоциативный ступор
F44.3 Трансы и состояния одержимости
F44.4 Диссоциативные двигательные расстройства
F44.5 Диссоциативные судороги
F44.6 Диссоциативные анестезия и утрата чувств
F44.7 Смешанные диссоциативные расстройства
F44.8 Другое диссоциативное расстройство...
F44.80...синдром Ганзера
F44.81...множественной личности
F44.82...транзиторные детского возраста
F44.88...другие уточненные
F44.9 Неуточненное диссоциативное расстройство
F45 Соматоформные расстройства
F45.0 Соматизированное расстройство
F45.1 Недифференцированное соматоформное расстройство
F45.2 Ипохондрическое расстройство
F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы
F45.30...сердца и сердечно-сосудистой системы
F45.31...верхней части желудочно-кишечного тракта
F45.32...нижней части желудочно-кишечного тракта
F45.33...органов дыхания
F45.34...мочеполовых органов
F44.38...других органов
F45.4 Устойчивое соматоформное болевое расстройство
F45.8 ...другое
F45.9 ...неуточненное
F48 Другие невротические расстройства
F48.0 Неврастения
F48.1 Синдром деперсонализации-дереализации
F48.8 Другие уточненные невротические расстройства
F48.9 Невротические расстройства неуточненные

F40 – F49 Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства

F40. Фобические и тревожные расстройства

Общие диагностические указания:

A. состояния тревоги, обусловленные только или преимущественно вполне определенными ситуациями или объектами (внешними по отношению к пациенту), которые в данный момент не являются объективно опасными
B. по отношению к этим ситуациям или объектам – либо характерно их избегание, либо испытывается страх
C. субъективно, физиологически, поведенчески фобическая тревога не отличается от других типов тревоги и может варьировать от легкого беспокойства до ужаса
D. концентрация пациентов на индивидуальных симптомах (сердцебиения, ощущение дурноты), обуславливающих вторичные страхи (смерти, потери самоконтроля, сумасшествия)
E. тревога не снижается от осознания того, что другие люди не считают данную ситуацию или объект опасным или угрожающим
F. тревога предвосхищения попасть в ситуацию, вызывающую фобию
G. в случае страха заболевания, диагноз фобического расстройства правомерен лишь тогда, когда пациент связывает возникновение заболевания с каким-либо конкретным местом или ситуацией (больница, стоматологический кабинет), в противном случае настоящая классификация относит страх какого-либо заболевания (нозофобия) или уродства (дисморфофобия) к ипохондрическому расстройству (**F45.2**)
H. в случае сочетания тревоги и депрессии, предпочтение отдается расстройству, которое развилось первым, или которое явно преобладает над другим на момент постановки диагноза

/F40.0/ Агорафобия...

Диагностические критерии:

A. включает совокупность взаимосвязанных и частично совпадающих фобий – навязчивых страхов оказаться в ситуации, когда будет невозможно быстро и легко оказаться в безопасном месте
B. состояние определяется:
   1. психологическими и вегетативными симптомами, которые являются первичным выражением тревоги[1]
   2. развитием тревожных состояний исключительно (или преимущественно) по меньшей мере, в двух из следующих ситуаций:
      – толпа
      – общественные места
      – дальние поездки из дома
      – поездки в одиночестве
   3. достаточно выраженным в определенных ситуациях поведением, направленным на преодоление страха и/или избегание ситуаций, связанных с фобией
   4. нарушением привычного жизненного стереотипа
   5. нарушением социальной адаптации (вплоть до отказа от любой деятельности вне дома)

F40.00 ... без панического расстройства
F40.01 ... с паническим расстройством

F40.1 Социальные фобии

Диагностические критерии:

A. навязчивый страх оказаться в центре внимания в относительно небольших группах людей (в отличие от агорофобии), и избегание таких ситуаций
B. социальные фобии могут быть:
   1. дискретными, то есть касаться какой-то конкретной ситуации (есть на людях, публичное выступление, встреча с людьми противоположного пола ...), или
   2. диффузными, то есть касаться любых социальных ситуаций вне семьи
C. социальные фобии как правило сочетаются с:
   1. заниженной самооценкой и болезненной самокритикой
   2. выраженными вегетативными расстройствами (тремор, гипергидроз, тошнота, императивные позывы к мочеиспусканию и прочие), которые иногда расцениваются больными как основное болезненное расстройство

[1] не вторичным по отношению к таким симптомам как бред или навязчивые мысли

D. тревожные расстройства могу прогрессировать, вплоть до развития панических атак
E. достоверный диагноз требует присутствия в состоянии больного следующих признаков:
   1. психологические, поведенческие и/или вегетативные симптомы должны быть первичным выражением тревоги[1]
   2. тревога должна быть ограничена лишь определенными социальными ситуациями
   3. избегание фобических ситуаций должно быть выраженным признаком (вплоть до социальной самоизоляции)

F40.2 Специфические (изолированные) фобии

Диагностические критерии:
A. фобия (навязчивый страх) строго ограниченных ситуаций – находиться радом с каким-либо животным, высоты, грозы, летать в самолете, закрытых пространств, мочеиспускания и дефекации в общественных туалетах, есть определенную пищу, стоматологических манипуляций, заболеть каким-либо определенным заболеванием[2]
B. специфическая ситуация может быть запускающим моментом для панической атаки
C. достоверный диагноз требует присутствия в состоянии больного следующих признаков:
   1. психологические, поведенческие и/или вегетативные симптомы должны быть первичным выражением тревоги[1]
   2. тревога должна ограничиваться лишь определенным фобическим объектом или ситуацией
   3. избегание (когда это возможно) фобической ситуации или объекта

F40.8 Другие фобические и тревожные расстройства

F40.9 Фобические и тревожные расстройства неуточненные

F41. Другие тревожные расстройства

Общие диагностические указания:
A. проявления тревоги – главные симптомы, но не ограниченные какой-то определенной ситуацией
B. депрессивные, обсессивные симптомы и элементы фобической тревоги являются отчетливо вторичными

F41.0 Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревожность)

Диагностические критерии:
A. повторные, непредсказуемые приступы (не ограничивающиеся какой-либо определенной ситуацией) выраженной тревоги (паники)
B. сопровождающие тревогу вегетативные болевые симптомы, дереализация и деперсонализация
C. вторичные страх смерти, утраты самоконтроля, сумасшествия
D. вторичное избегание какой-либо ситуации, в которой паническая атака возникла впервые
E. вторичные страхи остаться одному, людных мест, повторных панических атак
F. паническое расстройство является основным диагнозом в случае отсутствия какой-либо фобии как первичного расстройства[3]
G. достоверный диагноз панического расстройства требует, чтобы несколько тяжелых атак тревоги наблюдались, по меньшей мере, в течение одного месяца и отвечали следующим требованиям:
   1. паническое расстройство возникает при обстоятельствах, не связанных с объективной угрозой[4]
   2. паническое расстройство не ограничивается известной, предсказуемой ситуацией
   3. наличие свободных от тревоги периоды меду атаками

F41.1 Генерализованное тревожное расстройство

Диагностические критерии:
A. генерализованная и стойкая тревога, не ограниченная какими-либо определенными обстоятельствами (или возникает преимущественно при этих обстоятельствах)[5]
B. сопровождается:
   1. опасениями (страхами) за здоровье и свою жизнь, жизнь и здоровье близких, другие дурные предчувствия
   2. моторным (мышечным) напряжением – суетливость, тремор, невозможность расслабиться
   3. вегетативными или вегетативно-болевыми симптомами

---

1 а не быть вторичными по отношению к таким симптомам, как бред или навязчивые мысли
2 лучевая болезнь, рак, венерическое заболевание, с недавнего времени – СПИД
3 в противном случае, паническая атака рассматривается как признак выраженной фобии (F40.-)
4 возможна тревога предвосхищения атаки
5 так называемая «свободно плавающая тревога»

F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство

Диагностические критерии:

A. присутствуют симптомы тревоги депрессии, но ни те, ни другие по отдельности достаточно не выражены
B. для обоснованного диагноза обязательно:
   1. присутствие вегетативных симптомов (хотя бы эпизодическое)[1]
   2. отсутствие ясной причинной связи со значимыми психогенными ситуациями

F41.3 Другие смешанные тревожные расстройства

Диагностические критерии:

A. отвечает диагностическим критериям генерализованного тревожного расстройства (**F41.1**) в сочетании с хотя бы кратковременными признаками других расстройств, указанных в **F40 – F49**
B. отсутствие ясной причинной связи со значимыми психогенными ситуациями

F41.8 Другие уточненные тревожные расстройства

F40.9 Тревожные расстройства неуточненные

F42. Обсессивно-компульсивные расстройства

Общие диагностические указания:

A. повторяющиеся обсессивные мысли или компульсивные действия:
   1. ***обсессивные мысли –*** идеи, образы и влечения, повторяющиеся в стереотипной форме, носящие субъективно тягостный характер
   2. ***компульсивные действия или ритуалы*** – повторяющиеся стереотипные поступки, смысл которых заключается в предотвращении каких-либо объективно маловероятных событий, приносящих вред в отношении больного или со стороны больного, однако обычно воспринимаются больным как бесплодные и бессмысленные
B. наблюдаются большую часть дней за период не менее двух недель и являются источником дистресса и снижения активности больного
C. для достоверного диагноза необходимо:
   1. навязчивые действия и мысли расцениваются больным как собственные
   2. должны быть, по меньшей мере, одна мысль или одно действие, которым больной безуспешно сопротивляется, даже если есть другие мысли и действия, которым больной не сопротивляется
   3. мысль о выполнении действия не должно быть приятной (снижение тревоги и/или напряжения не считается приятным)
   4. мысли, представления и побуждения должны быть неприятно повторяющимися
D. компульсивные действия не обязательно должны соответствовать конкретным мыслям или опасениям, а лишь направлены на избавление от спонтанно возникающих ощущений внутреннего дискомфорта и/или тревоги

F42.0 Преимущественно навязчивые мысли или размышления[2]

Диагностические критерии:

A. мысли принимают форму идей, психических образов или импульсов к действию почти всегда неприятных для субъекта
B. мысли не приводят к решению и напротив, часто сочетаются с невозможностью принять обычные, необходимые для повседневной жизни решения
C. при сочетании с депрессивными проявлениями, данному диагнозу отдается предпочтение только в том случае, если навязчивые мысли возникают раньше депрессивных симптомов или продолжают оставаться без депрессивных симптомов

F42.1 Преимущественно компульсивные действия[3]

Диагностические критерии:

A. в основе поведения лежит страх, обычно опасности для больного или исходящей от больного, а компульсивное (ритуальное) действие – символическая и бесплодная попытка предотвратить опасность, занимающая иногда помногу часов в день

F42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия

Применяется в случае равно выраженных навязчивых мыслей и действий

---

1 в противном случае диагноз не используется
2 умственная жвачка
3 навязчивые ритуалы

F42.8 Другие обсессивно-компульсивные расстройства

F42.9 Неуточненное обсессивно-компульсивное расстройство

F43. Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации

Общие диагностические указания:
A. наличие одного из причинных факторов:
   1. исключительно сильного, выходящего за рамки повседневного опыта, стрессового события
   2. значительного изменения в жизни, приводящего к постоянному психологическому дистрессу
B. любой из причинных факторов является первичным, и без его воздействия расстройство не возникло бы

F43.0 Острая реакция на стресс

Диагностические критерии:
A. развивается как реакция на:
   1. исключительно сильное, но непродолжительное (в течение часов, дней) травматическое событие, угрожающее психической или физической целостности личности (природная или техногенная катастрофа, несчастный случай, участие в боевых действиях, преступное посягательство и тому подобные)
   2. резкое изменение социального статуса или окружения (смерть близкого, потеря значительной части имущества и тому подобные)
B. обязательная и четкая временная связь возникновения симптоматики с травмирующим событием
C. наличие симптомов:
   1. инициальное состояние оглушенности
   2. быстро сменяющие друг друга или смéшанные между собой (но не длящиеся долго) депрессия, тревога, отчаяние, гнев, гиперактивность или отгороженность
D. быстрая редукция симптоматики (в течение часов) в случае нейтрализации травмирующего фактора или в течение от суток до трех, если травмирующее событие невозможно нейтрализовать

F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство

Диагностические критерии:
A. отставленная и/или затяжная реакция на:
   1. исключительно сильное, но непродолжительное (в течение часов, дней) травматическое событие, угрожающее психической или физической целостности личности (природная или техногенная катастрофа, несчастный случай, участие в боевых действиях, преступное посягательство и тому подобные)
   2. резкое изменение социального статуса или окружения (смерть близкого, потеря значительной части имущества и тому подобные)
B. типичными признаками являются:
   1. повторные переживания психотравмы в виде навязчивых воспоминаний (реминисценций), кошмарных сновидений, фантазий и представлений
   2. в качестве фона повторных переживаний психотравмы наблюдаются чувство «оцепенелости» и эмоциональной притупленности, социальной отчужденности, сниженной реакции на окружающее, ангедония
   3. избегание ситуаций, напоминающих о психотравме
   4. временами могут наблюдаться острые эпизоды страха, паники, агрессии, вызванные неожиданными воспоминаниями о психотравме или реакции на нее
C. повышенные:
   1. вегетативная возбудимость
   2. уровень бодрствования с бессонницей
   3. реакции испуга
D. начало расстройства – после латентного периода (от нескольких недель до шести месяцев[1])
E. в большинстве случаев – полное выздоровление[2]

/F43.2/ Расстройство адаптации

Диагностические критерии:
A. наблюдается в период адаптации к значительному изменению социального статуса (потеря близких или длительная разлука с ними, положение беженца и тому подобные) или к стрессовому жизненному событию (в том числе – серьезное физическое заболевание)

---

[1] изредка – свыше шести месяцев

[2] в случае хронического – в течение нескольких лет – течения необходимо рассмотреть вопрос о перекодировании под рубрику F62.0 – хроническое изменение личности

B. индивидуальная предрасположенность (уязвимость), но в сочетании с доказательствами того, что расстройство не возникло бы без воздействия стрессора
C. наличие симптомов:
   1. депрессивное настроение, тревога, беспокойство
   2. чувство неспособности справится с ситуацией, приспособиться к ней
   3. некоторое снижение продуктивности в повседневных делах
   4. склонность к драматическому поведению, вспышки агрессии
D. доказанная временна́я связь между стрессором и возникшим расстройством – не более трех месяцев от начала действия стрессора
E. по преобладающему признаку уточняться пятым знаком:

F43.20 кратковременная депрессивная реакция
транзиторное (не более месяца) мягкое депрессивное состояние

F43.21 пролонгированная депрессивная реакция
легкое депрессивное (не более двух лет) состояние как ответ на длительное пребывание в стрессовой ситуации

F43.22 смешанная тревожная и депрессивная реакция
отчетливые тревожные и депрессивные симптомы, но выраженные не больше чем в смешанном тревожном и депрессивном расстройстве (**F41.2**) или в другом смешанном тревожном расстройстве (**F41.3**)

F43.23 с преобладанием нарушения других эмоций
сочетание нескольких типов эмоций, таких как тревога, депрессия, беспокойство и гнев; регресс поведения у детей, такие как энурез или сосание пальца

F43.24 с преобладанием нарушения поведения
реакция горя в виде агрессивного или диссоциального поведения (обычно у подростков)

F43.25 смешанное расстройство эмоций и поведения

F43.28 другие специфические преобладающие симптомы

F43.8 Другие реакции на тяжелый стресс

Диагностические критерии:
A. относятся состояния, возникшие в связи с тяжелым соматическим заболеванием, ставшим для пациента психотравмирующим событием (нозогенные реакции)
B. невротические реакции проявляющиеся
   1. опасениями по поводу своего нездоровья и невозможности полной социальной реабилитацией
   2. обостренное самонаблюдение с гипертрофированной субъективной оценкой угрожающих здоровью последствий соматического заболевания
C. при затяжных состояниях на первый план выступают:
   1. ригидная ипохондрия с тщательной регистрацией малейших признаков телесного неблагополучия
   2. установление щадящего «предохраняющего» от возможных осложнений или обострений перенесенного соматического заболевания режима
D. «ипохондрия здоровья»
E. в ряде случаев, у больных с угрожающим жизни заболеванием, синдром патологического отрицания болезни

F43.9 Реакция на тяжелый стресс, неуточненная

F44. Диссоциативное (конверсионное) расстройство...

Общие диагностические указания:
A. «конверсия» – трансформированный в симптомы неприятный аффект, порожденный конфликтной ситуацией или иными проблемами, которые больной не в состоянии разрешить
B. выражается:
   1. в частичной или полной дезинтеграции памяти на прошлое, осознанием собственной личности и собственных ощущений
   2. в потере контроля над двигательной сферой
C. расстройства носят «психогенный» характер и по времени тесно связаны с объективно доказанной или очевидной конфликтной ситуацией (травматическое событие, неразрешимые проблемы, нарушение меж персональных взаимоотношений), даже если таковая отрицается больным
D. чаще возникают и прекращаются внезапно, но некоторые (параличи и анестезии) развиваются постепенно и сохраняются длительно[1]
E. отсутствие связи расстройства с физическими или неврологическими нарушениями

1 обычно резистентны к терапии, если наблюдались в течение года – двух до обращения к психиатру

F44.0 ... амнезия

Диагностические критерии:

A. основной признак – потеря памяти, чаще на недавние события, не обусловленная органическим психическим заболеванием и распространяется на психотравмирующие события
B. объем и генерализованность амнезии варьируют день ото дня
C. сопровождается аффективными (депрессивными) расстройствами
D. нарушения поведения в виде поиска внимания или «спокойной примиренности»

F44.1 ... фуга

Диагностические критерии:

A. признаки диссоциативной амнезии (**F44.0**)
B. внешне целенаправленные путешествия вне пределов повседневных передвижений, которые в последствии амнезируются
C. внешне совершенно нормальное поведение (ухода за собой, несложные социальные взаимодействия)

F44.2 ... ступор

Диагностические критерии:

A. признаки ступора:
   1. резкое снижение или отсутствие произвольных движений
   2. отсутствие реакций на внешние раздражители
   3. полное или почти полное отсутствие речи
   4. отсутствие признаков сна или бессознательного состояния
B. отсутствие психического или физического расстройства, объясняющих ступор
C. объективные сведения о недавних конфликтах или иных психотравмирующих событиях

F44.3 ...трансы и состояния овладения

Диагностические критерии:

A. временная потеря идентификации собственной личности и полного осознания окружающего (действия и поступки управляются другой личностью, божеством, духами...)
B. ограниченный и повторяющийся набор высказываний, движений, поз
C. непроизвольный и нежелательный характер расстройств, затрудняющих повседневную деятельность
D. по объективным данным, возникают вне рамок шизофрении, острых психозов и органических психических расстройств

... расстройства движений... (F44.4 – F44.7)

Общие диагностические критерии:

A. потеря или затруднения движений в сочетании с нарушением чувствительности (чаще кожной)
B. расстройства отражают субъективные представления больного о якобы имеющимся у него физическим заболеванием, которые чаще всего вступают в противоречие с физиологией и анатомией
C. снижение продуктивности, связанное с расстройством, помогает избегать конфликтной ситуации или косвенно выразить негодование; сам больной отрицает объективно подтвержденной или очевидной конфликтной ситуации, а снижение продуктивности объясняет наличием симптомов расстройства
D. степень нарушения продуктивности может находиться в тесной связи с количеством и составом присутствующих людей и быть составляющей поведения, направленного на привлечение внимания
E. расстройства чувствительности, выраженные в разной степени ее потери (исключаются расстройства с дополнительными сенсациями, такими как боль, помещенных в рубрику соматоформных расстройств – **F45.-**)
F. для достоверного диагноза необходимо:
   1. отсутствуют сведения о физическом расстройстве
   2. наличие объективной информации о конфликтах и проблемах больного, убедительно объясняющих причины возникновения расстройств

F44.4 ...моторики

Диагностические критерии:

A. общие критерии **F44.4 – F44.7**
B. утрата способности к движению части конечности, конечности в целом или обеих конечностей
C. различные формы и степени нарушения координации (атаксия) или неспособности стоять без посторонней помощи (астазия – абазия)
D. преувеличенное дрожание одной или нескольких конечностей, либо – всего тела
E. сходство с любым вариантом неврологически обусловленных атаксии, апраксии, акинезии, афонии, дизартрии, дискинезии или паралича

F44.5 ...судороги

Диагностические критерии:

A. общие критерии **F44.4 – F44.7**
B. двигательно очень точно имитируют эпилептические припадки
C. отсутствуют прикусывание языка, последствия внезапных падений, непроизвольное мочеиспускание, потеря сознания (вместо него – ступор или транс)

F44.6 ...анестезия и утрата чувствительности

Диагностические критерии:

A. общие критерии **F44.4 – F44.7**
B. полная или частичная утрата восприятия одной или несколькими сферами чувств
C. области кожной анестезии отражают мнение больного о телесных функциях
D. утрата зрения чаще выражена в снижение остроты или «сужении поля зрительного восприятия», сочетающаяся с сохранной общей двигательной активностью

F44.7 ...смешанные

Диагностические критерии:

A. общие критерии **F44.4 – F44.7**
B. комбинация расстройств, описанных **F44.4 – F44.6**

/F44.8/ ...другие

F44.80 синдром Ганзера
характеризуется «приблизительными ответами» на вопросы в сопровождении некоторых других диссоциативных симптомов

F44.81 расстройство множественной личности
представление больного о том, что в нем существуют две или несколько разных личностей, проявляющихся не одновременно; каждая личность обладает своей индивидуальностью, памятью; смена личностей может происходить внезапно и обуславливаться травматическим событием

F44.82 транзиторные ... расстройства, возникающие в детском и подростковом возрасте

F44.88 ...другие уточненные

F44.9 ...неуточненные

F45. Соматоформное расстройство...

Общие диагностические указания:

A. повторяющееся возникновение у больного физических симптомов в сочетание с его требованиями медицинского обследования, несмотря на наличие объективных доказательств отсутствия физической болезни как основы данных расстройств
B. негативное отношение больного к попыткам объяснить данные расстройства психологическими причинами
C. элементы демонстративности в поведение, направленные на привлечение внимания, напористый и драматический характер предъявления жалоб
D. имеющиеся расстройства не носят характер ипохондрического бреда и в какой-то степени поддаются коррекции

F45.0 Соматизированное расстройство

Диагностические критерии:

A. общие диагностические указания для **F45**.
B. длительность расстройства не менее двух лет, на протяжении которых не было выявлено сколько-нибудь значительной физической причины для имеющихся расстройств
C. нарушение социальной адаптации (чаще – внутрисемейных отношений), связанное с причинами, вызвавшими расстройства
D. нередко сопровождаются тревожными и депрессивными расстройствами, которые выражены незначительно и являются вторичными

F45.1 Недифференцированное соматоформное расстройство

Диагностические критерии:

A. общие диагностические указания для **F45**.
B. отсутствие полной и типичной картины соматизированного расстройства (**F45.0**)

F45.2 Ипохондрическое расстройство

Диагностические критерии:

A. общие диагностические указания для **F45**.
B. постоянная озабоченность возможностью или наличием тяжелого прогрессирующего заболевания физической природы или уродства
C. нормальные ощущения чаще интерпретируются больным как признаки заболевания
D. внимание, как правило, сконцентрировано на одном – двух органах или системах организма
E. нередко попытки манипулирования в семье или иных социальных сферах, используя декларируемые расстройства
F. в ряде случаев, на первом плане состояния – стремление к преодолению недуга путем подбора оздоровительных мероприятий, щадящего режима и самолечения («сверхценная ипохондрия»)

/F45.3/ Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы...

Диагностические критерии:

A. общие диагностические указания для **F45**.
B. декларируемые расстройства схожи с симптомами заболеваний, обусловленных нарушениями вегетативной нервной системы (чаще – сердечно-сосудистых), однако больные редко конкретизируют – какое именно заболевание у них имеется
C. как правило, два типа симптомов:
   1. отражающих объективные признаки вегетативного возбуждения (сердцебиения, гипергидроз, эритема, тремор)
   2. субъективные, неспецифические симптомы (мимолетные боли, жжение, чувство тяжести, вздутия, растяжения)
D. указания на связь между симптомами и имеющимися проблемами психологического характера
E. диагноз должен быть уточнен пятым знаком, в зависимости от органа или системы, которые больной рассматривает в качестве источника симптомов:
   F45.30 ...сердца и сердечно-сосудистой системы
   F45.31 ...верхнего отдела желудочно-кишечного тракта
   F45.32 ...нижнего отдела желудочно-кишечного тракта
   F45.33 ...дыхательной системы
   F45.34 ...мочеполовой системы
   F45.38 ...других органов и систем

F45.4 Устойчивое соматоформное болевое расстройство

Диагностические критерии:

A. общие диагностические указания для **F45**.
B. постоянная, тяжелая и психически угнетающая боль
C. связь появления симптомов с конфликтами или психосоциальными проблемами
D. отсутствие других (первичных) психических расстройств (в первую очередь – депрессивных) обуславливающих алгии
E. в ряде случаев – стремление к преодолению болевых расстройств путем разработки вычурных, брутальных методов лечения с возможной аутоагрессией в тяжелых случаях

F45.8 Другие соматоформные расстройства

Диагностические критерии:

A. общие диагностические указания для **F45**.
B. симптомы строго ограничены каким-либо органом или частью тела
C. наиболее частые симптомы:
   1. ощущения разбухания, движения по коже
   2. «истерический ком» и другие формы дисфагии
   3. психогенная кривошея и другие психогенные миоспастические расстройства
   4. психогенный зуд
   5. психогенная дисменорея
   6. скрежетание зубами

F45.9 Соматоформное расстройство, неуточненное

F48. Другие невротические расстройства

F48.0 Неврастения

Диагностические критерии:

A. чаще других встречаются два типа жалоб:
   1. на повышенную умственную утомляемость, проявляющуюся снижением социальной активности
   2. на повышенную физическую утомляемость, неспособность осуществить даже небольшое физическое напряжение
B. расстройство должно сопровождаться, по меньшей мере, двумя из следующих симптомов:
   1. мышечные боли
   2. головокружения
   3. головная боль
   4. нарушения сна
   5. неспособность расслабиться
   6. раздражительность, ангедония
   7. диспепсия
C. вторичные и не выраженные подавленность и тревожность

F48.1 Синдром деперсонализации – дереализации

Диагностические критерии:


A. для достоверного диагноза расстройство должно содержать первый или второй признаки либо оба этих признака в сочетании с третьим и четвертым признаками:
   1. симптомы деперсонализации – больной чувствует, что его ощущения и/или действия не его собственные, удалены, оторваны от него, не его собственные
   2. симптомы дереализации – ощущения, что все окружающее больного (люди, предметы и тому подобное) нереально, отдалено, искусственно, кажется бесцветным и безжизненным
   3. критическое отношение больного к симптомам деперсонализации и/или дереализации – ощущение больным, что имеющиеся у него расстройства носят субъективный и спонтанный характер, а не навязаны извне кем-то или чем-то
   4. ясное сознание – отсутствуют признаки токсической спутанности или эпилепсии
B. в случае возникновения синдрома в рамках депрессивных, фобических, обсессивно-компульсивных или шизофренических расстройств, и диагностическое предпочтение отдается последним, а дереализация и/или деперсонализация считаются вторичными

F48.8 Другие уточненные невротические расстройства

Диагностические критерии:

A. данную диагностическую категорию следует применять для смешанных расстройств поведения, убеждений и эмоций с неопределенными этиологией и нозологической принадлежностью:
   1. расстройство Брике
   2. синдром Дата
   3. коро
   4. лата
   5. профессиональный невроз, включая писчий спазм
   6. психастения
   7. психастенический невроз
   8. психогенный обморок
B. тесная связь данных расстройств с культуральными, социальными убеждениями и нормами не позволяет считать их эндогенными расстройствами

F48.9 Невротическое расстройство, неуточненное


F50 – F59
Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами
F50
Расстройство приема пищи
F50.0 Нервная анорексия
F50.1 Атипичная нервная анорексия
F50.2 Нервная булимия
F50.3 Атипичная нервная булимия
F50.4 Переедание, связанное с другими психологическими расстройствами
F50.5 Рвота, связанная с другими психологическими расстройствами
F50.8 Другое расстройство приема пищи
F50.9 Расстройство приема пищи неуточненное
F51
Расстройство сна неорганической природы
F51.0 Бессонница
F51.1 Гиперосомния (сонливость)
F51.2 Расстройство режима сна и бодрствования
F51.3 Снохождение (сомнамбулизм)
F51.4 Ужасы во время сна (ночные ужасы)
F51.5 Кошмары
F51.8 Другое расстройство сна
F51.9 Расстройство сна неуточненное
F52
Сексуальные расстройства, не обусловленные органическими нарушениями или болезнями
F52.0 Отсутствие или потеря полового влечения
F52.1 Отвращение к половым сношениям и отсутствие полового удовольствия
F52.10...Сексуальное отвращение
F52.11...Отсутствие сексуального удовлетворения
F52.2 Недостаточность генитальной реакции
F52.3 Оргазмическая дисфункция
F52.4 Преждевременная эякуляция
F52.41...абсолютная
F52.42...относительная
F52.49...неуточненная
F52.5 Вагинизм неорганического происхождения
F52.6 Диспареуния неорганического происхождения
F52.7 Повышенное половое влечение
F52.8 Другие...
F52.9 Неуточненные...
F53
Психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках
F53.20...легкие
F53.21...тяжелые
F53.28...другие
F53.29...неуточненные
F54
Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других раздел
F55
Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости
F55.0 ...антидепрессантами
F55.1 ...слабительными средствами
F55.2 ...анальгетиками
F55.3 ...средствами снижения кислотности
F55.4 ...витаминами
F55.5 ...стероидами или гормонами
F55.6 ...специфическими травами и народными средствами
F55.8 ...другими...
F55.9 ...неуточненными...
F59
Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами, неуточненные

F50 – F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами

F50 Расстройства приема пищи

Исключаются:
- *анорексия или потеря аппетита БДУ (**R63.0**);*
- *затруднения питания и нарушенное питание (**R63.3**);*
- *расстройство питания в младенчестве и детстве (**F98.2**);*
- *поедание несъедобного у детей (**F98.3**).*

F50.0 Нервная анорексия

Диагностические критерии:

A. нервная анорексия представляет собой расстройство, характеризующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым и/или поддерживаемым самим пациентом

B. Для достоверного диагноза требуются все следующие признаки:

C. вес тела сохраняется на уровне, по меньшей мере, на 15% ниже ожидаемого или индекс массы тела Кветелета составляет 17,5 или ниже[1].
   1. больной сам стремится к снижению веса тела, избегая пищи или вызывая у себя рвоту, принимая слабительные средства, чрезмерно занимаясь гимнастикой, используя анорексигенные и/или диуретические средства
   2. искаженный образ собственного тела, навязчивые сверхценные идеи «не допустить ожирения», перспектива которого вызывает ужас
   3. общее эндокринное расстройство, включающее ось гипоталамус – гипофиз – половые железы и проявляющееся у женщин аменореей, а у мужчин потерей полового влечения и потенции; могут быть повышенными уровни гормона роста и кортизола, изменения периферического метаболизма тиреоидного гормона и аномалии секреции инсулина.
   4. в препубертатном возрасте – задержка (прекращение) роста, задержка развития вторичных половых признаков
   5. при сочетании с депрессивной и/или фобической симптоматикой необходима двойная кодировка

D. не редки случаи диссимуляции

Исключаются:
- *потеря аппетита (**R63.0**);*
- *психогенная потеря аппетита (**F50.8**).*

F50.1 Атипичная нервная анорексия

Диагностические критерии:

A. используется в тех случаях, когда отсутствуют один или более из ключевых признаков нервной анорексии (F50.0), но клиническая картина является достаточно типичной, или имеются все ключевые симптомы, но только в легкой форме

F50.2 Нервная булимия

Диагностические критерии:

Для достоверного диагноза требуются все следующие признаки:

A. постоянная озабоченность едой и непреодолимая тяга к пище; больной периодически не может удержаться от переедания

B. попытки противодействовать ожирения с помощью одного или более из следующих приемов:
   1. вызывание у себя рвоты
   2. злоупотребление слабительными средствами
   3. периодические голодания
   4. использование анорексигенных, тиреоидных препаратов или диуретиков.

C. болезненный страх ожирения; больной устанавливает для себя четко определенный предел веса тела, который намного ниже нормального веса

D. часто в анамнезе отмечаются предшествующие эпизоды нервной анорексии с ремиссией между двумя расстройствами от нескольких месяцев до нескольких лет

E. предшествующий эпизод может быть полностью выраженным или протекать в легкой скрытой форме с умеренным снижением веса и/или транзиторным периодом аменореи.

---

[1] этот индекс определяется соотношением веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах

F. может быть этапом нервной анорексии

Включаются:

- *булимия БДУ;*
- *нервная гиперорексия.*

F50.3 Атипичная нервная булимия

Диагностические критерии:

A. используется в тех случаях, когда отсутствуют один или более из ключевых признаков нервной булимии (**F50.2**), но клиническая картина является достаточно типичной

B. неполные синдромы с депрессивной симптоматикой (если депрессивные симптомы оправдывают отдельный диагноз депрессивного расстройства), следует устанавливать два отдельных диагноза.

Включается:

- *булимия нормального веса.*

F50.4 Переедание, связанное с другими психологическими расстройствами.

Здесь кодируется переедание, которое приводит к тучности и является реакцией на дистресс, особенно у лиц, предрасположенных к полноте.

Включается:

- *психогенное переедание.*

Исключаются:

- *ожирение (**E66.-**);*
- *полифагия БДУ (**R63.2**).*

F50.6 Рвота, связанная с другими психологическими расстройствами.

Применяется как второй диагноз при диссоциативных расстройствах (**F44.-**), ипохондрическом расстройстве (**F45.2**) где она может быть одним из соматических симптомов, и при беременности, когда в происхождении тошноты и рвоты могут принимать участие эмоциональные факторы.

Включается:

- *психогенная рвота.*

Исключаются:

- *тошнота и рвота БДУ (**R11**).*

F50.6 Другие расстройства приема пищи

Включаются:

- *поедание несъедобного неорганического происхождения у взрослых;*
- *психогенная утрата аппетита.*

F50.9 Расстройство приема пищи, неуточненное

F51 Расстройства сна неорганической природы

Общие диагностические указания:

A. настоящая диагностическая группа включает первично психогенные:

1. диссомнии – при которых основным является эмоционально обусловленное нарушение количества, качества или времени сна, то есть инсомния, гиперсомния и расстройство цикла сон-бодрствование
2. парасомнии – возникающие во время сна анормальные эпизодические состояния, то есть снохождение, ночные ужасы и кошмары.

Исключаются:

- *расстройства сна (органические)(**G47.-**)*

F51.0 Бессонница неорганической природы

Диагностические критерии:

A. бессонница – состояние с субъективно неудовлетворительной для больного продолжительностью и/или качеством сна на протяжении значительного периода времени

B. основными клиническими признаками для достоверного диагноза являются:

1. жалоба на плохое засыпание и поверхностный прерывистый сон
2. нарушение сна отмечается как минимум три раза в неделю на протяжении, по меньшей мере, одного месяца
3. озабоченность бессонницей и ее последствиями, как ночью, так и в течение дня

C. выраженный дистресс, обусловленный бессонницей, приводит к нарушениям психологической и социальной адаптации

D. наличие других психиатрических симптомов, таких как депрессия, тревога или обсессия, не исключает диагноза бессонницы в том случае, если она является первичным по тяжести (в том числе – длительности) расстройством

F51.1 Гиперсомния (сонливость) неорганической природы

Диагностические критерии:

A. гиперсомния – состояние или повышенной сонливости в дневное время и приступов сна (которые не объясняются недостаточной продолжительностью сна в ночное время), или пролонгированного перехода к состоянию полного бодрствования после пробуждения, часто имеются некоторые свидетельства психологической основы расстройства

B. для достоверного диагноза необходимы следующие клинические признаки:
   1. повышенная сонливость в дневное время или приступы сна, причиной которых не является недостаточная продолжительность сна, и/или продолжительный переход к состоянию полного бодрствования после пробуждения («опьянение сном»);
   2. расстройство сна отмечается ежедневно на протяжении более одного месяца или в виде повторяющихся периодов более короткой продолжительности и приводит к нарушениям психологической и социальной адаптации
   3. отсутствие дополнительных симптомов нарколепсии (каталексия, паралич сна, гипногогические галлюцинации) или клинических признаков апноэ сна (ночная остановка дыхания, повторяющиеся типичные храпящие звуки и прочие)
   4. отсутствие неврологического или соматического состояния, симптомом которого может быть сонливость в дневное время.

C. если гиперсомния является доминирующей жалобой у больных с другими психическими расстройствами, то диагноз психогенной гиперсомнии должен устанавливаться как дополнительный; когда другой диагноз не может быть установлен, регистрируется только код настоящей рубрики.

F51.2 Расстройство режима сна – бодрствования неорганической природы

Диагностические критерии:

A. настоящий код применяется для расстройств режима сна-бодрствования, при которых наиболее важную роль играют психологические факторы

B. для достоверного диагноза необходимы следующие клинические признаки:
   1. индивидуальный режим сна-бодрствования десинхронизирован относительно желаемого графика, соответствующего конкретным социальным требованиям и разделяемого большинством людей в том же социальном окружении;
   2. больной страдает от бессонницы в течение основного периода сна и от гиперсомнии в период бодрствования почти ежедневно на протяжении минимум одного месяца или повторяющимися эпизодами более короткой продолжительности;

C. нарушения психологической и социальной адаптации как результат неудовлетворительных продолжительности и качества сна

D. наличие психиатрических симптомов, таких как тревога, депрессия или гипомания, не исключает диагноза расстройства режима сна-бодрствования неорганической природы в том случае, если это расстройство доминирует в клинической картине

Включается:

– *психогенная инверсия циркадного, никтогемерального ритма или ритма сна*

F51.3 Снохождение (сомнамбулизм)

Диагностические критерии:

A. Снохождение или сомнамбулизм – состояние измененного сознания, при котором сочетаются феномены сна и бодрствования, во время которого наблюдаются:
   1. один или более эпизодов подъема с постели и хождения, что обычно имело место в первую треть ночного сна
   2. во время эпизода у больного пустое выражение лица с пристальным взглядом; он слабо реагирует на попытки окружающих повлиять на его поведение или вступить с ним в общение и требуются значительные усилия, чтобы разбудить его
   3. при пробуждении (после эпизода или на следующее утро) воспоминание об эпизоде отсутствует
   4. через несколько минут после пробуждения от эпизода снохождения отсутствуют нарушения психической активности или поведения, хотя вначале может быть короткий период некоторой спутанности и дезориентировки
   5. отсутствие данных об органическом психическом расстройстве, таком как деменция или эпилепсия
   6. отсутствие данных о диссоциативных расстройствах

F51.4 Ужасы во время сна (ночные ужасы)

Диагностические критерии:

A. эпизоды крайнего ужаса или паники, сочетающиеся с громкими выкриками, подвижностью и высокими уровнями вегетативной активности.

B. для достоверного диагноза необходимы следующие клинические признаки:
   1. один или более эпизодов пробуждения от сна с паническим криком; эти эпизоды характеризуются интенсивной тревогой, подвижностью и вегетативной гиперактивностью, в частности тахикардией, учащенным дыханием, расширением зрачков и потением
   2. эпизоды в типичных случаях длятся от 1 до 10 минут и обычно возникают в первую треть ночного сна
   3. больной слабо реагирует на попытки других людей повлиять на эпизоды ужасов во время сна, и такие попытки почти всегда приводят к дезориентировке и персеверативным движениям в течение, по меньшей мере, нескольких минут
   4. воспоминание о событии, если и имеется, то очень ограниченное (обычно один – два фрагментарных образа)
   5. отсутствие данных об органическом поражении ЦНС

F51.5 Кошмары

Диагностические критерии:

A. Кошмары – насыщенные тревогой или страхом сны, которые больной помнит очень детально.

B. Для достоверного диагноза необходимы следующие клинические признаки:
   1. пробуждение от ночного сна или дремы с детализированным и живым воспроизведением сновидений ярко устрашающего содержания, обычно включающего угрозу для жизни; пробуждение может наступать в любое время периода сна, хотя, как правило, во вторую половину;
   2. при побуждении от страшного сна быстро достигаются нормальный уровень бодрствования и ориентировка
   3. сновидения и возникающие в результате них расстройства сна приводят к выраженному дистрессу.

Включается:
- *расстройство тревожных сновидений.*

F51.8 Другие расстройства сна неорганической природы

F51.9 Расстройство сна неорганической природы, неуточненное

Включается:
- *эмоциональное расстройство сна БДУ*

F52. Сексуальные расстройства, не обусловленные органическими нарушениями или болезнями

Общие диагностические указания:

A. половая дисфункция включает различные варианты неспособности больного участвовать в половой жизни в соответствии с его желанием, в том числе
   1. отсутствие интереса
   2. отсутствие удовлетворения
   3. отсутствие физиологических реакций, необходимых для эффективного сексуального взаимодействия (например, эрекции)
   4. невозможность контролировать или переживать оргазм

Исключаются:
- *синдром Дата (**F48.8**)*
- *коре (F48.8)*

F52.0 Отсутствие или потеря полового влечения

Диагностические критерии:

A. первичная потеря полового влечения является основной проблемой, а не вторичной по отношению к другим сексуальным затруднениям, таким как отсутствие эрекции или диспарейния.

B. отсутствие полового влечения не исключает сексуального удовлетворения или возбуждения, но снижает уровень половой активности

Включаются:
- *фригидность:*
- *расстройство гипоактивного сексуального влечения.*

/F52.1/ Отвращение к половым сношениям и отсутствие полового удовольствия

F52.10 сексуальное отвращение

Предстоящая половая связь с партнером вызывает сильные негативные чувства, страх или тревогу, которые достаточны, чтобы привести к уклонению от половой активности.

F52.11 отсутствие сексуального удовлетворения

Возникают нормальные сексуальные реакции и переживается оргазм, но нет адекватного удовольствия. Эта жалоба намного чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Включается:

- *ангедониня (сексуальная).*

F52.2 недостаточность генитальной реакции

Диагностические критерии:

A. у мужчин – затруднения в наступлении или поддержании эрекции достаточной для удовлетворительного полового акта
B. у женщин – сухость влагалища или отсутствие увлажнения
C. наблюдаемые расстройства психогенной этиологии

Включаются:

- *расстройство полового возбуждения у женщин*
- *эректильное расстройство у мужчин*
- *психогенная импотенция*

F52.3 Оргазмическая дисфункция

Диагностические критерии:

A. оргазм не возникает или заметно задерживается
B. наблюдаемые расстройства психогенной этиологии

Включаются:

- *ингибированный оргазм мужской (женский)*
- *психогенная аноргазмия*

/F52.4/ Преждевременная эякуляция

Диагностические критерии:

A. неспособность задерживать эякуляцию на период, достаточный для удовлетворения от полового акта у обоих партнеров
B. наблюдаемые расстройства психогенной этиологии
C. пятым знаком уточняется характер расстройства:
   F52.41 ...абсолютная
   F52.42 ...относительная
   F52.49 ...неуточненная

F52.5 Вагинизм неорганического происхождения

Диагностические критерии:

A. спазм мышц влагалища, делающий невозможным половой акт
B. наблюдаемые расстройства первичны, психогенной этиологии

Включается:

- *психогенный вагинизм*

F52.6 Диспареуния неорганического происхождения

Диагностические критерии:

A. диспареуния – боль во время полового акта
B. наблюдаемые расстройства первичны, психогенной этиологии

Включается:

- *психогенная диспареуния.*

F52.7 Повышенное половое влечение

A. повышенное половое влечение без других психических расстройств
B. наблюдаемые расстройства первичны, психогенной этиологии

Включаются:

- *нимфомания*
- *сатириаз*

F52.8 Другая половая дисфункция, не обусловленная органическим расстройством или заболеванием

F52.9 Неуточненная половая дисфункция, не обусловленная органическим расстройством или заболеванием

F53. Психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом и не классифицируемые в других разделах

Общие диагностические указания:

A. настоящая диагностическая группа используется только для психических расстройств в послеродовой период
B. расстройства развились не позднее шести недель после родов
C. клинические проявления не отвечают критериям расстройств из других диагностических групп из-за недостаточности информации или из-за присутствия дополнительных клинических признаков, которые заставляют считать неадекватным кодирование в других разделах
D. обычно должны классифицироваться с использованием двух других кодов: первый из других разделов пятой главы (F), который указывает на специфический тип психического расстройства, а второй – O99.3 (психические заболевания и заболевания нервной системы, осложняющие послеродовой период) МКБ-10.

F53.0 Легкие психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом и не классифицируемые в других разделах

Включаются:

- *постнатальная депрессия БДУ;*
- *послеродовая депрессия БДУ.*

F53.1 Тяжелые психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом и не классифицируемые в других разделах

Включается:

- *послеродовой психоз БДУ.*

F53.8 Другие психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом и не классифицируемые в других разделах

F53.9 Послеродовое психическое расстройство, неуточненное

F54. Психологические и поведенческие факторы, связанные с расстройствами или заболеваниями, классифицированными в других разделах

Общие диагностические указания:

A. настоящая диагностическая категория используется для регистрации психологических или поведенческих факторов, которые сыграли важную роль в этиологии физических расстройств, классифицируемых в других главах МКБ-10
B. возникающие в результате воздействия данных факторов психические нарушения обычно являются легкими и часто пролонгированными (такие как беспокойство, эмоциональные конфликты, дурные предчувствия), сами по себе они не оправдывают использование какой-либо из категорий, описанных в разделе F МКБ – 10
C. для регистрации соматического расстройства следует использовать дополнительный код, например:
   - астма (**F54** плюс **J45.-**)
   - дерматит и экзема (**F54** плюс **L23-L25**)
   - язва желудка (**F54** плюс **K25.-**)
   - мукозный колит (**F54** плюс **K58.-**)
   - язвенный колит (**F54** плюс **K54.-**)
   - крапивница (**F54** плюс **L50.-**).

Включаются:

- психологические *факторы, нарушающие соматическое состояние.*

Исключается:

- *головная боль тензионного типа (**G44.2**).*

F55. Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости

Общие диагностические указания:

A. злоупотребление разнообразными медикаментами, патентованными препаратами и народными средствами лечения
B. можно выделить три особенно важных группы:
   1. не вызывающие зависимости психотропные препараты (такие как антидепрессанты)
   2. слабительные
   3. ненаркотические анальгетики, такие как аспирин и парацетамол
C. длительный, без необходимости прием и часто в повышенных дозировках
D. попытки отговорить от приема вещества или запретить его употребление часто встречают сопротивление, несмотря на предостережения о возможности развития соматических проблем
E. для определения типа используемого вещества может использоваться четвертый знак:

F55.0 Антидепрессанты
F55.1 Слабительные
F55.2 Анальгетики
F55.3 Средства снижения кислотности
F55.4 Витамины
F55.5 Стероиды или гормоны
F55.6 Специфические травы и народные средства
F55.8 Другие вещества, которые не вызывают зависимости
F55.9 Неуточненные


Исключается:

– *(вызывающее зависимость) злоупотребление психоактивными веществами (F10-F19).*

F59 Неуточненные поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами

Включается:

– *психогенная физиологическая дисфункция БДУ.*


F60 – F69
Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте
F60
Специфическое расстройство личности
F60.0 Параноидное (параноическое)...
F60.1 Шизоидное...
F60.2 Диссоциальное...
F60.3 Эмоционально-неустойчивое
F60.30...импульсивный тип
F60.31...пограничный тип
F60.4 Истерическое
F60.5 Ананкастное
F60.6 Тревожное (уклоняющееся, избегающее)...
F607 ... типа зависимой личности
F60.8 Другое ...
F60.9 Неуточненное ...
F60.-0...компенсация
F60.-1...декомпенсация
F60.-3...развитие личности
F60.-9...неуточненное
F61
Смешанное и другое расстройство личности
F61.0 Смешанное ...
F61.1 Причиняющее беспокойство ...
F62
Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью мозга
F62.0 ...после переживания катастрофы
F62.1 ...после психического заболевания
F62.8 Другие...
F62.9 Неуточненные...
F63
Расстройства привычек и влечений
F63.0 Патологическое влечение к азартным играм
F63.1 Патологическое влечение к поджогам (пиромания)
F63.2 Патологическое влечение к воровству (клептомания)
F63.3 Трихотиломания
F63.8 Другое ...
F63.9 Неуточненное ...
F64
Расстройства половой идентификации
F64.0 Транссексуализм
F64.1 Трансвестизм двойной роли
F64.2 Расстройство половой идентификации у детей
F64.21...транссексуального типа
F64.22...трансролевого типа
F64.29...неуточненное
F64.8 Другое ...
F64.9 Неуточненное ...
F65
Расстройства сексуального предпочтения
F65.0 Фетишизм
F65.1 Фетишистский трансвестизм
F65.2 Эксгибиционизм
F65.21...садистический тип
F65.22...мазохистический тип
F65.29...неуточненный
F65.3 Вуайеризм
F65.4 Педофилия
F65.5 Садомазохизм
F65.6 ...множественные
F65.8 ...другие
F65.9 ...неуточненные
F66
Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием
F66.0 Расстройство психосексуального созревания
F66.1 Эгодистоническая сексуальная ориентация...
F66.2 Расстройство сексуальных отношений...
F66.x0...гетеросексуальный тип
F66.x1...гомосексуальный тип
F66.x2...бисексуальный тип
F66.x8...другой тип
F66.8 Другие ...
F66.9 Неуточненные ...
F68
Другие расстройства личности и поведения в зрелом возрасте
F68.0 Преувеличение соматической симптоматики по психологическим причинам
F68.1 Умышленное вызывание или симулирование симптомов или инвалидности физического или психологического характера (поддельное нарушение)
F68.8 Другие уточненные...
F69
Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте неуточненные

F60 – F69 Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте

Общие диагностические указания:

A. клинически значимые, устойчивые поведенческие состояния, выражающие характеристики индивидуального стиля жизни и способа отношения к себе и другим.
B. данные состояния и типы поведения появляются либо в раннем возрасте (в процессе индивидуального развития или под влиянием конституциональных факторов и социального опыта), либо приобретаются позднее, в более зрелом возрасте

F60-F62 Специфические, смешанные и другие личностные расстройства, а также продолжительные изменения личности

Общие диагностические указания:

A. состояния, охватывающие глубоко укоренившиеся и постоянные модели поведения в виде ригидных ответных реакций на широкий диапазон личностных и социальных ситуаций
B. определяются чрезмерными, либо существенными отклонениями от образа жизни обычного, «среднего» индивидуума с культуральными особенностями его восприятия, мышления, чувствования и, особенно, межличностных отношений
C. часто, но не всегда, сочетаются с различной степенью субъективного дистресса и нарушением социальной адаптации
D. в отличие от изменений личности – представляют собой онтогенетические состояния, которые появляются в детстве или подростковом возрасте и сохраняются в периоде зрелости
E. не являются вторичными по отношению к другому психическому расстройству или заболеванию мозга, хотя могут предшествовать другим расстройствам или сосуществовать с ними
F. каждое состояние в этой группе может быть классифицировано согласно преобладающей форме поведенческих проявлений, которое ограничивается описанием ряда типов и подтипов, не взаимоисключающих друг друга, а частично совпадающих по некоторым характеристикам
G. данные расстройства подразделены на кластеры характерных черт, соответствующих наиболее часто встречающимся и заметным поведенческим проявлениям
H. при постановке диагноза личностного расстройства учитываются те личностные признаки, выраженность которых превышает предполагаемые пороговые значения, а оценка должна основываться на возможно большем количестве источников информации
I. в том случае, если расстройство личности предшествует или сопровождает ограниченное во времени или хроническое психическое расстройство, оба они должны быть диагностированы

F60 Специфическое расстройство личности...

Общие диагностические указания:

A. специфическое расстройство личности – тяжелое конституциональное нарушение тенденций характера и поведения индивидуума, вовлекающее обычно несколько сфер личности и почти всегда сопровождающееся личностной и социальной дезинтеграцией
B. не может быть объяснено обширным повреждением или заболеванием мозга или другим психическим расстройством
C. расстройство удовлетворяет следующим критериям:
   1. заметная дисгармония в личностных позициях и поведении, которая вовлекает обычно несколько сфер психических функций; например, аффективность, возбудимость, контроль побуждений, процессы восприятия и мышления, а также стиль отношения к другим людям
   2. хронический характер аномального стиля поведения, возникшего давно и не ограничивающегося эпизодами психической болезни
   3. аномальный стиль поведения является всеобъемлющим и отчетливо нарушает личностную и социальную адаптацию
   4. проявления всегда возникают в позднем детском или подростковом возрасте и продолжают свое существование в периоде зрелости
   5. расстройство приводит к значительному личностному дистрессу, но это может стать очевидным только на поздних этапах расстройства;
   6. обычно, но не всегда, расстройство сопровождается существенным ухудшением профессиональной и социальной продуктивности.

D. Для разных культуральных условий может оказаться необходимой разработка специальных критериев относительно социальных норм
E. Уточняется пятым или шестым (**F63.x**) состояния декомпенсации или развития личности:
F60.-1 – …компенсация
F60.-2 – …декомпенсация
F60.-3 – …развитие
F60.-9 – …неуточненное

F60.0 Параноидное (параноическое)…

Диагностические критерии:
A. наличие, по крайней мере, трех перечисленных характерологических признаков или особенностей поведения:
1. чрезмерная чувствительность к неудачам и отказам, постоянное недовольство кем-то, отказ прощать оскорбления, причинение ущерба и отношение свысока
2. подозрительность и общая тенденция к искажению фактов (неверное истолкование нейтральных или дружеских действий других людей как враждебных или подозрительных)
3. воинственно-щепетильное отношение к вопросам, связанным с правами личности, часто – не соответствующее фактической ситуации
4. возобновляющиеся неоправданные подозрения относительно сексуальной верности супруга или полового партнера
5. мнение о своей повышенной значимости, что проявляется постоянным отнесением происходящего на свой счет;
6. охваченность несущественными, «законспирированными» толкованиями окружающих событий

Включаются:
- *фанатичное;*
- *экспансивно-параноидное;*
- *сенситивно-параноидное;*
- *кверулянтное расстройство личности.*

Исключаются:
- *шизофрения* ***(F20.-)****;*
- *бредовое расстройство (****F22.-****).*

F60.1 Шизоидное…

Диагностические критерии:
A. наличие, по крайней мере, трех перечисленных характерологических признаков или особенностей поведения:
1. вообще ничто или мало что доставляет удовольствие
2. эмоциональная холодность, отчужденная или уплощенная аффективность
3. неспособность проявлять сильные (теплые, нежные или гнев) чувства по отношению к другим людям
4. слабая ответная реакция, как на похвалу, так и на критику
5. незначительный интерес к сексуальным контактам с другим лицом (здесь следует принимать во внимание возраст);
6. большая часть времени уделяется фантазиями и интроспекции
7. почти неизменное предпочтение в уединенной деятельности
8. заметная нечуткость к превалирующим социальным нормам и условиям
9. отсутствие близких друзей или доверительных связей (или существование лишь одной), нежелание иметь такие связи.

Исключаются:
- *шизофрения (****F20.-****);*
- *шизотипическое расстройство (****F21****);*
- *синдром Аспергера (****F84.5****);*
- *шизоидное расстройство в детском возрасте (****F84.5****);*
- *бредовое расстройство (****F22.0****).*

F60.2 Диссоциальное…

Диагностические критерии:
A. характеризуется грубым несоответствием между поведением и господствующими социальными нормами
B. наличие, по крайней мере, трех перечисленных характерологических признаков или особенностей поведения:
1. бессердечное равнодушие к чувствам других

2. грубая и стойкая позиция безответственности и пренебрежения социальными правилами и обязанностями
3. неспособность поддерживать взаимоотношения при отсутствии затруднений в их становлении
4. крайне низкая толерантность к фрустрациям, а также низкий порог разряда агрессии, включая насилие
5. неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта, особенно наказания
6. выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению, приводящему субъекта к конфликту с обществом

C. в качестве дополнительного признака может иметь место постоянная раздражительность

Включаются:
- *социопатческое;*
- *аморальне;*
- *асоциальное;*
- *антисоциальное;*
- *психопатическое расстройство личности.*

Исключаются:
- *расстройства поведения (**F9l.-**)*
- *эмоционально нестабильное расстройство личности (**F60.3**).*

/F60.3/ Эмоционально неустойчивое...

Диагностические критерии:

A. ярко выраженная тенденция к импульсивным действиям, без учета последствий в сочетании с неустойчивым настроением

B. способность планирования минимальна; легко провоцируемые вспышки интенсивного гневливого аффекта, часто приводящие к актам насилия, «поведенческим взрывам»

C. выделяются две разновидности этого личностного расстройства:

F60.30 ...импульсивный тип

эмоциональная неустойчивость и отсутствие контроля импульсивности, вспышки жестокости и угрожающего поведения – преобладающие характеристики.

Включается:
- *эксплозивное и агрессивное расстройство личности.*

Исключается:
- *диссоциальное расстройство личности (**F60.2**).*

F60.31 ...пограничный тип

Имеются некоторые характеристики эмоциональной неустойчивости а, кроме того, образ Я, намерения и внутренние предпочтения (включая сексуальные) часто непонятны или нарушены (характерно хроническое чувство опустошенности). Склонность быть включенным в напряженные (неустойчивые) отношения может привести к возобновляющимся эмоциональным кризисам и сопровождаться серией суицидальных угроз или актов самоповреждения (хотя все это может также иметь место без явных провоцирующих факторов)

Включается:
- *пограничное расстройство личности.*

F60.4 Истерическое...

Диагностические критерии:

A. драматизацией, театральностью, преувеличенным выражением эмоций

B. внушаемостью, подверженность влиянию окружающих или обстоятельств

C. поверхностность и лабильность эмоций

D. постоянная взбудораженность, стремление быть в центре внимания, к признанию со стороны окружающих,

E. чрезмерная озабоченность своей внешностью, неуместное стремление к привлекательности во внешнем виде и поведении

F. в качестве дополнительных черт – эгоцентричность, потворство по отношению к себе, постоянное желание быть признанным, легкость обиды и постоянное стремление манипулировать окружающими для удовлетворения своих потребностей

F60.5 Ананкастное ...

Диагностические критерии:

A. чрезмерная склонность к сомнениям и осторожности

B. особое внимание к деталям, правилами, перечнями, порядку, организации или графиками

C. стремление к совершенству (перфекционизм), препятствующему выполнению задач

D. чрезмерная добросовестность, скрупулезность и неадекватная озабоченность продуктивностью в ущерб удовольствию и межличностным связям
E. повышенная педантичность и приверженность социальным условностям
F. ригидность и упрямство
G. необоснованные настойчивые требования больного, чтобы другие все окружающие делали в точности как и он сам, или неблагоразумное нежелание позволять окружающим выполнять что-либо по-своему
H. возникновение настойчивых и нежелательных мыслей и влечений

Включаются:
- *компульсивное и обсессивное расстройство личности;*
- *обсессивно-компульсивное расстройство личности.*

Исключается :
- *обсессивно-компульсивное расстройство (**F42.-**).*

F60.6 Тревожное, уклоняющееся, избегающее ...

Диагностические критерии:
A. постоянные общее чувство напряженности и тяжелые предчувствия
B. ощущение социальной никчемности, личностной непривлекательности и приниженности по сравнению с другими
C. повышенная чувствительность к критике в свой адрес или непринятию в обществе
D. нежелание вступать во взаимоотношения без гарантий понравиться
E. ограниченность жизненного уклада из-за потребности в физической безопасности
F. уклонение от социальной или профессиональной деятельности связанной со значимыми межличностными контактами из-за страха критицизма, неодобрения или отвержения со стороны окружающих

F60.7 Расстройство личности зависимого типа ...

Диагностические критерии:
A. активное или пассивное перекладывание на других большей части важных решений в своей жизни;
B. подчинение своих собственных потребностей потребностям других людей, от которых зависит больной и чрезмерная податливость их желаниям
C. неспособность предъявлять даже разумные требования людям, от которых больной находится в зависимости
D. чувство неудобства или беспомощности в одиночестве из-за чрезмерного страха оказаться несостоятельным в жизни
E. страх быть покинутым лицом, с которым имеется тесная связь, и остаться предоставленным самому себе
F. ограниченная способность принимать повседневные решения без постоянных советов и подбадривания со стороны других лиц
G. дополнительно – представления о себе как о беспомощном, некомпетентном человеке, не обладающем жизнестойкостью.

Включаются:
- *астеническая;*
- *неадекватная;*
- *пассивная и пораженческая личность (расстройство личности)*

F60.8 Другое...

A. Расстройство личности, которое не соответствует ни одной из специфических рубрик **F60.0 -F60.7**.

Включаются :
- *эксцентрическое;*
- *«безудержное»;*
- *инфантильное;*
- *пассивно-агрессивное;*
- *психоневротическое расстройство личности*

F60.9 Неуточненное...

Включаются:
- *патологическая личность БДУ;*
- *невроз характера БДУ.*

F61 Смешанное и другие расстройства личности

Общие диагностические указания:
Эта категория предназначена для личностных расстройств и аномалий, которые не проявляются специфическим набором симптомов описанных в **F60.-**.

F61.0 Смешанные расстройства личности

Имеются признаки нескольких расстройств из **F60.-**, но без преобладания симптоматики, которая позволила бы более специфическую диагностику.

F61.1 Причиняющие беспокойство изменения личности

Не классифицируемые в **F60.-** или **F62.-** и рассматриваемые как вторичные к основному диагнозу сосуществующего аффективного или тревожного расстройства.
Исключается:
- *акцентуация личностных черт (Z73.1).*

F62 Хронические изменения личности не связанные с повреждением или заболеванием мозга...

Общие диагностические указания:
A. включаются расстройства зрелой личности и поведения, развившиеся, в результате катастрофических или чрезмерных продолжительных стрессов или вслед за тяжелыми психическими заболеваниями.
B. заметные или длительные личностные изменения восприятия и оценки окружения и самого себя, а также отношения к ним в сочетании со стойким плохо адаптированным поведением, которое отсутствовало до патогенного переживания.
C. изменения не должны быть проявлением (симптомом) иного психического расстройства или резидуальным симптомом какого-либо предшествующего психического расстройства, являются результатом травмирующих переживаний или последствием тяжелых рецидивирующих или длительных психических расстройств
D. диагноз не может быть установлен, если личностное расстройство является вторичным по отношению к значительному повреждению или заболеванию мозга. (F07.0).

Исключается:
- *личностное и поведенческое расстройство вследствие болезни, повреждения и дисфункции мозга (**F07.-**).*

F62.0 ... после переживания катастрофы

Диагностические критерии:
A. развивается вслед за исключительно тяжелым стрессом (переживание катастрофы – пребывание в концентрационных лагерях, пытки, стихийные бедствия, длительную подверженность угрожающим жизни обстоятельствам) когда личностная уязвимость не играет роли
B. чаще данное расстройство возникает вслед за посттравматическим стрессовым расстройство (**F43.1**) и тогда он может рассматриваться как хроническое, необратимое продолжение стрессового расстройства
C. нарушение межперсональных связей и профессиональная дезадаптация, обусловленные хроническими и ригидными изменениями личности
D. изменение личности должно быть объективно подтверждено и установлено наличие не наблюдавшихся ранее признаков таких как:
   1. враждебное или недоверчивое отношение к миру;
   2. социальная отгороженность;
   3. ощущения опустошенности и безнадежности;
   4. хроническое чувство волнения, как бы постоянной угрозы, существования «на грани»;
   5. отчужденность.
E. изменение личности должно отмечаться на протяжении минимум двух лет и не должно быть объяснимо предшествующим расстройством личности или психическим расстройством, за исключением посттравматического стрессового расстройства (**F43.1**)
F. должно быть исключено наличие повреждения или болезни мозга, которое могло бы обусловить сходные клинические признаки .

Включается:
- *изменение личности после пребывания в концентрационном лагере пленения с постоянной возможностью быть убитым, длительной подверженности угрожающей жизни ситуации, такой как оказаться жертвой терроризма или пыток.*

Исключается :
- *посттравматическое стрессовое расстройство (**F43.1**)*

F62.1 ...после психического заболевания

Диагностические критерии:

A. изменение личности, связанное со страданием из-за тяжелой психической болезни, не может быть объяснено предшествующим расстройством личности, и должно быть дифференцировано от резидуальной шизофрении и других состояний неполного выздоровления от предшествовавшего психического заболевания.
B. изменения личности развиваются вслед за клиническим выздоровлением от психической болезни, которая может переживаться как эмоционально-стрессовая и разрушающая индивидуальный образ «Я».
C. этот тип изменений личности зависит от субъективного эмоционального опыта и предшествующей личности, ее адаптации и специфической уязвимости.
D. для установления диагноза этого типа изменения личности должны иметься такие клинические признаки как:
   1. чрезмерная зависимость и требовательное отношение к другим
   2. очевидные изменения или стигматизация личности вследствие перенесенной болезни, ведущая к неспособности формировать и поддерживать тесные и доверительные личностные отношения и к социальной изоляции
   3. пассивность, снижение интересов (даже в сфере досуга)
   4. постоянные жалобы на болезнь, что может сочетаться с ипохондрическими претензиями и поведением, свойственным больному
   5. дисфорическое или лабильное настроение, не обусловленное текущим психическим расстройством или предшествовавшим психическим заболеванием с остаточными аффективными симптомами
   6. значительное нарушение в социальном и трудовом функционировании по сравнению с преморбидным уровнем
E. предшествующая манифестация должна иметь место в период двух или более лет
F. изменения не должны быть связаны с обширным повреждением или болезнью мозга
G. предыдущий диагноз шизофрении не исключает данный диагноз.

F62.8 Другие...

Включается:

– *хроническое изменение личности после переживаний, не упомянутых в* ***F62.0*** *и* ***F62.1****, такое как хронический болевой личностный синдром и хроническое изменение личности после утраты близких.*

F62.9 Неуточненное...

F63 Расстройства привычек и влечений

Общие диагностические указания:

A. расстройства характеризуются повторяющимися поступками без ясной рационализации мотивации, которые, в общем, противоречат интересам самого пациента и других людей
B. поведение вызвано влечениями, которые не могут быть контролируемы
C. причины этих состояний непонятны и эти расстройства группируются вместе из-за значительного описательного сходства, а не потому, что они разделяют другие важные признаки
D. в соответствии с традицией исключены привычное чрезмерное употребление алкоголя или наркотиков (**F10 – F19**), а также расстройства привычек и влечений, включающие сексуальное (**F65.-**) поведение или прием пищи (**F52.-**)

F63.0 Патологическое влечение к азартным играм

Диагностические критерии:

A. Основным признаком является постоянно повторяющееся участие в азартной игре, что продолжается и часто углубляется, несмотря на социальные последствия, такие как обнищание, нарушение внутрисемейных взаимоотношений и руинирование личной жизни

Включается:

– *компульсивное участие в азартных играх.*

F63.1 Патологическое влечение к поджогам (пиромания)

Диагностические критерии:

A. повторные поджоги без очевидных мотивов, таких как получение денег месть или политический экстремизм;
B. повышенный интерес к виду огня:
C. чувство возрастающего напряжения перед поджогом и сильного возбуждения сразу же после него.

F63.2 Патологическое влечение к воровству (клептомания)

Диагностические критерии:

A. периодически испытывает влечение к краже предметов, что не связано с личной необходимостью в них или материальной выгодой, от предметов могут отказываться, они могут выбрасываться или запасаться
B. пациент обычно описывает повышающееся чувство напряжения перед актом воровства и чувство удовлетворения во время или сразу после него, обычно делаются слабые попытки скрыть воровство, но для этого используются не все возможности.
C. воровство совершается в одиночку, без соучастников
D. между эпизодами воровства из магазинов или других мест больные могут испытывать тревогу, уныние и чувство вины, но это не предупреждает рецидивы.

F63.3 Трихотиломания

Диагностические критерии:

A. заметная потеря волос в связи с периодической неспособностью противостоять влечению, выдергивать волосы
B. выдергиванию волос обычно предшествует нарастающее напряжение, а после него испытывается чувство облегчения и удовлетворения
C. диагноз не должен устанавливаться при предшествующем воспалении кожи или если выдергивание волос возникает в результате бреда или галлюцинаций.

Исключается:

– *стереотипные двигательные нарушения с выдергиванием волос (**F98.4**).*

F63.8 Другие расстройства привычек и влечений

Диагностические критерии:

A. рубрика используется для других разновидностей постоянно повторяющегося дезадаптивного поведения, которые не являются вторичными по отношению к распознаваемому психиатрическому синдрому и при которых наблюдается неспособности противостоять влечению к определенному поведению
B. имеется продромальный период напряжения с чувство облегчения при выполнении соответствующего акта

F63.9 Расстройство привычек и влечений, неуточненное

F64 Расстройства половой идентификации

F64.0 Транссексуализм

Диагностические критерии:

A. желание жить и быть принятым в качестве лица противоположного пола, обычно сочетающееся:
   1. с чувством дискомфорта от своего анатомического пола
   2. желанием получать гормональное и хирургическое лечение с целью сделать свое тело как можно более соответствующим избранному полу
B. для диагностики данного расстройства необходимо существование стойкой транссексуальной идентификации, по крайней мере, в течение двух лет, что не должно быть симптомом другого психического, генетического или хромосомного заболевания

F64.1 Трансвестизм двойной роли (трансролевое поведение)

Диагностические критерии:

A. ношение одежды противоположного пола, как часть образа жизни с целью получения удовольствия от временного ощущения своей принадлежности к противоположному полу, но без малейшего желания более постоянного изменения пола или связанной с этим его хирургической коррекции
B. переодевание не сопровождается возбуждением, что отличает данное расстройство от фетишистского трансвестизма (**F65.1**).

Включаются:

– *нарушения половой идентификации нетранссексуального типа в подростковом и зрелом возрасте.*

Исключается:

– *фетишистский трансвестизм (**F65.1**)*

/F64.2/ Расстройство половой идентификации у детей

Диагностические критерии:

A. расстройства, обычно впервые появляющиеся в раннем детстве (и всегда до начала пубертата), характеризующиеся постоянной и интенсивной неудовлетворенностью по поводу зарегистрированно-

го пола вместе с настойчивым желанием принадлежать (или убежденностью в принадлежности) к противоположному полу
B. этот диагноз не может устанавливаться, если индивидуум достиг пубертатного возраста
C. поскольку расстройство половой идентификации детского возраста имеет много общих признаков с другими расстройствами идентификации в этом разделе, оно помещено в рубрике **F64 -**, а не в **F90 – F98**.
D. необходимо указывать тип расстройства (пятый знак):
F64.21 ...трассексуального типа
F64.22 ...трасролевого типа
F64.29 ...неуточненное

Исключаются:
- *эгодистоническая половая ориентация (**F66.1**);*
- *расстройство полового созревания (**F66.0**).*

F64.6 Другие расстройства половой идентификации

F64.9 Расстройство половой идентификации неуточненное

Включается:
- *расстройство половой роли БДУ.*

F65 Расстройства сексуального предпочтения

Включаются:
- *парафилии.*

Исключаются:
- *проблемы, связанные с сексуальной ориентацией (F66).*

F65.0 Фетишизм

Диагностические критерии:
A. использование какого-либо неодушевленного предмета в качестве стимула для сексуального возбуждения и сексуального удовлетворения; фетиши являются дополнениями к человеческому телу, такие как предметы одежды, обуви; изготавливаются из особых материалов, таких как резина, пластик или кожа (фетиши могут варьировать в их значимости для индивидуума)
B. Фетишизм может быть диагностирован лишь, если фетиш является наиболее значительным источником сексуальной стимуляции или является необходимым для удовлетворительного сексуального ответа
C. фетишистские фантазии не считаются расстройством до тех пор, пока они не приводят к ритуальным действиям, которые являются столь непреодолимыми и неприемлемыми, что препятствуют осуществлению полового акта обычным путем, тем самым, вызывая страдания у самого индивидуума
D. фетишизм встречается почти исключительно у мужчин.

F65.1 Фетишистский трансвестизм

Диагностические критерии:
A. надевание одежды противоположного пола (чтобы сделать внешность субъекта похожей на внешность, свойственную противоположному полу) главным образом для достижения сексуального возбуждения.
B. сильным желанием снять одежду после достижения оргазма и снижения сексуального возбуждения
C. часто возникает как ранняя фаза у транссексуализма

Включается :
- *трансвестистский фетишизм.*

/F65.2/ Эксгибиционизм...

Диагностические критерии:
A. периодическая или постоянная наклонность к демонстрации собственных половых органов незнакомым людям (обычно лицам противоположного пола) или в общественных местах, без предложения или намерений более близкого контакта
B. обычно, но не всегда во время демонстрации имеет место половое возбуждение, которое часто сопровождается мастурбацией
C. эта наклонность может проявляться только в периоды эмоционального стресса или кризиса, перемежаясь длительными периодами без подобного поведения.
E. необходимо указывать тип расстройства (пятый знак):
F65.21 ...садистический тип
F65.22 ...мазохистический тип
F65.29 ...неуточненный тип

F65.3 Вуайеризм

Диагностические критерии:

A. периодическая или постоянная наклонность наблюдать за людьми занимающимися сексом или «интимными делами», такими как раздевание

B. обычно приводит к половому возбуждению и мастурбации и осуществляется тайно от наблюдаемой особы

F65.4 Педофилия

Диагностические критерии:

A. сексуальное предпочтение детям обычно пребуртатного или раннего пубертатного возраста

F65.5 Садомазохизм

Диагностические критерии:

A. предпочтение сексуальной активности, включающей в себя причинение боли или унижение (мазохизм – индивидуум предпочитает быть подверженным такого рода стимуляции, садизм – предпочитает быть ее источником)

B. эта категория может использоваться лишь в тех случаях, когда садо-мазохистская активность является наиболее значительным источником сексуальной стимуляции или необходима для сексуального удовлетворения.

F65.6 Множественные расстройства сексуального предпочтения

Диагностические критерии:

A. наблюдается более одного нарушения сексуального предпочтения без четкого преобладания одного из них (наиболее часто сочетаются фетишизм, трансвестизм и садомазохизм)

F65.8 Другие расстройства сексуального предпочтения

Диагностические критерии:

A. включаются другие виды нарушения сексуального предпочтения и сексуальной активности, каждое из которых встречается относительно редко:
   1. непристойные телефонные звонки,
   2. прикосновение к людям и трение о них в многолюдных общественных местах для сексуальной стимуляции – т.е. фроттеризм,
   3. сексуальные действия с животными,
   4. сдавление кровеносных сосудов или удушение для усиления полового возбуждения,
   5. предпочтение сексуальных партнеров с какими-либо особыми анатомическими дефектами,
   6. некрофилия

Включаются:

- *фроттеризм;*
- *некрофилия.*

F65.9 Расстройство сексуального предпочтения, неуточненное

Включается:

- *сексуальная девиация БДУ*

F66 Психологические и поведенческие расстройства связанные с сексуальным развитием и ориентацией[1]

Общие диагностические указания:

для регистрации вариантов сексуального развития и ориентации, которые могут обуславливать проблемы для индивидуума, используются следующие пятизначные коды:

F66.x0 Гетеросексуальный тип
F66.x1 Гомосексуальный тип
F66.x2 Бисексуальный тип[2]
F66.x8 Другой тип, включая препубертатный

F66.0 Расстройство психосексуального созревания

Диагностические критерии:

A. пациент страдает от сомнений в собственной половой принадлежности или сексуальной ориентации, что приводит к тревоге или депрессии

1 сама сексуальная ориентация не рассматривается в качестве расстройства

2 используется только при очевидности сексуальной привлекательности обоих полов.

B. наиболее часто это имеет место в юношеском возрасте у лиц, которые не уверены в том, являются ли они гомосексуальными, гетеросексуальными или бисексуальными или у лиц, которые после периода явно стабильной сексуальной ориентации обнаруживают, что их сексуальная ориентация изменяется

F66.1 Эго-дистоническая сексуальная ориентация по полу

Диагностические критерии:

A. половая принадлежность или сексуальное предпочтение не вызывают сомнения, однако индивидуум хочет чтобы они были другими по причине дополнительно имеющихся психологических или поведенческих расстройств и может искать лечение с целью изменить их

F66.2 Расстройства сексуальных отношений

Диагностические критерии:

A. нарушения половой принадлежности или сексуального предпочтения вызывают трудности в формировании или обеспечении отношений с сексуальным партнером

F66.8 Другие расстройства психосексуального развития

F66.9 Расстройство психосексуального развития неуточненное

F68 Другие расстройства зрелой личности и поведения у взрослых

F68.0 Преувеличение соматических симптомов по психологическим причинам.

Диагностические критерии:

A. соматические симптомы, соответствующие и первоначально обусловленные установленным соматическим расстройством, заболеванием или инвалидизацией, становятся преувеличенными или пролонгированными благодаря психологическому состоянию больного
B. направленное на привлечение внимания (гистрионное) поведение, которое может включать дополнительные (и обычно неспецифические) жалобы несоматической природы.
C. мотивирующим фактором могут быть:
   1. оправданные волнения относительно имеющегося заболевания (усиление болей, вероятность инвалидизации)
   2. неудовлетворенность результатами лечения или обследований или разочарование в связи с недостаточным вниманием, которое уделяется пациенту в клинических учреждениях
   3. возможность получения финансовой компенсации за несчастные случаи или травмы, но даже после успешного юридического разрешения ситуации необязательно быстрая редукция расстройства

Включается

- *компенсационный невроз*

F68.1 Умышленное вызывание или симуляция симптомов или инвалидности, физического или психологического характера (поддельное нарушение)

Диагностические критерии:

A. периодическая или постоянная симуляция симптомов при отсутствии установленного соматического или психического расстройства заболевания или инвалидности
B. могут наблюдаться самоповреждение в виде порезов и царапин, которые наносятся для того, чтобы вызвать кровотечения, или инъекционное введение себе токсических веществ
C. имитация боли и заявления о кровотечениях могут быть столь постоянными и убедительными, что периодически выполняются обследования и операции в разных больницах и клиниках, несмотря на отрицательные результаты повторных обследований
D. мотивация такого рода поведения почти всегда носит неясный и предположительно внутренний характер, а состояние лучше всего интерпретируется как расстройство, связанное с принятием роли больного
E. отсутствие внешних мотиваций, таких как уклонение от преследования за правонарушение, приобретение запрещенных препаратов, уклонение от призыва на военную службу, а также получение льгот, предназначенных для больных людей

Включаются:

- *синдром завсегдатая больниц;*
- *синдром Мюнхаузена:*
- *кочующий больной.*

Исключаются:

- *синдром избитого ребенка БДУ (**T74.1**);*
- *искусственный дерматит (**Z98.1**);*

- *симуляция (имитация болезни) (**Z76.5**);*
- *Мюнхаузен по доверенности (грубое обращение с детьми) (**T74.8**)*


F68.8 Другие уточненные расстройства зрелой личности и по ведения у взрослых

Включаются:

- *расстройство характера БДУ;*
- *расстройство взаимоотношений БДУ.*

F69 Расстройство зрелой личности и поведения у взрослых, неуточненное

А. этот код должен использоваться только в крайнем случае, если можно предположить наличие расстройства зрелой личности или поведения у взрослых, но отсутствует информация, позволяющая отнести его к специфической категории


F70 – F79
Умственная отсталость…
F70
… легкой степени
F71
… умеренная
F72
… тяжелая
F73
… глубокая
F78
Другие формы …
F79
… неуточненная
F7x.0 …с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения …
F7x.1 …со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения …
F7x.8 …с другими нарушениями поведения …
F7x.9 …без указания на нарушения поведения
F7x.x1 …обусловленная предшествующей инфекцией или интоксикацией
F7x.x2 …обусловленная предшествующей травмой или физическим агентом
F7x.x3 …обусловленная фенилкетонурией
F7x.x4 …связанная с хромосомными нарушениями
F7x.x5 …обусловленная гипертиреозом
F7x.x6 …обусловленная гипотиреозом
F7x.x7 …связанная с недоношенностью
F7x.x8 …обусловленная другими уточненными причинами
F7x.x9 …обусловленная неуточненными причинами

F70 – 79 Умственная отсталость

Общие диагностические указания:

A. умственная отсталость – состояние задержанного или неполного развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллекта, т.е. когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей.

B. отсталость может развиваться с любым другим психическим ими соматическим расстройством или возникать без него

C. адаптивное поведение всегда нарушено, но в защищенных социальных условиях, где обеспечена поддержка, это нарушение у больных с легкой степенью умственной отсталости может совсем не иметь явного характера.

C. измерение коэффициентов умственного развития должно проводиться с учетом кросс-культуральных особенностей

D. четвертый знак используется для определения выраженности поведенческих нарушений, если они не обусловлены сопутствующим (психическим) расстройством:
/F7x.0/ ...с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения
/F7x.1/ ...со значительными нарушениями поведения, требующими ухода или лечения
/F7x.8/ ...с другими нарушениями поведения
/F7x.9/ ...без указания на нарушение поведения

E. пятым знаком обозначается причина (если она известна), приводящая к умственной отсталости:
F7x.x1 – ...обусловленная предшествующей инфекцией или интоксикацией
F7x.x2 – ...обусловленная предшествующей травмой или физическим агентом
F7x.x3 – ...обусловленная фенилкетонурией
F7x.x4 – ...связанная с хромосомными нарушениями
F7x.x5 – ...обусловленная гипертиреозом
F7x.x6 – ...обусловленная гипотиреозом
F7x.x7 – ...связанная с недоношенностью
F7x.x8 – ...обусловленная другими уточненными причинами
F7x.x9 – ...обусловленная неуточненными причинами

F70 Умственная отсталость легкой степени

Диагностические критерии:

A. проявляется затруднениями в сфере школьной успеваемости, чаще – в освоении навыков чтения и письма

B. в большинстве благоприятных случаев легкой умственной отсталости возможно трудоустройство в сфере практической деятельности, включая неквалифицированный и полуквалифицированный ручной труд

C. отмечается заметная эмоциональная и социальная незрелость, что проявятся в ограничения социальной роли (например, неспособность справляться с требованиями, связанными с брачной жизнью или воспитанием детей; затруднения в адаптации к культуральным традициям и нормам)

D. по стандартизованным тестам оценки умственного развития легкой умственной отсталости указывают показатели коэффициента в диапазоне 50-69

Включаются:
- *малоумие;*
- *легкая умственная субнормальность;*
- *легкая олигофрения;*
- *дебильность.*

F71 Умственная отсталость умеренная...

Диагностические критерии:

A. существенно отстают в период развития и ограничены в зрелом возрасте:
   1. понимания и использования речи, в том числе – письма и счета
   2. навыки самообслуживания и моторики (некоторые пациенты нуждаются в надзоре на протяжении всей жизни).

B. в зрелом возрасте – обычно имеются способности:

1. к простой практической работе при тщательном построении заданий и обеспечении квалифицированного надзора
2. к установлению контактов, общению с другими людьми и участию в элементарных социальных занятиях

C. по стандартизованным тестам оценки умственного развития легкой умственной отсталости указывают показатели коэффициента в диапазоне 35-49

Включаются:
- *имбецильность;*
- *умеренная умственная субнормальность;*
- *умеренная олигофрения.*

F72 Умственная отсталость тяжелая...

Диагностические критерии:

A. наблюдается выраженная степень моторного нарушения или другие сопутствующие дефекты, указывающие на наличие клинически значимого повреждения или аномального развития центральной нервной системы.

B. коэффициент умственного развития обычно находится в пределах от 20 до 34

Включаются:
- *тяжелая умственная субнормальность;*
- *тяжелая олигофрения.*

F73 Умственная отсталость глубокая

Диагностические критерии:

A. в большинстве случаев больные:
1. неподвижны или резко ограничены в подвижности
2. страдают недержанием мочи и кала
3. способны лишь на самые простые формы невербального общения
4. нуждаются в постоянной помощи и надзоре

B. у больных этой степени умственной отсталости коэффициент умственного развития ниже 20

Включаются:
- *идиотия;*
- *глубокая умственная субнормальность;*
- *глубокая олигофрения.*


F78 Другая умственная отсталость

A. категория используется только когда оценка степени интеллектуального снижения обычными процедурами затруднена или невозможна из-за сопутствующих органов восприятия (например, слепоты, глухонемоты), при тяжелых поведенческих расстройствах или соматической инвалидности

F79 Неуточненная умственная отсталость

A. категория используется при отсутствии достаточной информации по отнесению больного к одной из вышеназванных категорий

Включаются:
- *умственная дефицитарность БДУ:*
- *умственная субнормальность БДУ;*
- *олигофрения БДУ*


F80 – F89
Расстройства психологического (психического) развития
F80
Специфическое расстройство развития, речи и языка
F80.0 Специфические расстройства речевой артикуляции
F80.1 Расстройства экспрессивной речи…
F80.2 Расстройство рецептивной речи…
F80.3 Приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клефнера)
F80.8 Другие расстройства речи и языка …
F80.9 Расстройство развития речи и языка неуточненное
F80.31…психотический вариант течения
F80.32…непсихотический вариант течения
F80.39…неуточненная по типу течения
F80.81 Задержка речевого развития, обусловленная социальной депривацией
F80.82 Задержка речевого развития, сочетающаяся с задержкой интеллектуального развития и специфическими расстройствами учебных навыков
F80.88 Другие расстройства речи и языка
F81
Специфические расстройства развития учебных навыков
F81.0 Специфические расстройства чтения
F81.1 Специфическое расстройство спеллингования
F81.2 Специфическое расстройство арифметических навыков
F81.3 Смешанное расстройство учебных навыков
F81.8 Другие расстройства развития учебных навыков
F81.9 Неуточненные расстройства развития учебных навыков
F82
Специфическое расстройство развития двигательных функций
F83
Смешанные специфические расстройства развития
F84
Общие расстройства развития
F84.0 Детский аутизм
F84.1 Атипичный аутизм
F84.2 Синдром Ретта
F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста
F84.4 Гиперактивное расстройство сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями
F84.5 Синдром Аспергера
F84.8 Другие общие расстройства развития
F84.9 Неуточненное общее расстройство развития
F84.01…обусловленный органическим заболеванием головного мозга
F84.02…вследствие других причин
F84.11…с умственной отсталостью
F84.12…без умственной отсталости
F88
Другие расстройства психологического (психического) развития
F89
Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте неуточненные

F80 – F89 Нарушения психологического (психического) развития

Общие диагностические указания:
A. начало заболевания – обязательно в младенческий или детский возраст;
B. тесная связь повреждения или задержки в развитии функций с биологическим созреванием центральной нервной системы;
C. непрерывное течение без ремиссий или рецидивов;
D. чаще повреждаются речь, зрительно-пространственные навыки и/или координация движений;
E. постепенно исчезает по мере взросления (может наблюдаться легкая недостаточность в поврежденной сфере в течение всей жизни);
F. предшествующий период нормального развития отсутствует (за исключением некоторых расстройств, включенных в данную диагностическую группу);
G. чаще (в несколько раз) встречается у мальчиков;
H. как правило, имеются сведения о наследственной отягощенности подобными расстройствами;
I. средовые негативные воздействия, приводящие к расстройству, носят вторичный характер.

F80 Специфические расстройства развития речи

Общие диагностические указания:
A. соответствие общим диагностическим указаниям F80-F89
B. повреждена способность к речевому общению при сохранности у больного понимания окружающих и невербальному общению
C. расстройства невозможно объяснить неврологическими или средовыми повреждающими факторами, а также умственной отсталостью
D. может сопровождаться трудностями в освоении навыков счета и письма, эмоциональными и поведенческими расстройствами, как следствием нарушения речевой функции
E. отличие от средневозрастной нормы в развитии речи на два стандартных отклонения, по результатам обследования с помощью специальных тестов

F80.0 Специфическое расстройство артикуляции речи

Диагностические критерии:
A. соответствие общим диагностическим указаниям **F80-F89**
B. использование звуков речи не соответствует умственному развитию ребенка
C. расстройства невозможно объяснить неврологическими или средовыми повреждающими факторами, а также умственной отсталостью
D. сохранна способность к невербальному общению

Включаются:
- *расстройство развития артикуляции;*
- *функциональное расстройство артикуляции:*
- *лепетная речь;*
- *дислалия;*
- *расстройство фонологического развития*

Исключаются:
- *расстройство артикуляции вследствие: афазии БДУ (**R47.0**):*
- *апраксии (**R48.2**);*
- *нарушения артикуляции, сочетающегося с расстройством развития экспресивной и рецептивной речи (**F80.1**, **F80.2**);*
- *расщепления неба и других анатомических аномалий ротовых структур, участвующих в речевом функционировании (**Q35-Q38**);*
- *потери слуха (**H90-H91**);*
- *умственной отсталости (**F70-F79**).*

F80.1 Расстройство экспрессивной речи

Диагностические критерии:
A. соответствие общим диагностическим указаниям **F80-F89**
B. способность ребенка использовать выразительную разговорную речь (используется небольшой словарный запас, трудности в подборе слов, чрезмерно упрощенная структура предложений, неправильное использование некоторых частей речи и так далее) заметно ниже уровня, соответствующего его умственному возрасту при сохранности понимания речи и способности к невербальному общению

C. расстройства невозможно объяснить неврологическими или средовыми повреждающими факторами, а также умственной отсталостью

Включаются:
- *дисфазия или афазия, связанная с развитием, экспансивный тип.*

Исключаются:
- *дисфазия или афазия, связанная с развитием, эффективный тип (**F80.2**);*
- *общие расстройства развития (**F84.-**);*
- *приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клеффнера) (**F80.3**):*
- *элективный мутизм (**F94.0**);*
- *умственная отсталость (**F70-F79**);*
- *дисфазия и афазия БДУ (**R47.0**).*

F80.2 Расстройство рецептивной речи

Диагностические критерии:

A. соответствие общим диагностическим указаниям F80-F89
B. нарушена способность ребенка к пониманию речи при нормальном умственном развитии
C. в раннем возрасте проявляется:
   1. отсутствие реакции на знакомые названия
   2. неспособность идентифицировать знакомые предметы
   3. неспособность следовать простым инструкциям
D. в более позднем возрасте:
   1. неспособность к пониманию грамматических структур (отрицаний, вопросов, сравнений и т.д.)
   2. непонимание более тонких аспектов речи (тон голоса, жесты)
E. подражательная речь без понимания смысла сказанного
F. почти всегда сопровождается нарушением экспрессивной речи
G. в значительной степени выражены социальные, эмоциональные и поведенческие расстройства при сохранности социальных контактов в соответствии с возрастом

Включаются:
- *афазия или дисфазия развития, рецептивный тип;*
- *словесная глухота;*
- *врожденная слуховая невосприимчивость;*
- *афазия Вернике, связанная с развитием.*

Исключаются:
- *приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клеффнера) (**F80.3**);*
- *аутизм (**F84.0, F84.1**);*
- *элективный мутизм (**F94.0**);*
- *умственная отсталость (**F70 – F79**);*
- *задержка речи вследствие глухоты (**H90 – H91**);*
- *дисфазия и афазия БДУ (**R47.0**) или экспрессивного типа (**F80.1**).*

/F80.3/ Приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клеффнера)

Диагностические критерии:

A. утрата ребенком ранее имевшихся и нормально развивавшихся навыков рецептивной и экспрессивной речи
B. начало расстройства сопровождается пароксизмальной патологией на ЭЭГ (почти всегда в области височных долей, обычно билатерально, но часто с более широкими нарушениями) и в большинстве случаев эпилептическими припадками
C. наиболее типичный возраст начала – от трех до семи лет
D. значительная вариабельность в нарушении речи – от расстройств артикуляции до полной немоты
E. возможно полное выздоровление, но в двух третях случаев имеются остаточные речевые нарушения разной степени выраженности
F. обязательно указываются варианты течения:
   F80.31 – …психотический
   F80.32 – …непсихотический
   F80.39 – …неуточненный по типу течения

Исключаются:
- *приобретенная афазия вследствие мозговой травмы, опухоли или другого известного болезненного процесса;*
- *другое дезинтегративное расстройство детского возраста (**F84.3**);*
- *аутизм (**F84.0, F84.1**).*

/F80.8/ Другие расстройства развития речи

A. варианты течения:
F80.81 – Задержка речевого развития, обусловленная социальной депривацией
F80.82 – Задержка речевого развития, сочетающаяся с задержкой интеллектуального развития и специфическими расстройствами учебных навыков
F80.88 – Другие расстройства развития речи и языка
Включены:
– *лепетная речь.*

F80.9 Расстройства развития речи и языка, неуточненные

Категория используется исключительно для неуточненных расстройств, при которых есть значительное нарушение в развитии речи, которое нельзя объяснить умственной отсталостью или неврологическими, сенсорными или физическими аномалиями, непосредственно воздействовавшими на речь.
Включены:
– *расстройство речи БДУ.*

F81 Специфические расстройства развития школьных навыков

Общие диагностические указания:
A. соответствие общим диагностическим указаниям **F80-F89**
B. повреждена способность к нормальному приобретению школьных навыков
C. расстройства невозможно объяснить неврологическими или средовыми повреждающими факторами, а также умственной отсталостью
D. может сопровождаться трудностями в развитии речи, дефицитом внимания, эмоциональными и поведенческими расстройствами
E. отличие от средневозрастной нормы в уровнях освоения школьных навыков оцениваются по результатам обследования с помощью специальных тестов

Включены:
– *специфическое нарушение навыков чтения, «дислексия»;*
– *специфическое нарушение навыков письма;*
– *специфическое нарушение арифметических навыков, «дискалькулия»;*
– *смешанное расстройство школьных навыков, «трудности обучения».*

F81.0 Специфическое расстройство чтения

Диагностические критерии:
A. соответствие общим диагностическим указаниям **F80-F89**
B. расстройство определяется специфическим и значительным нарушением в развитии навыков чтения, понимании прочитанного и связанных с этим заданий; снижена ожидаемая продуктивность чтения в соответствии с интеллектуальным развитием ребенка и его школьной успеваемостью
C. на ранних стадиях обучения – трудности заучивания и воспроизведение алфавита
D. на более поздних – значительные трудности устного чтения:
1. пропуски, замены, искажения или дополнения слов или частей слов
2. медленный темп чтения
3. попытки начать чтение заново, длительные запинки или «потеря места» в тексте и неточности в выражениях
4. перестановка слов в предложении или букв в словах
5. неспособность вспомнить факты из прочитанного
6. неспособность сделать заключение или выводы из сущности прочитанного
7. для ответов на вопросы о прочитанной истории используются скорее общие знания, чем информация из конкретного рассказа

A. часто могут наблюдаться нарушения поведения в виде прогулов занятий в школе

Включаются:
– *специфическая задержка в чтении;*
– *чтение в обратном порядке;*
– *дислексия, связанная с развитием;*
– *нарушения спеллингования в сочетании с расстройством чтения.*

Исключаются:
– *приобретенная алексия или дислексия (**R48.0**);*
– *приобретенные трудности в чтении, вторичные к эмоциональным расстройствам (**F93.-**);*
– *нарушения спеллингования, не сочетающиеся с трудностями чтения (**F81.1**)*

F81.1 Специфическое расстройство првописания (спеллингования)

Диагностические критерии:

A. соответствие общим диагностическим указаниям **F80-F89**
B. расстройство определяется значительным нарушением навыков правописания в сравнении с интеллектуальным развитием ребенка и его школьной успеваемостью, навыками чтения
C. отличие от средневозрастной нормы в уровнях освоения правописания оцениваются по результатам обследования с помощью специальных тестов

Включается:

- *специфическая задержка спеллингования.*

Исключаются:

- *трудности спеллингования, сочетающиеся с нарушением чтения (**F81.0**);*
- *трудности спеллингования, определяемые в основном неадекватным обучением (**Z55.8**);*
- *приобретенное расстройство спеллингования (**R48.8**)*

F81.2 Специфическое расстройство счета

Диагностические критерии:

A. соответствие общим диагностическим указаниям **F80-F89**
B. расстройство определяется значительным нарушением навыков счета в сравнении с интеллектуальным развитием ребенка и его школьной успеваемостью, навыками чтения
C. отличие от средневозрастной нормы в уровнях освоения навыков счета оцениваются по результатам обследования с помощью специальных тестов

Включаются:

- *специфическое расстройство счета, связанное с развитием;*
- *синдром развития Гёрсмана;*
- *акалькулия развития.*

Исключаются:

- *арифметические трудности, сочетающиеся с нарушениями чтения или спеллингования (**F81.1**):*
- *арифметические трудности, обусловленные неадекватным обучением (**Z55.8**);*
- *приобретенное расстройство счета (акалькулия) (**R48.8**).*

F81.3 Смешанное расстройство учебных навыков

Диагностические критерии:

A. остаточная категория, которая определяется признаками всех расстройств, помещенных в группу **F81**
B. расстройства невозможно объяснить неврологическими или средовыми повреждающими факторами, а также умственной отсталостью

Исключены:

- *специфическое расстройство чтения (**F81.0**);*
- *специфическое расстройство спеллингования (**F81.1**);*
- *специфическое расстройство навыков счета (**F81.2**).*

F81.8 Другие расстройства развития учебных навыков

F81.9 Расстройство развития учебных навыков, неуточненное

Этой категории необходимо насколько возможно избегать и использовать только для неуточненных нарушений, при которых обнаруживается значительная неспособность к обучению, что не может быть объяснено непосредственно умственной отсталостью, проблемами остроты зрения или неадекватного обучения.

Включаются:

- *неспособность к приобретению знаний БДУ;*
- *неспособность обучения БДУ;*
- *расстройство обучения БДУ*

F82 Специфическое расстройство развития двигательных функций

Общие диагностические указания:

A. соответствие общим диагностическим указаниям **F80-F89**
B. основным признаком расстройства является серьезное нарушение в развитии двигательной координации, которое нельзя объяснить общей интеллектуальной отсталостью или каким-либо специфическим врожденным или приобретенным неврологическим расстройством
C. двигательная координация при выполнении как тонких, так и грубых тестов двигательной координации в значительной мере отклонена от средневозрастных нормативов

D. типично сочетание моторной дисфункции с некоторым нарушением продуктивности в выполнении зрительно-пространственных тестовых заданий
E. трудности координации не должны быть обусловлены неврологическим расстройством или дефектами зрения

Включаются:
- *синдром детской неуклюжести;*
- *диспраксия развития.*

Исключаются:
- *аномалии походки и подвижности (**R26.-**);*
- *отсутствие координации, вторичное по отношению к умственной отсталости (**F70-F79**) или к диагностируемому неврологическому расстройству (**G00-G99**).*

F83 Смешанные специфические расстройства развития

Диагностические критерии:
A. остаточная категория (сходная с **F81.3**), которая определяется признаками всех расстройств, помещенных в группы **F80-F82**
B. сопровождается не сильно выраженными общими нарушениями когнитивных функций
C. расстройства невозможно объяснить неврологическими или средовыми повреждающими факторами, а также умственной отсталостью

F84 Общие расстройства развития

Общие диагностические указания:
A. расстройства, характеризующиеся расстройствами социальной адаптации и общения в сочетании стереотипными интересами и действиями
B. расстройства развития возникают в младенческом возрасте, реже – в первые пять лет жизни
C. часто сочетаются с расстройством, проявляющимся нарушениями в когнитивной сфере, независимо от наличия или отсутствия умственной отсталости
D. в некоторых случаях расстройства сочетаются и предположительно обусловлены некоторыми патологическими состояниями, среди которых наиболее часты:
   1. детские спазмы
   2. врожденная краснуха
   3. туберозный склероз
   4. церебральный липидоз
   5. фрагильность Х-хромосомы
E. расстройство должно диагностироваться на основании поведенческих признаков, независимо от наличия или отсутствия патологических; любое из этих сопутствующих состояний должно кодироваться отдельно
F. при наличии умственной отсталости, степень ее выраженности кодируется отдельно (**F70-F79**) поскольку она не является обязательным признаком общих расстройств развития

/F84.0/ Детский аутизм

Диагностические критерии:
A. расстройство, при котором всегда отмечаются качественные нарушения социального взаимодействия, выступающие в форме неадекватной оценки социо-эмоциональных сигналов, что проявляется:
   1. отсутствие социо-эмоциональной взаимности (особенно характерно)
   2. отсутствие реакций на эмоции других людей и/или отсутствие модуляции поведения в соответствии с социальной ситуацией
   3. отсутствие социального использования имеющихся речевых навыков, недостаточной гибкости речевого выражения и относительного отсутствия творчества и фантазии в мышлении
   4. нарушенного использования тональностей и выразительности голоса для модуляции общения; такого же отсутствия сопровождающей жестикуляции
   5. нарушений в ролевых и социально-имитационных играх
B. характеризуется также ограниченными, повторяющимися и стереотипными поведением, интересами и активностью, что проявляется:
   1. тенденцией устанавливать жесткий, раз и навсегда заведенный порядок во многих аспектах повседневной жизни
   2. на особом порядке выполнения ритуалов нефункционального характера
   3. моторными стереотипиями

4. проявление особого интереса к нефункциональным элементам предметов (таким как запах или осязательные качества поверхности)

C. аномалии развития должны отмечаться первые 3 года жизни, но сам синдром может диагностироваться во всех возрастных группах
D. отсутствие предшествующего, несомненно, нормального развития
E. часто наблюдаются неспецифические для аутизма расстройства, такие как страхи (фобии), нарушения сна и приема пищи, вспышки гнева и агрессивность, самоповреждения
F. дефицит спонтанности, инициативности и творчества как при выполнении заданий и инструкций, так и в организации досуга
G. характерные для аутизма специфические проявления дефекта меняются по мере роста ребенка, но на протяжении зрелого возраста этот дефект сохраняется, проявляясь во многом схожими расстройствами
H. у мальчиков расстройство развивается в 3-4 раза чаще, чем у девочек
I. четвертый знак указывает на причину расстройства:
F84.01 – …обусловленный органическим заболеванием головного мозга
F84.02 – …вследствие других причин

Включаются:
- *аутистическое расстройство;*
- *инфантильный аутизм;*
- *инфантильный психоз;*
- *синдром Каннера.*

Исключается:
- *аутистическая психопатия (**F84.5**).*

/F84.1/ Атипичный аутизм

Диагностические критерии:
A. расстройство сходное с категорией **F84.0**, однако отсутствует хотя бы один из обязательных диагностических критериев A – C, а именно:
1. достаточно отчетливые нарушения социального взаимодействия и общения
2. ограниченное, стереотипное, повторяющееся поведение
3. тот или иной признак аномального и/или нарушенного развития впервые проявляется в возрасте после 3-х лет;

B. чаще возникает у детей с тяжелым специфическим расстройством развития рецептивной речи или с умственной отсталостью, наличие или отсутствие которой обозначается четвертым знаком (при этом вторым кодом указывается соответствующий диагноз F70.xx – F79.xx) :
F84.11 – …с умственной отсталостью
F84.12 – …без умственной отсталости

Включаются:
- *умеренная умственная отсталость с аутистическими чертами;*
- *атипичный детский психоз.*

F84.2 Синдром Ретта

Диагностические критерии:
A. расстройство, к настоящему времени описано только у девочек
B. раннее развитие внешне нормально или почти нормально
C. начало расстройства в возрасте между 7 и 24 месяцами
D. парциальная или полная потеря мануальных навыков и речи
E. замедление роста головы
F. наиболее характерно:
1. потеря спонтанных движений рук
2. стереотипное «заламывание», «мытье» рук, смачивание их слюной
3. неполное пережевывание пищи
4. одышка

G. в среднем возрасте развитие атаксии, апраксии, сколиоза и кифосколиоза, хореоатетозных расстройств, нередко – эпилептических припадков
H. исход заболевания – тяжелая психическая инвалидность

F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста

Диагностические критерии:
A. явно нормальное развитие до возраста, по крайней мере, 2-х лет
B. вслед за неспецифическим продромальным периодом – отчетливая потеря ранее приобретенных навыков и качественно нарушенным социальным функционированием:

1. глубокая регрессия или потеря речи
2. регрессия игрового и адаптивного поведения
3. потеря контроля функции кишечника или мочевого пузыря
4. иногда ухудшается контроль двигательных функций
5. вычурные движения и жесты
6. сопровождается общей потерей интереса к окружающему и социальным контактам

C. от органической деменции расстройство отличается следующими координальными признаками:
1. отсутствие какого-либо распознанного органического заболевания или повреждения нервной системы
2. временами возможно восстановление нарушенных или утраченных навыков
3. нарушение поведения носит скорее характер девиации (как при аутизме), нежели снижения интеллекта

Включаются:
- *дезинтегративный психоз;*
- *синдром Геллера;*
- *детская деменция (dementia infantilis):*
- *симбиотический психоз.*

Исключаются:
- *приобретенная афазия с эпилепсией (**F80.3**);*
- *элективный мутизм (**F94.0**);*
- *синдром Ретта (**F84.2**);*
- *шизофрения (**F20.-**).*

F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями

Диагностические критерии:

A. обязательное сочетание признаков:
1. выраженная, чрезмерная гиперактивность
2. двигательные стереотипии
3. выраженная умственная отсталость

B. при выявлении диагностических критериев F84.0, F84.1 или F84.2 расстройство регистрируется в соответствующих рубриках

C. вторым кодом указывается соответствующий диагноз F70.xx – F79.xx

F84.5 Синдром Аспергера

Диагностические критерии:

A. сочетание признаков:
1. расстройства, сходные с аутизмом («мягкий» вариант аутизма)
2. двигательные дисфункции (как в **F82.-**)
3. сохранный интеллект и речь

B. встречаются чаще у мальчиков (в соотношении 8:1)

Включаются:
- *аутистическая психопатия;*
- *шизоидное расстройство детского возраста*

Исключаются:
- *шизотипическое расстройство (**F21**);*
- *простая шизофрения (**F20.6**);*
- *нарушение привязанности детского возраста (**F94.1, F94.2**);*
- *ананкастичное личностное расстройство (**F60.5**);*
- *обсессивно-компульсивное расстройство (**F42.-**).*

F84.8 Другие общие расстройства развития

F84.9 Общее расстройство развития, неуточненное

Это остаточная диагностическая категория, которая должна использоваться для расстройств, подходящих к общим диагностическим указаниям расстройств развития, но при которых отсутствует адекватная информация или имеются противоречивые данные, означающие, что не могут быть удовлетворены критерии для шифрования каких либо других рубрик **F84.**

F88 Другие расстройства психологического (психического) развития

Включается:
- *агнозия развития.*

F89 Неуточненное расстройство психологического развития

Включается:
- *расстройство развития БДУ.*

F90 – F99 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

- **F90** Гиперкинетические расстройства
  - **F90.0** Нарушение активности и внимания
  - **F90.1** Гиперкинетическое расстройство поведения
  - **F90.8** Другое гиперкинетические расстройство
  - **F90.9** Гиперкинетическое расстройство неуточненное
- **F91** Расстройства поведения
  - **F91.0** … ограничивающееся рамками семьи
  - **F91.1** … несоциализированное
  - **F91.2** … социализированное
  - **F91.3** Вызывающее, оппозиционное …
  - **F91.8** Другие …
  - **F91.9** Неуточненные …
- **F92** Смешанные расстройства поведения и эмоций
  - **F92.0** Депрессивное расстройство поведения
  - **F92.8** Другое смешанное расстройство поведения и эмоций
  - **F92.9** Смешанное расстройство поведения и эмоций неуточненное
- **F93** Эмоциональные расстройства, начало которых специфично для детского возраста
  - **F93.0** Тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой
  - **F93.1** Фобическое тревожное расстройство в детском возрасте
  - **F93.2** Социальное тревожное расстройство в детском возрасте
  - **F93.3** Расстройство вследствие сиблингового соперничества
  - **F93.8** Другие эмоциональное расстройства в детском возрасте
  - **F93.9** Эмоциональное расстройство в детском возрасте неуточненное
- **F94** Расстройства социального функционирования, начало которых характерно для детского и подросткового возраста
  - **F94.0** Элективный мутизм
  - **F94.1** Реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте
  - **F94.2** Расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу
  - **F94.8** Другое расстройство социального функционирования в детском возрасте
  - **F94.9** Расстройство социального функционирования в детском возрасте неуточненное
- **F95** Тики
  - **F95.0** Транзиторные тики
  - **F95.1** Хронические моторные тики или вокализмы
  - **F95.2** Синдром Жиль де ла Туретта
  - **F95.8** Другие тики
  - **F95.9** Тики неуточненные
- **F98** Другие поведенческие и эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте
  - **F98.0** Энурез неорганической природы
  - **F98.1** Энкопрез неорганической природы
  - **F98.2** Расстройство приема пищи в детском и подростковом возрасте
  - **F98.3** Поедание несъедобного (пика) в младенчестве и детстве
  - **F98.4** Стереотипные двигательные расстройства
  - **F98.5** Заикание (запинание)
  - **F98.6** Речь взахлеб
  - **F98.8** Другие уточненные эмоциональные расстройства и расстройства поведения с началом, обычно приходящимся на детский или подростковый возраст
  - **F98.9** Эмоциональное расстройство и расстройство поведения с началом, обычно приходящимся на детский или подростковый возраст неуточненное
- **F99** Неуточненное психическое расстройство
  - **F99.1** Психотическое расстройство без дополнительных уточнений
  - **F99.2** Непсихотическое расстройство без дополнительных уточнений
  - **F99.9** Психическое расстройство без дополнительных уточнений

F90 – F99 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

F90 Гиперкинетические расстройства

Общие диагностические указания:

A. начало расстройств в процессе развития (обычно в первые 5 лет жизни)

B. кардинальными признаками, необходимыми для диагноза, являются:
   1. нарушенное внимание и гиперактивность, выявляющиеся более, чем в одной ситуации (например, дома, в классе, в больнице), особенно в ситуациях, требующих относительного спокойствия
   2. частая смена одного вида деятельности на другой
   3. дефекты настойчивости и внимания следует диагностировать, только если они чрезмерны для возраста ребенка и коэффициента его умственного развития

C. сопутствующие клинические характеристики не достаточны и даже не необходимы для диагноза, но подтверждают его:
   1. расторможенность в социальных взаимоотношениях;
   2. безрассудство в ситуациях, представляющих некоторую опасность;
   3. импульсивное нарушение социальных правил

D. симптомы расстройства поведения не являются критерием исключения или включения для основного диагноза

E. во взрослой жизни диагноз гиперкинетическаго расстройства все еще может быть сделан на основании ведущих диагностических критериев, но с учетом возрастных нормативов

F. в том случае, если гиперкинезия существовала с детского возраста, но в последующем сменилась другими состояниями, такими, как диссоциальное личностное расстройство или злоупотребление токсическими веществами, кодируется текущее состояние, а не прошлое.

G. в случае сочетания гиперактивности с нарушениями обучения и двигательной расстройства кодируются отдельно (под рубриками **F80-F89**) и не должны являться частью настоящего диагноза гиперкинетического расстройства

Исключаются:
- *общие расстройства развития (**F84.-**);*
- *тревожные расстройства (**F41.-** или **F93.0**);*
- *аффективные расстройства (**F30-F39**);*
- *шизофрения (**F20.-**).*

F90.0 Нарушение активности и внимания

Диагностические критерии

A. **F90.0** следует использовать тогда, когда имеются общие критерии гиперкинетического расстройства (**F90.-**), но нет критериев **F91** (расстройство поведения)

Включаются:
- *расстройство или синдром дефицита внимания с гиперактивностью;*
- *гиперактивное расстройство дефицита внимания.*

Исключаются:
- *гиперкинетическое расстройство, сочетающееся с расстройством поведения.*

F90.1 Гиперкинетическое расстройство поведения

Диагностические критерии

F90.1 следует использовать тогда, когда сочетаются общие критерии гиперкинетического расстройства (**F90.-**) с критериями **F91.-** (расстройство поведения)

F90.8 Другие гиперкинетические расстройства

P90.9 Гиперкинетическое расстройство, неуточненное

Эта остаточная категория не рекомендуется и ею следует пользоваться только тогда, когда нельзя дифференцировать между **F90.0** и **F90.1**, но выявляются общие критерии для **F90.-**.

Включаются:
- *гиперкинетическая реакция или синдром детского или подросткового возраста БДУ.*

F91 Расстройства поведения

Общие диагностические указания:

A. расстройства, характеризующиеся стойким диссоциальным, агрессивным поведением, проявляющимся в:
   1. чрезмерную драчливость или хулиганство
   2. жестокость к другим людям или животным
   3. умышленные и значительные повреждения собственности
   4. поджоги
   5. воровство, лживость
   6. прогулы в школе и уходы из дома
   7. необычно частые и тяжелые вспышки гнева
   8. вызывающее провокационное поведение
   9. откровенное постоянное непослушание
B. любая из перечисленных категорий нарушенного поведения при ее выраженности является достаточной для постановки диагноза, но изолированные диссоциальные акты не являются основой для диагноза
C. расстройства, как правило, сочетается с неблагоприятным социальным окружением
D. расстройства данной диагностической группы не диагносцируются в том случае, если расстройства поведения продолжаются менее шести месяцев
E. диссоциальное поведение не является признаком какого-либо другого психического расстройства

F91.0 Расстройство поведения, ограничивающееся рамками семьи

Диагностические критерии:

A. расстройство соответствует всем общим диагностическим указаниям **F91**
B. ненормальное поведение целиком или почти целиком, ограничивается домом и/или взаимоотношениями с самыми близкими родственниками или домочадцами.
C. может сопровождаться поведением, сфокусированным на определенных членах семьи, носящим намеренный характер разрушения
D. выраженных расстройств поведения за пределами семейной обстановки и социальные взаимоотношения ребенка вне семьи – в пределах нормы.

F91.1 Несоциализированное расстройство поведения

Диагностические критерии:

A. расстройство соответствует всем общим диагностическим указаниям **F91**
B. сочетание со значительным общим нарушением взаимоотношений ребенка с другими детьми, о чем свидетельствуют:
   1. главным образом изоляция от них и/или их отверженные ими или непопулярность у других детей
   2. отсутствие близких друзей или постоянных эмпатических, взаимных связей с другими детьми в той же самой возрастной группе
   3. чаще хорошие взаимоотношения со взрослыми
C. часто, но не всегда, отмечаются сопутствующие эмоциональные расстройства (если их степень достаточна для удовлетворения критериев смешанного расстройства, то оно и должно кодироваться **F92.-**)
D. характерно (но не обязательно), что ребенок с этой категорией расстройств одинок
E. обычно расстройство проявляется в различных ситуациях, но может быть более очевидным в школе: совместимой с диагнозом является ситуационная специфичность к иному, чем дом, местоположению

Включаются:

- *несоциализированное агрессивное поведение;*
- *нарушение поведения;*
- *уединенный агрессивный тип*

F91.2 Социализированное расстройство поведения

Диагностические критерии:

A. расстройство соответствует всем общим диагностическим указаниям **F91**
B. ключевым дифференциальным признаком является наличие адекватных, длительных взаимоотношений со сверстниками приблизительно того же возраста
C. часто, но не всегда, группа сверстников состоит из подростков, вовлеченных в делинквентную или диссоциальную активность (в которой социально неприемлемое поведение ребенка может одобряться группой сверстников и регулироваться субкультурой, к которой он принадлежит)
D. имеется тенденция к плохим взаимоотношениям с теми взрослыми, которые относятся к представителям властей, но с некоторыми взрослыми могут быть хорошие взаимосвязи
E. эмоциональные расстройства обычно минимальные
F. нарушения поведения могут включать или не включать семейную сферу, но если они ограничены до-

мом, то это исключает диагноз

G. чаще расстройство наиболее заметно за пределами семьи и специфичность проявления расстройства в обстановке школы (или в других несемейных условиях) совместима с диагнозом.

Включаются:

- *расстройство поведения, групповой тип;*
- *групповая делинквентность;*
- *правонарушения в условиях членства в банде;*
- *воровство в компании с другими:*
- *прогулы школы.*

Исключается:

- *активность в банде без манифестного психического расстройства (**Z03.2**).*

F91.3 Вызывающее оппозиционное расстройство

Диагностические критерии:

A. расстройство соответствует всем общим диагностическим указаниям **F91**

B. этот тип расстройств поведения характерен для детей младше 9 -10 лет

C. главным признаком расстройства является постоянно негативистическое, враждебное, вызывающее, провокационное и брутальное поведение, находящееся за пределами нормального уровня поведения для ребенка того же возраста, в тех же социо-культуральных условиях и не включающее в себя более серьезные правонарушений, которые отмечены при агрессивном и диссоциальном поведении в подрубриках **F91.0** – **F91.2**

Исключается:

- *расстройство поведения, включая явно или диссоциальное, или агрессивное поведение (F91-F91.2)*

F91.8 Другие расстройства поведения

F91.9 Расстройство поведения, неуточненное

Это не рекомендуемая остаточная категория только для расстройств, которые удовлетворяют общим критериям **F91**, но которые не выделены как подтип, или не набирают критерии для какого-либо определенного подтипа.

Включаются:

- *нарушения поведения в детстве БДУ;*
- *поведенческое расстройство детского возраста БДУ.*

F92 Смешанные расстройства поведения и эмоций

Общие диагностические указания:

A. расстройств характеризующиеся стойким диссоциальным, агрессивным поведением в сочетании с заметными симптомами депрессии, тревоги или другими эмоциональными нарушениями

B. тяжесть состояния должна быть достаточной для того, чтобы одновременно выполнялись критерии как расстройств поведения детского возраста (**F91.-**), так и эмоциональных расстройств детского возраста (**F93.-**) или характерных для зрелого возраста невротических расстройств (**F40-F49**) или расстройств настроения (**F30-F39**)

F92.0 Депрессивное расстройство поведения

Диагностические критерии:

A. расстройство соответствует всем общим диагностическим указаниям **F91.-** в сочетании с постоянной выраженной депрессией (**F30-F39**), проявляющейся такими симптомами, как чрезмерное страдание, потеря интересов и удовольствия в обычной активности, самообвинение и безнадежность

A. могут сопровождаться нарушения сна или аппетита

Включены:

- *расстройство поведения (**F91.-**), сочетающееся с депрессивным расстройством (**F30-F39**).*

F92.8 Другие смешанные расстройства поведения и эмоций

Диагностические критерии:

A. расстройство соответствует всем общим диагностическим указаниям **F91.-** в сочетании с постоянными выраженными эмоциональными симптомами, такими как тревога, боязливость, навязчивости или компульсии деперсонализация или дереализация, фобии или ипохондрия

Включается:

- *расстройство поведения (**F91.-**), сочетающееся с эмоциональным расстройством (**F93.-**) или невротическим расстройством (**F40-F48**)*

F92.9 Смешанное расстройство поведения и эмоций, неуточненное

F93 Эмоциональные расстройства, специфические для детского возраста

Общие диагностические указания:

A. эмоциональные расстройства детского и подросткового возраста, отличающиеся от таковых у взрослых:
   1. полная редукция невротической симптоматики в зрелом возрасте у большинства больных
   2. большая часть расстройств представляют собой преувеличение нормальных тенденций в процессе развития, нежели качественно феномены
   3. предполагается, что вовлеченные психические механизмы не являются теми же самыми, что и при неврозах у взрослых
   4. эмоциональные расстройства детского возраста менее ясно дифференцируются на предположительно специфические состояния, такие как фобические расстройства или навязчивые расстройства

F93.0 Тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой

Диагностические критерии:

A. расстройство диагностируется тогда, когда страх разлуки с близкими составляет основное в тревоге и когда такая тревога впервые возникает в ранние годы жизни
B. тревога у ребенка может принимать форму:
   1. нереалистичного, поглощающего беспокойства о возможном вреде, которому могут подвергнуться лица, к которым испытывается привязанность, или страха, что родители оставят его и не вернутся
   2. нереалистичного, поглощающего беспокойства, что какой-либо неблагоприятный случай разлучит ребенка с лицом, к которому испытывается большая привязанность, например, ребенок потеряется, будет похищен или будет убит;
   3. упорного нежелания или отказа идти в школу из страха расставания (а не по другим причинам, например, что в школе что-то случится);
   4. упорного нежелания или отказа идти спать без того, чтобы быть рядом с лицом, к которому испытывается большая привязанность;
   5. упорного, неадекватного страха одиночества или страха оставаться в течение дня дома без лица, к которому испытывается большая привязанность;
   6. повторяющихся ночных кошмаров о разлуке;
   7. рецидивирующего появления физических симптомов (таких как тошнота, боль в животе, головная боль, рвота и пр.) при разлуке с лицом, к которому испытывается привязанность, например, когда надо идти в школу;
   8. чрезмерного повторяющегося дистресса (проявляющегося тревогой, плачем, раздражением, страданием, апатией или социальной аутизацией) при предчувствии, во время или сразу вслед за разлукой с лицом, к которому испытывается большая привязанность

Исключаются:

- *аффективные расстройства (**F30-F39**);*
- *невротические расстройства (**F40-F48**);*
- *фобическое тревожное расстройство детского возраста (**F93.1**);*
- *социальное тревожное расстройство детского возраста (**F93.2**).*

F93.1 Фобическое тревожное расстройство в детском возрасте

Диагностические критерии:

A. категория должна быть использована только для страхов, специфических по отношению к определенным фазам развития, когда они удовлетворяют дополнительным критериям, которые применимы ко всем расстройствам в рубрике (**F93**), а именно:
   1. начало в соответствующий развитию возрастной период;
   2. степень тревоги клинически патологическая;
   3. тревога не является частью более генерализованного расстройства.

F93.2 Социальное тревожное расстройство в детском возрасте

Диагностические критерии:

A. категория должна использоваться только для тех расстройств, которые возникают в возрасте до 5 лет, являются необычными по выраженности, сопровождаются проблемами социального функционирования и не составляют части более генерализованного расстройства

Включается:

- *уклоняющееся расстройство детского или подросткового возраста*

F93.3 Расстройство вследствие сиблингового соперничества

Диагностические критерии:

A. Нарушение характеризуется сочетанием:
   1. очевидность существования соперничества сибсов и/или ревности;
   2. начало в течение месяцев, следующих за рождением младшего (обычно следующего по счету) сибса;
   3. эмоциональные нарушения, аномальные по степени и/или стойкости и сочетающиеся с психосоциальными проблемами.
B. в тяжелых случаях это может сопровождаться открытой жестокостью или физической травмой сибса, злобностью к нему, принижением сибса
C. эмоциональные расстройства могут принимать различные формы, часто включая некоторую регрессию с потерей ранее приобретенных навыков (таких как контроль над функцией кишечника и мочевого пузыря) и тенденцией к младенческому поведению.
D. обычно возрастает конфронтационное или оппозиционное поведение с родителями, вспышки гнева и дисфории, проявляемые в форме тревоги, несчастья или социальной отгороженности
E. может нарушаться сон, и часто возрастает давление на родителей для достижения их внимания, особенно в ночное время.

Включается:
- *ревность сибсов.*

Исключается:
- *соперничество с ровесниками (несиблинговое) (**F93.8**).*

F93.6 Другие эмоциональные расстройства в детском возрасте

Включаются:
- *расстройство идентификации;*
- *гипертревожное расстройство;*
- *соперничество с ровесниками (несиблинговое).*

Исключаются:
- *расстройство половой идентификации детского возраста (**F64.2**).*

F93.9 Эмоциональное расстройство в детском возрасте, неуточненное

Включается:
- *эмоциональное расстройство детского возраста БДУ.*

F94 Расстройства социального функционирования с началом специфическим для детского и подросткового возраста

Общие диагностические указания:

A. группа расстройств, для которых общими являются нарушения в социальном функционировании, начинающиеся в период развития, но в отличие от обоих расстройств развития, не характеризующиеся, по-видимому, конституциональной социальной неспособностью или дефицитом, распространяющимся на все сферы функционирования
B. серьезные искажения нормальных средовых условий или лишение благоприятных средовых факторов часто сочетаются и во многих случаях, как полагается, играют решающую роль в этиологии.

F94.0 Элективный мутизм

Диагностические критерии:

A. расстройство характеризуется выраженной, эмоционально обусловленной избирательностью в разговоре, так что ребенок обнаруживает свою речь достаточной в некоторых ситуациях, но оказывается не в состоянии говорить в других определенных ситуациях
B. наиболее часто расстройство впервые проявляется в раннем детстве
C. характерно сочетание расстройства с выраженными личностными особенностями, включая социальную тревожность, отгороженность, чувствительность или сопротивление
D. диагноз предполагает:
   1. нормальный или почти нормальный уровень понимания речи
   2. достаточный уровень в речевом выражении, что является достаточным для социального общения
E. должны быть доказуемые сведения, что ребенок может говорить нормально или почти нормально в некоторых ситуациях.
F. существенное меньшинство детей с элективным мутизмом имеют предысторию или какой-либо задержки речи, или проблем артикуляции
G. требуется, чтобы неспособность говорить являлась постоянной во времени и чтобы ситуации, в которых речь есть или ее нет, были постоянны и предсказуемы

H. в большинстве случаев имеются и другие социо-эмоциональные нарушения, но они не входят в число необходимых для диагноза признаков.

Включается:
- *избирательный мутизм.*

Исключаются:
- *общие расстройства развития (**F84. -**);*
- *шизофрения (**F20.-**);*
- *специфические расстройства развития речи (**F80.-**);*
- *транзиторный мутизм как часть тревожного расстройства в связи с разлукой у детей младшего возраста (**F93.0**)*

F94.1 Реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте

Диагностические критерии:

A. расстройство, встречающееся у младенцев и маленьких детей (до 5 лет), характеризуется стойкими нарушениями социальных взаимосвязей ребенка, которое сочетается с эмоциональными расстройствами и является реакцией на изменения в средовых условиях

B. характерными являются:
1. боязливость и повышенная настороженность, которые не исчезают при утешении
2. плохое социальное взаимодействие со сверстниками
3. агрессия к себе и другим
4. обычным является чувство страдания
5. в некоторых случаях встречается отсутствие роста

C. синдром, возможно, возникает как прямой результат серьезного проявления родительского пренебрежения, жестокого обращения или серьезных ошибок в воспитании нарушений и явно не подходит к критериям других диагностических категорий

Исключаются:
- *сексуальные оскорбления или физически жестокое обращение с детьми, имеющие результатом психосоциальные проблемы (**Z61.4-Z61.6**);*
- *синдромы дурного обращения, приводящие к физическим проблемам*
- *нормальные вариации в проявлениях избирательной привязанности;*
- *расторможенное расстройство привязанности детского возраста (**F94.2**);*
- *синдром Аспергера (**F84.5**).*

F94.2 Расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу

Диагностические критерии:

A. диагноз расстройства основывается на данных о том, что ребенок проявляет необычную степень диффузности в привязанностях в первые 5 лет жизни

B. это сочетается с общим прилипчивым поведением в младенчестве и/или неразборчиво дружеским, претендующим на внимание поведением в раннем и среднем детстве

C. обычно отмечаются трудности в формировании доверительных тесных взаимосвязей со сверстниками

D. в большинстве случаев в анамнезе имеются отчетливые указания на то, что в первые годы жизни были смены воспитателей или многочисленные смены семьи (как при неоднократном помещении в приемные семьи).

Включаются:
- *бесприв язчивая психопатия;*
- *институционный (учрежденческий) синдром.*

Исключаются:
- *гиперкенетнческое расстройство или расстройство дефицита внимания (**F90.-**);*
- *реактивное расстройство привязанности детского возраста (**F94.1**);*
- *синдром Аспергера (**F84.5**);*
- *госпитализм у детей (**F43.2**).*

F94.6 Другие расстройства социального функционирования в детском возрасте

Включаются:
- *расстройства социального функционирования с аутизацией и застенчивостью. обусловленные недостаточностью социальной компетентности.*

F94.9 Расстройство социального функционирования в детском возрасте, неуточненное

F95 Тики

Общие диагностические указания:

A. синдромы, при которых преобладающим проявлением является какая-нибудь разновидность тика (непроизвольное быстрое, повторяющееся, неритмичное движение, обычно вовлекающее в себя ограниченные мышечные группы) или голосовая продукция, которые начинаются внезапно и явно бесцельно
B. отсутствие доказательств органического происхождения расстройства
C. тики имеют тенденцию переживаться как неодолимые, но обычно они могут быть подавлены на различные периоды времени
D. двигательные и вокальные тики могут быть классифицированы как простые или сложные:
   1. обычные простые двигательные тики включают в себя мигание, дергание шеи, пожимание плечом и гримасничанье лица
   2. обычные простые и вокальные тики включают в себя откашливание, лаянье, фырканье шмыганье и шипение
   3. обычные сложные моторные тики включают поколачивание себя, подпрыгивание и скакание
   4. обычный комплекс голосовых тиков включает повторение особых слов и иногда использование социально неприемлемых (часто непристойных) слов (копролалия), и повторение собственных звуков или слов (палилалия)
E. тики существенно более часто отмечаются у мальчиков, чем у девочек, и обычна наследственная отягощенность.

P95.0 Транзиторные тики

Диагностические критерии:

A. общие диагностические указания тиков
B. тики не сохраняются более 12 месяцев
C. тики обычно имеют форму мигания, гримасничанья лица или подергивания головы
D. транзиторные тики могут отмечаться как единственный эпизод, но в некоторых случаях возможно ремитирующее течение с рецидивами

F95.1 Хронические моторные тики или вокализмы

Диагностические критерии:

A. общие диагностические указания тиков
B. имеется моторный или голосовой тик (но не оба)
C. тики могут быть единичными или множественными (но обычно множественные)
D. длятся более года.

F95.2 Синдром Жиль де ля Туретта

Диагностические критерии:

A. общие диагностические указания тиков
B. расстройство, при котором есть, или имелись, множественные двигательные тики и один или более голосовых тиков, хотя возникавших не всегда одновременно
C. почти всегда отмечается в детском или подростковом возрасте
D. обычным является развитие двигательных тиков перед голосовыми тиками
E. часто симптоматика ухудшается в подростковом возрасте; и сохраняется в зрелом возрасте
F. голосовые тики часто множественные с взрывчатыми, повторяющимися выкриками, откашливанием, хрюканьем, использованием непристойных слов или фраз (копролалия)
G. иногда отмечается сопутствующая эхопраксия жестов, которая также может быть непристойной (копропраксия)
H. как и двигательные тики, голосовые тики могут быть самопроизвольно подавлены на короткие периоды времени, могут обостряться под воздействием стресса и исчезать во время сна.

F95.8 Другие тики

F95.9 Тики неуточненные

Не рекомендуемая остаточная категория расстройства, удовлетворяющего общим критериям тиков, но в котором не уточнена определенная подрубрика или в котором признаки не удовлетворяют критериям **F95.0**, **F95.1** или **F95.2**.

F98 Другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

Общие диагностические указания:
A. группа расстройств, общим для которых является начало в детском возрасте
A. эти расстройства весьма полиморфны:
   1. одни из этих состояний представляют хорошо установленные синдромы
   2. другие являются не более чем комплексом симптомов, для которых отсутствует доказательство нозологической самостоятельности, но включены сюда из-за их частоты и сочетания с психосоциальными проблемами, а также потому, что они не могут быть отнесены к другим синдромам.

Исключаются:
- *приступы задержки дыхания (**R06.8**);*
- *расстройства половой идентификации детского возраста (**F64.2**);*
- *гиперсомноленция и мегафагия (синдром Клейн-Левина) (**G47.8**);*
- *расстройства сна (**F51.-**);*
- *обсессивно-компульсивное расстройство (**F42.-**).*

F98.0 Энурез неорганической природы

Диагностические критерии:
A. расстройство, характеризуемое непроизвольным упусканием мочи днем и/или ночью, что является ненормальным по отношению к умственному возрасту ребенка
B. оно не является следствием отсутствия контроля функции мочевого пузыря, обусловленного каким-либо неврологическим нарушением или эпилептическими припадками или структурной аномалией мочевого тракта
C. энурез обычно не должен диагностироваться у ребенка до возраста 5 лет или с умственным возрастом до 4 лет
D. если энурез сочетается с каким-либо другим эмоциональным или поведенческим расстройством, обычно он составляет первичный диагноз, только когда непроизвольное упускание мочи случается, по крайней мере, несколько раз в неделю или если другие симптомы показывают какую-либо временную связь с энурезом
E. в том случае если энурез сочетается с энкопрезом – должен быть диагностирован энкопрез
F. сочетание расстройства с циститом не дает основного объяснения энуреза, который упорно продолжается после того, как инфекция пролечена или после того, как полиурия взята под контроль; цистит может быть вторичным по отношению к энурезу, возникнув вследствие занесения инфекции в мочевой тракт (особенно у девочек) в результате постоянной влажности.

Включаются:
- *функциональный или психогенный энурез;*
- *недержание мочи неорганического происхождения;*
- *энурез первичный (вторичный) неорганической природы*

Исключается:
- *энурез БДУ (**R32**).*

P98.1 Энкопрез неорганической природы

Диагностические критерии:
A. расстройство, характеризуемое повторяющимся, произвольным или непроизвольным выделением кала, обычно нормальной или почти нормальной консистенции в местах, которые в данном социокультуральном окружении не предназначены для этой цели
B. расстройство может представлять собой патологическое продолжение нормального младенческого недержания или может включать в себя потерю навыков удержания кала вслед за периодом приобретенного контроля над кишечником
C. может иметь место намеренная дефекация в неподходящих местах, несмотря на нормальный физиологический контроль над функцией кишечника
D. расстройство не должно быть следствием органического поражения нервной системы или соматического заболевания

F98.2 Расстройство приема пищи в младенчестве и детском возрасте

Диагностические критерии:
A. расстройство должно диагностироваться только тогда, когда:
   1. выраженность привередливости, недоедания или переедания выходит за пределы нормы
   2. природа проблем питания качественно анормальна по характеру
   3. когда ребенок недостаточно прибавляет в весе или теряет вес в течение, по крайней мере, одного месяца.

B. расстройство питания не должно содержать в своей основе органического поражения нервной системы или соматического заболевания, а также обусловлены другим психическим расстройством

Включаются:

- *расстройства срыгивания в младенчестве.*

F98.3 Поедание несъедобного (пика) младенцами и детьми

Диагностические критерии:

A. стойкое поедание несъедобного (грязь, краски и др.)

B. кодируется данной категорией только в том случае, если пика наблюдается как относительно изолированное психопатологическое поведение; являясь частью более широкого психического расстройства (такого, как аутизм) должно кодироваться в соответствии с критериями этого расстройства

F98.4 Стереотипные двигательные расстройства

Диагностические критерии:

A. произвольные, повторяющиеся, стереотипные, нефункциональные (и часто ритмические) движения, которые не связаны с каким-либо установленным психическим или неврологическим состоянием

B. в эту категорию включается стереотипное самоповреждающее поведение включает:
   1. повторяющиеся удары головой
   2. шлепанье по лицу
   3. тыканье в глаза
   4. кусание рук, губ и других частей тела

Исключаются:

- *патологические непроизвольные движения (**R25.-**);*
- *двигательные расстройства органического происхождения (**G20-G26**);*
- *тики (**F95.-**);*
- *стереотипии, являющиеся частью более широкого психического состояния, такого как общее расстройство развития);*
- *обсессивно-компульсивное расстройство (**F42.-**);*
- *трихотилломания (**P63.3**);*
- *кусание ногтей, ковыряние в носу, сосание большого пальца (**F98.8**).*

P98.5 Заикание (запинание)

A. речь, которая характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов или слов; или частыми остановками или нерешительностью в речи, что разрывает ее ритмическое течение

B. могут отмечаться сопутствующие движения лица и/или других частей тела, что совпадает по времени с повторениями, пролонгацией или остановками в течение речи

Исключаются:

- *тики (**F95**);*
- *речь взахлеб (**F98.6**);*
- *неврологическое расстройства, обусловливающее дизритмию речи (Глава VI);*
- *обсессивно-компульсивное расстройство (**F42.-**).*

F98.6 Речь взахлеб

A. быстрый темп речи с расстройством плавности, но без повторений или нерешительности в такой выраженности, что уменьшается понятность речи

Исключаются:

- *заикание (**F98.5**);*
- *тики (**F95**);*
- *неврологические расстройства, обусловливающие дизритмии речи (Глава VI МКБ-10);*
- *обсессивно-компульсивные расстройства (**F42.-**).*

F98.8 Другие специфические поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

Включаются:

- *кусание ногтей;*
- *сосание пальца;*
- *(чрезмерная) мастурбация;*
- *расстройство дефицита внимания без гиперактивности.*

F98.9 Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте, неуточненные

F99 Психическое расстройство, без других указаний

Это не рекомендуемая остаточная категория, применяется, когда не может быть использован другой код из **F00-F98**.

F99.1 Психотическое расстройство без дополнительных уточнений

F99.2 Непсихотическое расстройство без дополнительных уточнений

F99.9 Психическое расстройство без дополнительных уточнений

Приложение 1

А. Последовательный перечень диагнозов из других разделов МКБ-10, применяющихся в качестве основных (+) вместе с диагнозами F00 «Деменция при болезни Альцгеймера» и F02 «Деменция при болезнях, квалифицированных в других разделах»

A

A06. Амебный абсцесс головного мозга.
A17.0 Туберкулезный менингит. Туберкулез мозговых оболочек (головного мозга) (спинного мозга) Туберкулезный лептоменингит
A17.1 Менингеальная туберкулема. Туберкулема мозговых оболочек
A17.8 Туберкулез нервной системы других локализаций. Туберкулема или туберкулез (головного мозга или спинного мозга). Туберкулезный(ая): абсцесс головного мозга, менингоэнцефалит, миелит, полиневропатия
A17.9 Туберкулез нервной системы неуточненный
A39.0 Менингококковый менингит
A39.8 Другие менингококковые инфекции. Менингококковый энцефалит
A50.4 Поздний врожденный (ювенильный) нейросифилис. Деменция паралитическая ювенильная.
A51.4 Вторичный сифилитический менингит
A52.1 Поздний нейрсифилис
A53.0 Скрытый сифилис, неуточненный как ранний или поздний
A54.8 Другие гонококковые инфекции. Гонококковый менингит
A81.0 Болезнь Кройцфельда-Якоба
A81.1 Подострый склерозирующий панэнцефалит. Энцефалит Досона с включениями вирусных телец. Склерозирующий лейкоэнцефалит Ван-Богарта
A81.2 Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия. Многоочаговая лейкоэнцефалопатия БДУ
A81.8 Другие медленные вирусные инфекции центральной нервной системы
A81.9 Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы неуточненные
A84.0 Дальневосточный клещевой энцефалит (русский весенне-летний энцефалит)
A84.1 Центральноевропейский клещевой энцефалит
A84.8 Другие клещевые вирусные энцефалиты
A84.9 Клещевой вирусный энцефалит неуточненный
A85 Другие вирусные энцефалиты, не классифицированные в других рубриках
A85.0 Энтеровирусный энцефалит
A85.1 Аденовирусный энцефалит
A87.0 Энтеровирусный менингит
A87.1 Аденовирусный менингит

B

B00.3 Герпетический менингит
B00.4 Герпетический энцефалит
B01.0 Ветряная оспа с менингитом
B01.1 Ветряная оспа с энцефалитом
B02.0 Опоясывающий лишай с энцефалитом
B02.1 Опоясывающий лишай с менингитом
B05.0 Корь, осложненная энцефалитом
B05.1 Корь, осложненная менингитом
B06.0 Краснушный мененгит, энцефалит, менингоэнцефалит
B22.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии. Вызванное ВИЧ слабоумие
B26.1 Паротитный менингит
B26.2 Паротитный энцефалит
B38.4 Кокцидиоидомикозный менингит
B45.1 Церебральный криптококкоз
B56.0 Гамбийский трипаносомоз
B56.1 Родезийский трипаносомоз
B56.9 Африканский трипаносомоз неуточненный
B57.4 Болезнь Шагаса хроническая с поражением нервной системы (американский трипаносомоз)
B58.2 Токсоплазмозный менингоэнцефалит
B94.1 Отдаленные последствия вирусного энцефалита
B94.8 Отдаленные последствия других уточненных инфекционных паразитарных болезней

C

C70.0 Злокачественное новообразование оболочек головного мозга
C71.0 Злокачественное новообразование большого мозга
C71.1 Злокачественное новообразование лобной доли
C71.2 Злокачественное новообразование височной доли
C71.3 Злокачественное новообразование теменной доли
C71.4 Злокачественное новообразование затылочной доли
C71.5 Злокачественное новообразование желудочка мозга (кроме четвертого)
C71.6 Злокачественное новообразование мозжечка
C71.7 Злокачественное новообразование ствола мозга (включая четвертый желудочек)
C71.8 Злокачественное новообразование с поражением, выходящим за пределы одной или более областей мозга
C71.9 Злокачественное новообразование головного мозга неуточненной локализации
C72.8 Злокачественное новообразование спинного мозга и других отделов центральной нервной системы, выходящее за пределы одной и более областей локализации
C72.9 Злокачественное новообразование неуточненного отдела центральной нервной системы
C79.3 Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек

D

D32.0 Доброкачественное новообразование головного мозга
D32.9 Доброкачественное новообразование оболочек мозга неуточненной локализации
D33.0 Доброкачественное новообразование головного мозга разной локализации (кроме ствола, мозжечка и четвертого желудочка)
D33.1 Доброкачественное новообразование головного мозга (ствола, мозжечка и четвертого желудочка)
D33.2 Доброкачественное новообразование головного мозга неуточненное
D43.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга разной локализации (кроме ствола, мозжечка и четвертого желудочка)
D43.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга (ствола, мозжечка и четвертого желудочка)
D43.2 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга неуточненное

E

E00.0 Синдром врожденной йодной недостаточности, неврологическая форма. Эндемический кретинизм, неврологическая форма
E00.1 Синдром врожденной йодной недостаточности, микседематозная форма. Эндемический кретинизм: гипотиреоидный,микседематозная форма
E00.2 Синдром врожденной йодной недостаточности, смешанная форма. Эндемический кретинизм, смешанная форма
E00.9 Синдром врожденной йодной недостаточности неуточненный. Врожденный гипотиреоз вследствие недостатка йода БДУ. Эндемический кретинизм БДУ
E01.0 Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью
E01.1 Многоузловой (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью. Узловой зоб, связанный с недостатком йода
E01.2 Зоб (эндемический), связанный с йодной недостаточностью, неуточненный. Эндемический зоб БДУ
E01.8 Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния. Приобретенный гипотериоз вследствии недостатка йода БДУ
E52 Недостаточность никотиновой кислоты (пеллагра)
E53.8 Недостаточность других уточненных витаминов группы В
E75.0 Ганглиозидоз-GM2. Болезни: Сендхоффа; Тея-Сакса; GM2-ганглиозидоз (БДУ, взрослых, ювенильный)
E75.1 Другие ганглиозидозы (БДУ, GM1, GM3);муколипидоз IV
E75.2 Другие сфинголипидозы. Болезни: Фабри(-Андерсона); Гаучера; Крабе; Нимана-Пика; Синдром Фабера; Метахроматическая лейкодистрофия; Недостаточность сульфатазы
E75.3 Сфинголипидоз неуточненный
E75.4 Липофусциноз нейронов. Болезни: Баттена; Бильшовского-Янского; Куфса; Шпильмейера-Фогта
E75.5 Другие нарушения накопления липидов. Церебротендинозный холестероз (Ван-Богарта-Шерера-Эпштейна); Болезнь Волмана
E75.6 Болезнь накопления липидов неуточненная
E83.0 Гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона)
E83.5 Гиперкальцемия с поражением центральной нервной системы

G

G10 Болезнь Гентингтона
G20 Болезнь Паркинсона
G30.0 Болезнь Альцгеймера с ранним началом
G30.1 Болезнь Альцгеймера с поздним началом
G30.8 Болезнь Альцгеймера атипичная
G30.9 Болезнь Альцгеймера неуточненная
G31.0 Ограниченная атрофия головного мозга. Болезнь Пика
G40.0 Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом
G40.1 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками
G40.2 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками
G40.3 Генерализованная идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы
G40.4 Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов
G40.5 Особые эпилептические синдромы
G40.6 Припадки grand mal неуточненные с малыми припадками (petit mal) или без них
G40.7 Малые припадки (petit mal) неуточненные без припадков grand mal
G40.8 Другие уточненные формы эпилепсии
G40.9 Эпилепсия неуточненная

M

M30.0 Узелковый полиартериит
M32.1 Системная красная волчанка с поражением других органов или систем
M32.8 Другие формы системной красной волчанки
M32.9 Системная красная волчанка неуточненная

S

S02.0 Перелом свода черепа, лобной кости, теменной кости.
S02.1 Перелом основания черепа
S02.9 Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей
S06.0 Сотрясение головного мозга
S06.1 Травматический отек головного мозга
S06.2 Диффузная травма головного мозга
S06.3 Очаговая травма головного мозга
S06.4 Эпидуральное кровоизлияние, экстрадуральное кровоизлияние (травматическое)
S06.5 Травматическое субдуральное кровоизлияние
S06.6 Травматическое субарахноидальное кровоизлияние

S06.7 Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием
S06.8 Другие внутричерепные травмы
S06.9 Внутричерепная травма неуточненная
S09.0 Повреждение кровеносных сосудов головы, не классифицированное в других рубриках
S09.7 Множественные травмы головы
S09.8 Другие уточненные травмы головы
S09.9 Травма головы неуточненная

T

T45.6 Препаратами, влияющими на фибринолиз
T45.7 Антагонистами антикоагулянтов, витамином К и другими коагулянтами
T45.8 Другими препаратами, преимущественно системного действия, и гематологическими агентами. Препаратами печени и другими противоанемическими средствами. Нативной кровью и продуктами крови. Заменителями плазмы.
T45.9 Препаратами преимущественно системного действия и агентами неуточненными
T46.0 Сердечными гликозидами и препаратами аналогичного действия
T46.1 Блокаторами кальциевых каналов
T46.2 Другими противоаритмическими препаратами, не классифицированными в других рубрикахИсключено: бетаадренорецепторными антагонистами (T44.7)
T46.3 Коронарорасширяющими препаратами, не классифицированными в других рубриках. Дипиридамолом.
T46.4 Ингибиторами ангиотензинконвертирующих ферментов
T46.5 Другими гипотензивными средствами, не классифицированными в других рубриках. Клонидином. Гуанетидином. Раувольфией.
T46.6 Антигиперлипидемическими и антиатеросклеротическими средствами
T46.7 Препаратами, расширяющими периферические сосуды Никотиновой кислотой (производными)
T46.8 Антиварикозными препаратами, включая склерозирующие агенты
T46.9 Другими и неуточненными средствами, влияющими преимущественно на сердечно-сосудистую систему
T47.0 Антагонистами гистамина Н2-рецепторов
T47.1 Другими антацидными препаратами и препаратами, угнетающими желудочную секрецию
T47.2 Раздражающими слабительными средствами
T47.3 Солевыми и осмотическими слабительными средствами
T47.4 Другими слабительными средствами. Препаратами, стимулирующими перистальтику кишечника
T47.5 Препаратами, стимулирующими пищеварение
T47.6 Противодиарейными средствами.
T47.7 Рвотными средствами
T47.8 Другими средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт
T47.9 Средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт, неуточненными
T48.0 Препаратами группы окситоцина.
T48.1 Миорелаксантами (блокаторами н-холинорецепторов скелетных мышц)
T48.2 Другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно на мускулатуру
T48.3 Противокашлевыми средствами
T48.4 Отхаркивающими средствами
T48.5 Средствами от насморка
T48.6 Противоастматическими средствами, не классифицированными в других рубриках. Сальбутамолом.
T48.7 Другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно надыхательнуюсистему
T49.0 Противогрибковыми, противоинфекционными и противовоспалительными препаратами местного действия, не классифицированными в других рубриках
T49.1 Противозудными средствами
T49.2 Вяжущими средствами и детергентами местного действия
T49.3 Смягчающими, уменьшающими раздражение и защитными средствами
T49.4 Кератолитическими, кератопластическими и другими средствами для леченияволос
T49.5 Препаратами и средствами, применяемыми в офтальмологической практике. Глазнымипротивоинфекционными препаратами
T49.6 Препаратами и средствами, применяемыми в отоларингологической практике.Противоинфекционными средствами для лечения болезней уха, горла и носа
T49.7 Стоматологическими препаратами, применяемыми местно
T49.8 Другими средствами местного применения. Спермицидами.
T49.9 Средствами местного применения неуточненными
T50.0 Минералокортикоидами и их антагонистами
T50.1 «Петлевыми» диуретиками
T50.2 Ингибиторами карбоангидразы, производными бензотиадиазина и другимидиуретическимисредствами Ацетазоламидом
T50.3 Препаратами, влияющими на электролитный, энергетический и водный балансСолямидляпероральной регидратации
T50.4 Препаратами, влияющими на обмен мочевой кислоты
T50.5 Средствами, подавляющими аппетит
T50.6 Противоядиями и комплексонами, не классифицированными в других рубрикахСредствамидля лечения алкоголизма, облегчающими отвыкание от алкоголя
T50.7 Аналептическими средствами и антагонистами опиатных рецепторов
T50.8 Диагностическими средствами
T50.9 Другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами ибиологическимивеществами. Средствами, повышающими кислотность. Средствами, повышающими щелочность. Иммуноглобулином. Антителами. Липотропными средствами. Гормонами паращитовидных желез и их производными.
T51.0 Этанола, этилового спирта. Исключены: случаи острой алкогольной интоксикации исостояние «перепоя» (F10.0), пьянство (F10.0), патологическая алкогольная интоксикация (F10.0)
T51.1 Метанола, метилового спирта
T51.2 2-Пропанола, изопропилового спирта
T51.3 Сивушных масел, Спирта: амилового, бутилового (1-бутанола), пропилового(1-пропанола)
T51.8 Других спиртов
T51.9 Спирта неуточненного
T52.0 Нефтепродуктов
T52.1 Бензола
T52.2 Гомологов бензола
T52.3 Гликолей
T52.4 Кетонов
T52.8 Других органических растворителей
T52.9 Органических растворителей неуточненных

T53.0 Четыреххлористого углерода. Тетрахлорметана
T53.1 Хлороформа. Трихлорметана
T53.2 Трихлорэтилена. Трихлорэтана
T53.3 Тетрахлорэтилена. Перхлорэтилена. Тетрахлорэтана
T53.4 Дихлорметана Метиленхлорида
T53.5 Хлорофторуглеродов
T53.6 Других галогенпроизводных алифатических углеводородов
T53.7 Других галогенпроизводных ароматических углеводородов
T53.9 Галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов неуточненных
T54.0 Фенола и его гомологов
T54.1 Других разъедающих органических веществ
T54.2 Едких кислот и кислотоподобных веществ
T54.3 Едких щелочей и щелочеподобных веществ
T54.9 Разъедающих веществ неуточненных
T55 Токсическое действие мыл и детергентов
T56.0 Свинца и его соединений
T56.1 Ртути и ее соединений
T56.2 Хрома и его соединений
T56.3 Кадмия и его соединений
T56.4 Меди и ее соединений
T56.5 Цинка и его соединений
T56.6 Олова и его соединений
T56.7 Бериллия и его соединений
T56.8 Других металлов
T56.9 Металла неуточненного
T57.0 Мышьяка и его соединений
T57.1 Фосфора и его соединений Исключено: фосфорорганических инсектицидов(T60.0)
T57.2 Марганца и его соединений
T57.3 Цианистого водорода
T57.8 Других уточненных неорганических веществ
T57.9 Неорганического вещества неуточненного
T58 Токсическое действие окиси углерода из всех источников
T59.0 Окислов азота
T59.1 Двуокиси серы
T59.2 Формальдегида
T59.3 Слезоточивого газа Слезного газа
T59.4 Газообразного хлора
T59.5 Газообразного фтора и фтористого водорода
T59.6 Сероводорода
T59.7 Двуокиси углерода
T59.8 Других уточненных газов, дымов и паров
T59.9 Газов, дымов и паров неуточненных
T60.0 Фосфорорганических и карбаматных инсектицидов
T60.1 Галогенированных инсектицидов Исключено: хлорированных углеводородов (T53.-)
T60.2 Других инсектицидов
T60.3 Гербицидов и фунгицидов
T60.4 Родентицидов Таллия Исключено: стрихнина и его солей (T65.1)
T60.8 Других пестицидов
T60.9 Пестицидов неуточненных
T61.0 Отравление сикватерой
T61.1 Отравление рыбой семейства скумбриевых. Гистаминоподобный синдром
T61.2 Отравление другой рыбой и моллюсками
T61.8 Токсическое действие других морепродуктов
T61.9 Токсическое действие морепродуктов неуточненных
T62.0 Токсическое действие других ядовитых веществ в съеденных грибах
T62.1 Токсическое действие других ядовитых веществ в съеденных ягодах
T62.2 Токсическое действие других ядовитых веществ в другом(их) съеденном(ых)растении(ях)
T62.8 Токсическое действие других ядовитых веществ в других ядовитых веществ,содержащихся в съеденных пищевых продуктах
T62.9 Токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в пищевых продуктахнеуточненных
T63.0 Токсическое действие змеиного яда, яда морских змей
T63.1 Токсическое действие яда других пресмыкающихся, яда ящерицы
T63.2 Токсическое действие яда скорпиона
T63.3 Токсическое действие яда паука
T63.4 Токсическое действие яда других членистоногих, укуса или ужаливанияядовитого насекомого
T63.5 Токсический эффект, обусловленный контактом с рыбой
T63.6 Токсический эффект, обусловленный контактом с другими морскими животными.
T63.8 Токсический эффект, обусловленный контактом с другими ядовитыми животными, яда амфибий
T63.9 Токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитым животным неуточненным
T64 Токсическое действие загрязняющих пищевые продукты афлатоксинаи других микотоксинов
T65.0 Токсическое действие цианидов Исключено: цианистого водорода (T57.3)
T65.1 Токсическое действие стрихнина и его солей
T65.2 Токсическое действие табака и никотина
T65.3 Токсическое действие нитропроизводных и аминопроизводных бензола и его гомологов Анилина(аминобензола)Нитробензола Тринитротолуола
T65.4 Токсическое действие дисульфида углерода
T65.5 Токсическое действие нитроглицерина и других азотных кислот и сложных эфиров Тринитрата1,2,3-пропантриола
T65.6 Токсическое действие красок и красящих веществ, не классифицированных в других рубриках
T65.8 Токсическое действие других уточненных веществ
T65.9 Токсическое действие неуточненного вещества

B. Состояния из других разделов МКБ-10, часто ассоциированные с психическими и поведенческими расстройствами

Глава I
Инфекционные и паразитарные заболевания (A00 – B99)

A50 **Конгенитальный сифилис**
A50.4 Поздний конгенитальный нейросифилис
A52 **Поздний сифилис**
A52.1 Симптоматический нейросифилис
Включается: tabes dorsalis
A81 **Вялотекущая вирусная нейроинфекция центральной нервной системы**
A81.0 Болезнь Кройцфельда – Якоба
A81.1 Подострый склерозирующий панэнцефалит
A81.2 Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия
B22 **Другие уточненные заболевания вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)**
B22.0 Энцефалопатия в результате инфекции ВИЧ
Включается: деменция при инфекции ВИЧ

Глава II
Опухоли (C00 – D48)

C70.- **Злокачественная опухоль твердой мозговой оболочки**
C71.- **Злокачественная опухоль мозга**
C72.- **Злокачественная опухоль спинного мозга, черепно-мозговых нервов и других отделов центральной нервной системы**
D33.- **Доброкачественная опухоль мозга и других отделов центральной нервной системы**
D42.- **Опухоль неопределенного характера твердой мозговой оболочки**
D43.- **Опухоль неопределенного характера мозга и других отделов центральной нервной системы**

Глава IV
Эндокриинные, метаболические заболевания и расстройства питания (E00 – E90)

E00.- **Конгенитальный йододефицитный синдром**
E01.- **Йододефицитные заболевания щитовидной железы и близкие к ним состояния**
E02.- **Субклинический йододефицитный гипотиреоидизм**
E03.- **Другой гипотиреоидизм**
E03.2 Гипотиреоидизм вследствие применения медикаментов и других экзогенных веществ
E03.5 Кома при микседеме
E05.- **Тиреотоксикоз (гипертиреоидизм)**
E15 **Недиабетическая гипогликемическая кома**
E22 **Гиперфункция гипофиза**
E22.0 Акромегалия и гипофизарный гигантизм
E22.1 Гиперпролактинемия
Включается: лекарственная гиперпролактинэмия
E23.- **Гипофункция и другие заболевания гипофиза**
E24.- **Синдром Кушинга**
E30 **Расстройства пубертатного периода нигде не классифицированные**
E30.0 Отставленный пубертат
E30.1 Ранний пубертат
E34.- **Другие эндокринные заболевания**
E51 **Тиаминовая недостаточность**
E51.2 Энцефалопатия Вернике
E64.- **Последствия нарушения питания и другие виды недостаточного питания**
E66.- **Ожирение**
E70 **Нарушение метаболизма ароматических аминокислот**
E70.0 Классическая фенилкетонурия
E71.- **Нарушения метаболизма аминокислот с разветвленной цепью и жирных кислот**
E74.- **Другие нарушения метаболизма углеводов**
E80.- **Нарушения обмена порфирина билирубина**

Глава VI
Заболевания нервной системы (G00 – G99)

G00.- **Бактериальный менингит, нигде не классифицированный**
G02.- **Менингит при других инфекционных и паразитарных заболеваниях, классифицированных в других разделах**
G03.- **Менингит вследствие других неуточненных причин**
G04.- **Энцефалит, миелит и энцефаломиелит**
G06 **Интракраниальный и интраспинальный абсцесс и гранулёма**
G06.2 Экстрадуральный и субдуральный абсцесс, БДУ
G10 **Болезнь Гентигтона**
G11.- **Наследственная атаксия**
G20 **Болезнь Паркинсона**

G21 Вторичный паркинсонизм
G21.0 Злокачественный нейролептический синдром
G21.1 Другой лекарственный вторичный паркинсонизм
G21.2 Вторичный паркинсонизм вследствие других внешних причин
G21.3 Постэнцефалитический паркинсонизм

G24 Дистония
Включается: дискинезия
G24.0 Лекарственная дистония
G24.3 Спастическая кривошея
G24.8 Другая дистония

G25.- Другие экстрапирамидные и двигательные расстройства

G30 Болезнь Альцгеймера
G30.0 Болезнь Альцгеймера с ранним началом
G30.1 Болезнь Альцгеймера с поздним началом
G30.8 Другая болезнь Альцгеймера
G30.9 Болезнь Альцгеймера неуточненная

G31 Другие дегенеративные заболевания нервной системы, нигде не классифицированные
G31.0 Очаговая атрофия мозга
Включается: болезнь Пика
G31.1 Сенильная атрофия мозга, нигде не классифицированная
G31.2 Алкогольная дегенерация нервной системы
G31.8 Другие уточненные дегенеративные заболевания нервной системы
G31.9 Дегенеративные заболевания нервной системы, неуточненные

G32.- Другие дегенеративные расстройства нервной системы при заболеваниях, классифицированных в других разделах

G35 Множественный склероз

G37 Другие демиелинезирующие заболевания центральной нервной системы
G37.0 Рассеянный склероз

G40.- Эпилепсия

G41.- Эпилептический статус

G43.- Мигрень

G44.- Другие синдромы головной боли

G45.- Транзиторная церебральная ишемия и связанные с ней синдромы

G47 Нарушения сна
G47.2 Нарушение цикла сон-бодрствование
G47.3 Апноэ сна
G47.4 Нарколепсия и катаплексия

G70.- Миастения беременных и мионейральные расстройства

G91.- Гидроцефалия

G92 Токсическая энцефалопатия

G93.- Другие церебральные расстройства

G97.- Постпроцедурные расстройства нервной системы нигде не классифицированные

Глава VII
Заболевания глаза и его придатков (H00 – H59)

H40 Глаукома
H40.6 Вторичная лекарственная глаукома

Глава VIII
Заболевания уха и сосцевидного отростка (H60 – H95)

H93 Другие заболевания уха нигде не классифицированные
H93.1 Шум в ушах

Глава IX
Заболевания сердечно-сосудистой системы (I00-I99)

I10 Эссенциальна (первичная) гипертония

I60.- Субарахноидальная геморрагия

I61.- Интрацеребральная геморрагия

I62 Другая нетравматическая интракраниальная геморрагия
I62.0 Субдуральная геморрагия (острая) (нетравматическая)
I62.1 Нетравматическая экстрадуральная геморрагия

I63.- Церебральная ишемия (инфаркт мозга)

I64 Инсульт не уточненный как геморрагический или ишемический

I65.- Закупорка или стеноз прецеребральных артерий, не вызывающих инфаркт мозга

I66.- Закупорка или стеноз церебральных артерий, не вызывающих инфаркт мозга

I67 Другие цереброваскулярные заболевания
I67.2 Церебральный атеросклероз
I67.3 Прогрессирующий сосудистый лейкоэнцефалит
Включается: болезнь Бинсвангера
I67.4 Гипертензивная энцефалопатия

I69.- Последствия цереброваскулярных заболеваний

I95 Гипотония
I95.2 Лекарственная гипотония

Глава X
Заболевания дыхательной системы (J00-J99)

J10 Вирусная респираторная инфекция
J10.8 Вирусная респираторная инфекция с другим началом
J11 Невирусная респираторная инфекция
J11.8 Невирусная респираторная инфекция с другим началом
J42 Неспецифический хронический бронхит
J43 Эмфизема
J45 Астма

Глава XI
Заболевания пищеварительной системы (K00-K99)

K25 Язва желудка
K26 Язва двенадцатиперстной кишки
K27 Пептическая язва неуточненной локализации
K29 Гастрит и дуоденит
K29.2 Алкогольный гастрит
K30 Диспепсия
K58 Синдром раздраженной кишки
K59 Другие функциональные интестинальные расстройства
K70 Алкогольные заболевания печени
K71 Токсические заболевания печени
K86 Другие заболевания поджелудочной железы
K86.0 Хронический алкогольный панкреатит

Глава XII
Заболевания кожи и подкожной клетчатки (L00-L99)

L20 Атопический дерматит
L98 Заболевания кожи и подкожной клетчатки нигде не классифицированные

Глава XIII
Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99)

M32 Системная красная волчанка
M54 Боли в спине

Глава XIV
Заболевания мочеполовой системы (N00-N99)

N48 Другие заболевания полового члена
N48.3 Приапизм
N48.4 Импотенция органического происхождения
N91 Нарушения менструального цикла (аменорея, гипоменарея и дисменорея)
N94 Боли и другие расстройства, ассоциированные с женскими половыми органами и менструальным циклом
N94.3 Предменструальный синдром напряжения
N94.4 Первичная дисменорея
N94.5 Вторичная дисменорея
N94.6 Дисменорея неуточненная
N95 Заболевания периода менопаузы и предшествующего менопаузе
N95.1 Женские климактерические состояния
N95.3 Состояния, ассоциированные с искусственной менопаузой

Глава XV
Беременность, деторождение и послеродовой период (O00-O99)

O04 Медицинский аборт

O35 Помощь беременной при аномалии или повреждении плода, или подозрении на них
O35.4 Помощь беременной при повреждении (подозрении на повреждение) плода от употребления алкоголя
O35.5 Помощь беременной при повреждении (подозрении на повреждение) плода от употребления наркотиков

O99 Другие заболевания при беременности, классифицированных в других разделах
O99.3 Психические расстройства и заболевания нервной системы, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период
Включаются: состояния разделов F00-F99 и G00-G99

Глава XVII
Врожденные пороки, повреждения и хромосомные аномалии (Q00-Q99)

Q02 Микроцефалия
Q03 Врожденная гидроцефалия
Q04 Другие врожденные пороки развития мозга
Q05 Spina bifida
Q75 Другие пороки развития костей лицевого черепа
Q85 Факоматозы, нигде не классифицированные
Q85.0 Нейрофиброматоз (доброкачественный)
Q85.1 Бугорковый склероз
Q86 Синдром врожденных пороков при уточненной экзогеннии, нигде не классифицированный
Q86.0 Алкогольный синдром плода (дисморфический)
Q90 Синдром Дауна
Q90.0 Трисомия 21 пары, мейотическое нерасхождение
Q90.1 Трисомия 21 пары, мозаичная (митотическое нерасхождение)
Q90.1 Трисомия 21 пары, транслокация
Q90.1 Синдром Дауна, неуточненный
Q91 Сидром Эдварда и синдром Патау
Q93 Моносомия и отсутствие аутосом, нигде не классифицированное
Q93.4 Отсутствие или укороченное плечо хромосомы 5
Q96 Синдром Тернера
Q97.- Другие аномалии половых хромосом, женский фенотип, нигде не классифицированные

Q98 Другие аномалии половых хромосом, мужской фенотип, нигде не классифицированные
Q98.0 Синдром Кляйнфельтера, кариотип 47,XXY
Q98.1 Синдром Кляйнфельтера, мужской с более чем двумя X хромосомами
Q98.2 Синдром Кляйнфельтера, мужской с кариотипом 46,XX
Q98.4 Синдром Кляйнфельтера, неуточненный

Q99.- Другие хромосомные аномалии, нигде не классифицированные

Глава XVIII
Симптомы, признаки и аномальные данные лабораторных исследований нигде не классифицированные (R00-R99)

R55 Синкоп и коллапс
R56 Конвульсии, нигде не классифицированные
R56.0 Фебрильные конвульсии
R56.8 Другие и неуточненные конвульсии
R62 Недостаточное предполагаемого физиологического развития
R63 Симптомы и признаки потребления пищи и жидкостей
R63.0 Анорексия
R63.1 Полидипсия
R63.4 Аномальная потеря веса
R63.5 Аномальная прибавка
R78 Присутствие в крови наркотиков и других веществ, отсутствующих в норме
Включаются: алкоголь (R78.0); опиаты(R78.1); кокаин (R78.2); галлюциногены (R78.2); другие наркотики (78.4); психотропные препараты (R78.5); аномальный уровень лития (R78.8)
R83 Аномальный уровень цереброспинальной жидкости
R90 Аномальные результаты диагностических проб центральной нервной системы
R94 Аномальные результаты функциональных проб
R94.0 Аномальные результаты функциональных проб центральной нервной системы
Включается: аномальная ЭЭГ

Глава XIX
Травмы, отравления и другие последствия внешних воздействий (S00-S99)

S06 Внутричерепная травма
S06.0 Контузия
S06.1 Травматический отек мозга
S06.2 Дифузное повреждение мозга
S06.3 Локальное повреждение мозга
S06.4 Эпидуральное кровотечение
S06.5 Травматическое субдуральное кровотечение
S06.6 Травматическое субарахноидальное кровотечение
S06.7 Внутричерепная травма с продолжительной комой

Глава XX
Внешние причины болезней и смерти (V00-Y99)
Умышленные самоповреждения (X60-X84)

X60 Умышленное самоотравление в результате приема ненаркотических анальгетиков, жаропонижающих и противоревматических препаратов
X61 Умышленное самоотравление в результате приема антиэпилептических, седативных, снотворных, антипаркинсонических и психотропных препаратов нигде не классифицированное
X62 Умышленное самоотравление в результате приема наркотиков и галлюциногенов нигде не классифицированное

X63 Умышленное самоотравление в результате приема других препаратов, возбуждающих вегетативную нервную систему
X64 Умышленное самоотравление в результате приема других и неуточненных препаратов и биологических веществ
X65 Умышленное самоотравление в результате приема алкоголя
X66 Умышленное самоотравление в результате приема органических растворителей, каустической соды и их испарений
X67 Умышленное самоотравление в результате приема других газов и испарений
X68 Умышленное самоотравление в результате приема пестицидов
X69 Умышленное самоотравление в результате приема других и неуточненных химикатов и ядовитых веществ
X70 Умышленное самоповреждение в результате повешения, удавления и удушения
X71 Умышленное самоповреждение в результате утопления
X72 Умышленное самоповреждение ручным огнестрельным оружием
X73 Умышленное самоповреждение путем выстрела из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия
X74 Умышленное самоповреждение другим и неуточненным огнестрельным оружием
X75 Умышленное самоповреждение взрывчатыми веществами
X76 Умышленное самоповреждение огнем и дымом
X77 Умышленное самоповреждение горячим паром и горячими предметами
X78 Умышленное самоповреждение режущими предметами
X79 Умышленное самоповреждение тупым предметом
X80 Умышленное самоповреждение падением с высоты
X81 Умышленное самоповреждение падением под движущиеся объекты
X82 Умышленное самоповреждение путем совершения автокатастрофы
X83 Умышленное самоповреждение другими уточненными способами
X84 Умышленное самоповреждение неуточненными способами

Физическое насилие (X85-Y09)

X93 Физическое насилие с применением ручного огнестрельного оружия
X99 Физическое насилие с применением режущих предметов
Y00 Физическое насилие с применением тупых предметов
Y04 Физическое насилие без оружия или орудия
Y05 Сексуальное насилие
Y06 Повреждение по неосторожности и в результате оставления в опасности
Y07 Расстройства, возникающие в результате плохого обращения

Побочные эффекты, возникающие при применении лекарственных средств, медикаментов и биологических препаратов (Y40-Y59)

Y45 Аналгезирующие, жаропонижающие и противовоспалительные средства
Y46 Противоэпилептические и антипаркинсонические препараты
Y46.7 Антипаркинсонические препараты
Y47 Седативные, снотворные и анксиолитические препараты
Y49 Психотропные препараты нигде не классифицированные
Y50 Препараты, стимулирующие центральную нервную систему, не классифицированные в других рубриках
Y51 Препараты, действующие преимущественно на вегетативную нервную систему
Y57 Другие и неуточненные лекарственные средства и медикаменты

Дополнительные факторы, имеющие отношение к причинам заболеваемости и смертности, классифицированным в других рубриках (Y90 – Y98)

Y90 Доказательство влияния алкоголя, определенного по его содержанию в крови
Y91 Доказательство влияния алкоголя, определенного по степени опьянения
Y95 Состояние госпитализма
Y96 Факторы, имеющие отношение к работе
Y97 Факторы, связанные с загрязнением окружающей среды
Y98 Факторы, связанные с образом жизни

Глава XXI
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения (Z00 – Z99)

Z00 Общий осмотр и обследование лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза
Z00.4 Общее психиатрическое обследование
Z02 Обследование и обращение в административных целях
Z02.3 Обследование призывников в вооруженные силы
Z02.4 Обследование в связи с получением водительских прав
Z02.6 Обследование в связи со страхованием
Z02.7 Обследование в связи с получением медицинских документов
Z03 Медицинское наблюдение и оценка при подозрении на заболевание или патологическое состояние
Z03.2 Наблюдение при подозрении на психическое заболевание
Z04 Обследование и наблюдение с другими целями
Z04.6 Общее психиатрическое обследование по запросу учреждения
Z09 Последующее обследование после лечения состояний, не относящихся к злокачественным новообразованиям
Z50 Помощь, включающая использование реабилитационных процедур

Z50.2 Реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом
Z50.3 Реабилитация лиц, страдающих наркоманией
Z50.4 Психотерапия, не классифицированная в других рубриках
Z50.5 Речевая терапия
Z50.7 Трудовая терапия и профессиональная реабилитация, не классифицированная в других рубриках

Z54 Состояние выздоровления
Z55 Проблемы, связанные с обучением и грамотностью
Z56 Проблемы, связанные с работой и безработицей
Z57 Воздействие производственных факторов риска
Z58 Проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды
Z59 Проблемы, связанные с обстоятельствами жилищного и экономического характера
Z60 Проблемы, связанные с адаптацией к изменению образа жизни
Z61 Проблемы, связанные с неблагоприятными жизненными событиями в детстве
Z62 Другие проблемы, связанные с воспитанием ребенка
Z63 Другие проблемы, связанные с близкими людьми, включая семейные обстоятельства
Z64 Проблемы, связанные определенными психосоциальными обстоятельствами
Z65 Проблемы, связанные с другими психосоциальными обстоятельствами
Z70 Консультации, касающиеся сексуальных отношений, поведения и ориентации
Z71 Обращения в учреждения здравоохранения для получения других консультаций и медицинских советов, не классифицированные в других рубриках
Z72 Проблемы, связанные с образом жизни
Z73 Проблемы, связанные с трудностями поддержания нормального образа жизни
Z74 Проблемы, связанные с зависимостью от лица, обеспечивающего помощь и уход
Z75 Проблемы, связанные с медицинским обеспечением и другой медицинской помощью
Z76 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами
Z81 В семейном анамнезе психические расстройства и расстройства поведения
Z86 В личном анамнезе некоторые другие болезни

Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681
«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст.219) Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемый перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Установить, что внесение изменений и дополнений в указанный перечень осуществляется по представлению Министерства здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации *С.Кириенко*

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681)

Список
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствиис законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации
(список I)

Наркотические средства

Аллилпродин
Альфамепродин
Альфаметадол
Альфа-метилфентанил
Альфа-метилтиофентанил
Альфапродин
Альфацетилметадол
Анилэридин
Ацетил-альфаметилфентанил
Ацетилгидрокодеин
Ацетилированный опий
Ацетилкодеин
Ацетилметадол
Ацеторфин
БДБ [L-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин]
Безитрамид
Бензетидин
Бензилморфин
Бета-гидрокси-3-метилфентанил
Бета-гидроксифентанил
Бетамепродин
Бетаметадол
Бетапродин
Бетацетилметадол
Гашиш (анаша, смола каннабиса)
Героин (диацетилморфин)
Гидрокодон
Гидрокодона фосфат
N-гидрокси-МДА
Гидроморфинол
Гидроморфон
Дезоморфин
Диампромид
Диацетилморфин (героин)
Дигидроморфин
Дименоксадол
N-Диметиламфетамин
Димепгептанол
Диметилтиамбутен
Диоксафетил бутират
Дипипанон
Дифеноксин
Диэтилтиамбутен
ДМА (d, L-2,5-диметокси-альфа-метил-фенил-этиламин)
ДМГП (диметилгептилпиран)
ДМТ (диметилтриптамин)
ДОБ (d, L-2,5-диметокси-4-бром-амфетамин)
ДОХ (d, L-2,5-диметокси-4-хлор-амфетамин)
ДОЭТ (d, L-2,5-диметокси-4-этил-амфетамин)
Дротебанол
ДЭТ (N,N-диэтилтриптамин)
Изометадон
Каннабис (марихуана)
Кат
Кетобемидон
Клонитазен
Кодоксим
Кокаиновый куст
Кустарно изготовленные препараты из эфедрина или из препаратов, содержащих эфедрин

Кустарно изготовленные препараты из псевдоэфедрина или из препаратов, содержащих псевдоэфедрин
Левометорфан
Левоморамид
Леворфанол (леморан)
Левофенацилморфан
Лизергиновая кислота и ее производные
d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)
Лист кока
Маковая солома
Масло каннабиса (гашишное масло)
МБДБ [N-Метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин]
МДА (тенамфетамин)
МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин)
3-Моноацетилморфин
6-Моноацетилморфин
Мескалин
Метадон
d-Метадон
L-Метадон
Метадона промежуточный продукт (4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан)
Метазоцин
Метамфетамин
Метилдезорфин
Метилдигидроморфин
3-метилтиофентанил
3-метилфентанил
N-метилэфедрон
Метопон
Мирофин
Млечный сок разных видов мака, не являющихся опийным или масличным маком, но содержащих алкалоиды мака, включенные в списки наркотических средств и психотропных веществ
ММДА (2-метокси-а-4-метил 4, 5-(метилендиокси) -фенетиламин)
Морамида, промежуточный продукт (2-метил-3-морфолин-1,1-дифенил-пропан-карбоновая кислота)
Морферидин
Морфин метилбромид
Морфин-N-окись
МППП (1-метил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат (эфир)
Никодикодин
Никокодин
Никоморфин
Норациметадол
Норкодеин
Норлеворфанол
Норметадон
Норморфин
Норпипанон
Оксикодон (текодин)
Оксиморфон
Опий (в том числе медицинский)-свернувшийся сок опийного или масличного мака
Опийный мак (растение вида Papaver somniferum L)
Орипавин
Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил)
Парагексил
ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол ацетат эфир)
Петидин
Петидина промежуточный продукт А (4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин)
Пиминодин
Плодовое тело (любая часть) любого вида грибов, содержащих псилоцибин и (или) псилоцин
ПМА (4-метокси-альфа-метилфенил-этиламин)
Прогептазин
Проперидин
Пропирам
Псилоцибин
Псилоцин
Рацеметорфан
Рацеморамид
Рацеморфан
Ролициклидин
2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин)
СТП (ДОМ) [2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил) фенилпропан]
Тебакон
Теноциклидин
Тетрагидроканнабинол (все изомеры)
Тиофентанил
ТМА (d, L-3,4,5-триметокси-альфа-метилфенил-амин)
Фенадоксон
Фенадон
Феназоцин
Фенампромид
Фенатин
Фенциклидин
Феноморфан
Феноперидин
Фолькодин
Фуретидин
Экгонин, его сложные эфиры и производные, которые могут быть превращены в экгонин и кокаин
Экстракт маковой соломы (концентрат маковой соломы)
N-ЭТИЛ-МДА (d, L-N-этил-альфа-метил-3,4-(метилендиокси) -фенетиламил
Этилметилтиамбутен
Этициклидин
Этоксеридин
Этонитазен
Эторфин
Этриптамин
Эфедрон (меткатинон)

Психотропные вещества

Дексамфетамин
Катин (d-норпсевдоэфедрин)
Катинон (L-альфа-аминопропиофенон)
Левамфетамин
Меклоквалон
Метаквалон
4-метиламинорекс
Метилфенидат (риталин)

Изомеры (если таковые определенно не исключены) наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в данном списке, в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках данного химического обозначения.

Эфиры сложные и простые наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в данном списке, соли всех наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в данном списке, если существование таких солей возможно.

Смеси, в состав которых входят наркотические средства и психотропные вещества данного списка, независимо от их количества.

Список
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации
(список II)

Наркотические средства

р-Аминопропиофенон (PAPP) и его оптические изомеры (антидот против цианидов)
Альфентанил
Амфетамин (фенамин) и комбинированные лекарственные препараты, содержащие фенамин (амфетамин)
Бупренорфин
Глютетимид (Ноксирон)
Декстроморамид
Декстропропоксифен (ибупроксирон, проксивон, спазмопроксивон)
Дигидрокодеин
Дифеноксилат
Кодеин
Кодеина фосфат
Кокаин
Кокаина гидрохлорид
Кодеин N-окись
Морфин
Морфина гидрохлорид
Морфина сульфат
Морфилонг
Омнопон
Пентазоцин
Properидин
Пропирам
Просидол
Пиритрамид (дипидолор)
Реазек
Свечи тилидина в разных дозировках
Сомбревин
Суфентанил
Таблетки «Алнагон» (кодеинафосфата 20мг, кофеина80мг, фенобарбитала 20 мг, кислоты ацетилсалициловой 20 мг)
Таблетки (кодеина камфосульфоната 0,025 г, сульфагваякола калия 0,100 г; густого экстракта гринделии 0,017 г)
Таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола 0,500 г
Таблетки кодеина фосфата 0,015 г + сахара 0,25 г
Таблетки кодеина 0,01 г, 0,015 г + сахара 0,25 г
Таблетки кодеина 0,015 г + натрия гидрокарбоната 0,25 г
Таблетки «Кодтерпин» (кодеина 0,015 г + натрия гидрокарбоната 0,25 г + терпингидрата 0,25 г)
Таблетки от кашля. Состав: травы термопсиса в порошке – 0,01 г (0,02 г), кодеина – 0,02г (0,01 г), натрия гидрокарбоната – 0,2 г, корня солодки в порошке – 0,2 г
Тебаин
Тилидин
Тримеперидин (промедол)
Фентанил
Этилморфин
Эскодол
Эстоцин
Эстоцина гидрохлорид
Этилморфина гидрохлорид

Психотропные вещества

Амобарбитал (барбамил)
Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион)
Кетамин
Кетамина гидрохлорид (калипсол, кеталар)
Таблетки (барбамила 0,15 г + бромизовала 0,15 г)
Фенметразин
Фентермин
Этаминал натрия
Хальцион (триазолам)

Соли всех наркотических средств и *психотропных веществ, перечисленных в данном списке, если существование таких* солей возможно

Список
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации
(список III)

Аминорекс
Апрофен
Бензфетамин
Галотан (фторотан)
Декстрометорфан
Левамфетамин
Лефетамин
Мазиндол
Мефенорекс
Натрий оксибутират и другие соли оксимасляной кислоты
Пентобарбитал
Пипрадрол
Тарен
Фендиметразин
Фенпропорекс
Ципепрол
Этиламфетамин

Соли веществ, перечисленных в данном списке, если существование таких солей возможно